

医学教育网口腔执业医师:《答疑周刊》2022年第3期

问题索引: 1. 中龋的临床表现是?

2. 最严重的牙内陷是?

3. 四环素牙着色与什么有关?

具体解答

1. 中龋的临床表现是?

以下属于中龋临床表现的是

- A. 遭受外界的物理化学刺激无明显反应
- B. 已有龋洞, 龋损的前沿位于牙本质的浅层
- C. 已有龋洞, 进食冷、热或酸、甜食品疼、自发疼
- D. 已有龋洞, 进食冷、热或酸、甜食品疼、放射疼
- E. 已有龋洞, 进食冷、热或酸、甜食品疼、夜间疼

【答案】B

【解析】根据病变侵入牙齿的深度分类: 临床上以去除龋腐后洞底所在的组织位置分为浅、中、深龋。中龋龋损的前沿位于牙本质的浅层, 又称为牙本质浅龋。临床检查时已有明显的龋洞, X线片上可发现由牙表面至牙本质浅层的透射影。龋洞内有龋腐, 患牙开始出现症状, 主要表现为在进食冷、热或酸、甜食品时, 刺激进入窝洞引起的一过性敏感症状, 去除刺激后症状随即消失。

2. 最严重的牙内陷是?

各型牙内陷中最严重的是

- A. 畸形根面沟
- B. 畸形舌侧窝
- C. 畸形舌侧尖
- D. 牙中牙
- E. 釉珠

【答案】D

【解析】牙中牙：是牙内陷最严重的一种。牙齿呈圆[医学教育网]锥状，且较其固有形态稍大；X线片示一个牙包于牙中，其实陷入部分的中央不是牙髓，而是含有残余成釉器的空腔。

3. 四环素牙着色与什么有关？

影响四环素牙着色程度的主要因素是

- A. 患者的发育情况
- B. 患者的健康状况
- C. 骨骼的矿化程度
- D. 牙本质的矿化程度
- E. 药物的种类、剂量、给药次数

【答案】E

【解析】牙着色程度与四环素的种类、剂量和给药次数有关。一般认为，缩水四环素、去甲金霉素、盐酸四环素引起的着[医学教育网]色比土霉素、金霉素明显；在恒牙，服用四环素的疗程数与着色程度呈正比关系，但是短期内的大剂量服用比长期给服相等的总剂量作用更大。