

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 48 期

【病理妊娠】

关于先兆流产的处理，下列哪项是错误的

- A. 每日肌注黄体酮 20mg
- B. 禁阴道检查
- C. 卧床休息
- D. 甲低可口服用小剂量甲状腺素片
- E. 禁性生活

【正确答案】B

【答案解析】先兆流产要尽量减少不必要的阴道检查，以减少对子宫的刺激，但并不是绝对禁止，应轻柔的进行操作。可以通过阴道检查发现宫口是否张开，有无妊娠物堵塞等。

【异常分娩】

处理不协调性子宫收缩乏力的首选措施应为

- A. 静脉补充能量
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 行人工破膜
- D. 肌注哌替啶 100mg
- E. 静脉滴注缩宫素加强宫缩

【正确答案】D

【答案解析】处理原则为调节子宫不协调收缩，使其恢复正常节律性及极性。可给予哌替啶 100mg 或吗啡 10mg 肌内注射，经充分休息多可恢复为协调性子宫收缩，若此时宫缩仍较弱，按协调性宫缩乏力处理。在子宫收缩未恢复为协调性之前，严禁使用缩宫剂。对伴有胎儿窘迫征象及头盆不称者或应用镇静剂后宫缩仍不协调，应考虑行剖宫产术。

【妊娠合并症】

属于心脏病孕妇产前血流动力学变化的项目，错误的是

- A. 第一产程宫缩使周围循环阻力增加，全身血容量减少
- B. 第二产程宫缩时屏气，肺循环压力加大
- C. 第二产程腹压增大，内脏血液涌向心脏，回心血量增加
- D. 第三产程胎儿娩出后，子宫胎盘循环停止，大量血液进入体循环，回心血量增加
- E. 第三产程子宫迅速缩小，腹压减低，大量血液回到内脏，回心血量减少

【正确答案】A

【答案解析】心脏病孕妇第一产程每次宫缩时，增加了周围血循环的阻力和回心血量，增加了全身血容量。第三产程：宫缩使子宫骤然缩小，血液大量进入体循环，使回心血量急剧增加。另外因子宫缩小，腹压骤降，内脏血管扩张，大量血液流向内脏，回心血量减少，这两种血流动力学的急剧变化，使心脏负担增加。

【女性生殖系统炎症】

盆腔炎手术治疗的指征不包括

- A. 体温不降
- B. 脓肿破裂
- C. 输卵管积脓
- D. 包块减小
- E. 症状加重

【正确答案】D

【答案解析】盆腔炎性疾病的手术治疗指征：①药物治疗 48~72 小时，体温不降、症状加重、包块增大者；②输卵管积脓或输卵管卵巢脓肿；③脓肿破裂。

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2019 年第 48 期（word 版下载）

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】

