

2019年中西医助理医师-模拟试题（第二单元）

1. 上行感染常见的病原菌是

- A. 金黄色葡萄球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 链球菌
- D. 绿脓杆菌
- E. 结核杆菌

【正确答案】 B

【答案解析】 上行感染为尿路感染的主要途径，约占尿路感染的95%，常见的病原菌为大肠杆菌。

2. 颈内动脉闭塞会出现的症状是

- A. 感觉缺失
- B. 面瘫
- C. 舌瘫
- D. 单眼一过性黑蒙
- E. 意识障碍

【正确答案】 D

【答案解析】 颈内动脉闭塞可出现病灶侧单眼一过性黑蒙，偶可为永久性视力障碍（因眼动脉缺血），或病灶侧Horner征这一特征性病变；常见症状有对侧偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲等（大脑中动脉或大脑中、前动脉缺血）；主侧半球受累可有失语症。

3. 治疗心胆气虚之不寐选用

- A. 归脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 六味地黄丸
- E. 安神定志丸

【正确答案】 E

【答案解析】 不寐之心胆气虚证治宜益气镇惊，安神定志，选用安神定志丸合酸枣仁汤加减。

4. 与慢性肾小球肾炎密切相关的脏腑是

- A. 肺肾
- B. 肺胃
- C. 肺脾
- D. 脾肾
- E. 肝脾

【正确答案】 C

【答案解析】 慢性肾小球肾炎的病位在肾，与肺脾相关。

5. 在肾病综合征中，确定肾组织病理类型的唯一手段是

- A. 血清蛋白测定
- B. 肾功能测定
- C. 血脂测定

- D. 尿常规
- E. 肾活检

【正确答案】 E

【答案解析】 肾活检是确定肾组织病理类型的唯一手段。

6. 下列不属于缺铁性贫血组织中含铁酶类减少的表现的是

- A. 烦躁
- B. 记忆力减退
- C. 注意力不集中
- D. 异食癖
- E. 毛发干枯

【正确答案】 B

【答案解析】 缺铁性贫血临床表现分为两类：一类为贫血本身的表现；另一类为组织中含铁酶类减少，引起细胞功能紊乱而产生的症状和体征。B项属于贫血本身的表现。

7. 关于类风湿关节炎的肿胀特点的叙述不正确的是

- A. 呈不对称性
- B. 以腕关节最常受累
- C. 以掌指关节最常受累
- D. 以近端指间关节最常受累
- E. 以膝关节最常受累

【正确答案】 A

【答案解析】 类风湿关节炎的肿胀呈对称性，以腕、掌指关节、近端指间关节、膝关节最常受累。

8. 癫痫发作时突然与外界失去接触，进行一些无意识的动作为

- A. 发作期被动症
- B. 发作期自动症
- C. 缓解期被动症
- D. 缓解期自动症
- E. 发作期多动症

【正确答案】 B

【答案解析】 癫痫患者在发作时突然与外界失去接触，进行一些无意识的动作，称发作期自动症。

9. 喘证涉及的相关脏腑为

- A. 肺肾
- B. 肺脾
- C. 肺肝
- D. 肝脾
- E. 肝肾

【正确答案】 D

【答案解析】 喘证的发病机理主要在肺和肾，涉及肝脾。

10. 尿路感染的中医范畴不包括的是

- A. 热淋
- B. 劳淋
- C. 腰痛
- D. 虚劳
- E. 暗疮

【正确答案】E

【答案解析】尿路感染归属于中医学“淋证”（热淋、劳淋等）、“腰痛”、“虚劳”等范畴。

11. 治疗尿路感染的肾阴不足，湿热留恋证选用的方药是

- A. 八正散
- B. 石苇散
- C. 丹栀逍遥散
- D. 无比山药丸
- E. 知柏地黄丸

【正确答案】E

【答案解析】尿路感染之肾阴不足，湿热留恋证。证候：小便频数，滞涩疼痛，尿黄赤混浊，腰膝酸软，手足心热，头晕耳鸣，四肢乏力，口干口渴，舌质红少苔，脉细数。治法：滋阴益肾，清热通淋。方药：知柏地黄丸加减。

12. 严重中毒时的血液系统表现不包括

- A. 出血
- B. 肾缺血
- C. 溶血性贫血
- D. 血液凝固障碍
- E. 白细胞减少和再生障碍性贫血

【正确答案】B

【答案解析】严重中毒时血液系统表现：（1）溶血性贫血。（2）出血。（3）白细胞减少和再生障碍性贫血。（4）血液凝固障碍。

13. 关于自汗盗汗的病因病机不正确的是

- A. 邪客表虚、营卫不和
- B. 肺气亏虚、卫表不固
- C. 阳气虚衰、津液失摄
- D. 阴虚火旺、虚火灼津
- E. 火热熏灼、迫血妄行

【正确答案】E

【答案解析】自汗盗汗大多由邪客表虚、营卫不和，肺气亏虚、卫表不固，阳气虚衰、津液失摄，阴虚火旺、虚火灼津，热邪郁蒸、迫津外泄等所致。

14. 齿衄阴虚火旺选用的方剂是

- A. 桑杏汤
- B. 玉女煎

- C. 龙胆泻肝汤
- D. 六味地黄丸合茜根散
- E. 加味清胃散合泻心汤

【正确答案】D

【答案解析】齿衄阴虚火旺证。证候：齿衄，血色淡红，起病较缓，常因受热及烦劳而诱发，齿摇不坚，舌质红，苔少，脉细数。治法：滋阴降火，凉血止血。方药：六味地黄丸合茜根散加减。

15. 慢性胃炎的肝胃不和证，治疗首选方剂为

- A. 柴胡疏肝散
- B. 四君子汤
- C. 三仁汤
- D. 益胃汤
- E. 失笑散

【正确答案】A

【答案解析】慢性胃炎之肝胃不和证。证候：胃脘胀痛或痛窜两胁，每因情志不舒而病情加重，得暖气或矢气后稍缓，暖气频频，嘈杂泛酸，舌质淡红，苔薄白，脉弦。治法：疏肝理气，和胃止痛。方药：柴胡疏肝散加减。

16. 治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物是

- A. 免疫抑制药
- B. 维生素 E
- C. 糖皮质激素
- D. 雄激素
- E. 氨肽素

【正确答案】C

【答案解析】糖皮质激素是治疗特发性血小板减少性紫癜的首选药物。近期有效率约为 80%。常用泼尼松口服，病情严重者用等效量地塞米松或甲泼尼龙静脉滴注，好转后改口服。

17. 甲亢的心脏表现最常见的是

- A. 早搏
- B. 心动过缓
- C. 心律不齐
- D. 持久性心动过缓
- E. 阵发性心动过缓

【正确答案】A

【答案解析】甲亢心脏心律失常：以早搏最为常见，阵发性或持续性心房纤颤或心房扑动、房室传导阻滞等也可发生。

18. 慢性粒细胞性白血病之阴虚内热证，治疗首选

- A. 清营汤
- B. 八珍汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 青蒿鳖甲汤

E. 犀角地黄汤

【正确答案】D

【答案解析】慢性粒细胞性白血病之阴虚内热证。证候：低热，多汗或盗汗，头晕目眩，虚烦，面部潮红，口干口苦，消瘦，手足心热，皮肤瘀斑或鼻衄、齿衄，舌质光红，苔少，脉细数。治法：滋阴清热，解毒祛瘀。方药：青蒿鳖甲汤加减。

19. 支气管哮喘中医证型之寒哮证选用的方剂是

A. 射干麻黄汤

B. 玉屏风散

C. 六君子汤

D. 定喘汤

E. 金匮肾气丸

【正确答案】A

【答案解析】支气管哮喘中医证型之寒哮证。证候：呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷如塞，咳不甚，咯吐不爽，痰稀薄色白，面色晦滞，口不渴或渴喜热饮，天冷或受寒易发，形寒畏冷，初起多兼恶寒、发热、头痛等表证，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。治法：温肺散寒，化痰平喘。方药：射干麻黄汤加减。

20. 肺炎球菌肺炎典型的痰色是

A. 砖红色

B. 铜绿色

C. 暗红色

D. 咖啡色

E. 铁锈色

【正确答案】E

【答案解析】肺炎链球菌肺炎咯铁锈色痰；上消化道出血呕出物多为咖啡色；上消化道出血便血呈暗红色。

21. 肺门淋巴结结核多见于

A. 儿童

B. 孕妇

C. 青壮年

D. 年轻男性

E. 年轻女性

【正确答案】A

【答案解析】肺门淋巴结结核多见于儿童或老年。

22. 急性肺水肿的体征不包括下列哪项

A. 心率减慢

B. 心尖区第一心音减弱

C. 肺动脉瓣区第二心音亢进

D. 两肺满布湿性啰音和哮鸣音

E. 心尖部常可闻及舒张早期奔马律

【正确答案】A

【答案解析】急性肺水肿的体征：表现为心率增快，心尖区第一心音减弱，心尖部常可闻及舒张早期奔马律，肺动脉瓣区第二心音亢进，两肺满布湿性啰音和哮鸣音。

23. 重度一氧化碳中毒昏迷时，应尽早采取

- A. 血液透析
- B. 高压氧疗法
- C. 冬眠疗法
- D. 20%甘露醇快速静脉滴注
- E. ATP 静脉滴注

【正确答案】B

【答案解析】吸入氧气可促使 COHb 解离，纠正机体缺氧；高压氧下，可加速 COHb 解离，促进 CO 清除，既可迅速纠正组织缺氧，又可加速 CO 的清除。高压氧治疗 CO 中毒可缩短病程，降低病死率；且可减少迟发性脑病的发生。因此，对中、重度 CO 中毒，如有条件应尽早采取高压氧治疗；对危重病人可考虑换血疗法。

24. 发生在段支气管以下的癌肿称为周围型肺癌，约占

- A. 1/2
- B. 2/3
- C. 3/4
- D. 4/5
- E. 1/4

【正确答案】E

【答案解析】发生在段支气管以下的癌肿称为周围型肺癌，约占 1/4，以腺癌较为多见。

25. 下列关于心源性哮喘不正确的叙述是

- A. 可见左心扩大
- B. 常咳出粉红色泡沫痰
- C. 两肺可闻及广泛哮鸣音
- D. 心尖部可闻及收缩期杂音
- E. 多有高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病史

【正确答案】D

【答案解析】心源性哮喘多有高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、风湿性心脏病和二尖瓣狭窄等病史和体征。阵发性咳嗽，常咳出粉红色泡沫痰，两肺可闻及广泛的湿啰音和哮鸣音，左心界扩大，心率增快，心尖部可闻及奔马律。胸部 X 线检查可见心脏增大。

26. 水肿的主要病变脏腑是

- A. 肝、脾、胃
- B. 肝、胃、肾
- C. 肺、脾、肾
- D. 肺、肝、脾
- E. 肺、肝、肾

【正确答案】C

【答案解析】水肿发病的机理主要在于肺失通调，脾失转输，肾失开合，三焦气化不利。其病位在肺、脾、肾，而关键在肾。在发病过程中三脏又是相互联系，相互影响的。肺脾肾三脏与水肿之发病，是以肾为本，以肺为标，而以脾为制水之脏，实为水肿发病的关键所在。

27. 消渴病上灼肺津，下耗肾阴的病机是

- A. 肺燥阴伤
- B. 胃热偏盛
- C. 肾阴不足
- D. 感受热邪
- E. 体质素虚

【正确答案】B

【答案解析】消渴病的主要病位在肺、胃、肾，而以肾为关键。肺燥阴虚，津液失于输布，则胃失濡润；胃热偏盛，则上灼肺津，下耗肾阴；肾阴不足，阴虚火旺，上炎肺胃。

28. 原发性肝癌淋巴结转移最常见的部位是

- A. 脾脏
- B. 胰腺
- C. 肝门淋巴结
- D. 锁骨上淋巴结
- E. 腋窝淋巴结

【正确答案】C

【答案解析】考点：原发性肝癌的肝外转移。原发性肝癌肝外转移：①血行转移：最常见的转移部位是肺。②淋巴转移：最常转移到肝门淋巴结。③种植转移少见。

29. 关于溶血反应的治疗，下列哪项是不正确的

- A. 抗休克
- B. 保护肾功能
- C. 防治弥散性血管内凝血
- D. 换血治疗
- E. 使用抗组胺药物

【正确答案】E

【答案解析】溶血反应的处理包括（1）抗休克（2）保护肾功能（3）若DIC明显，则使用肝素（4）必要时行血浆交换治疗（5）若血压低，则使用多巴胺、间羟胺升压。

30. 便时痔核经常脱出肛外，不能自行还纳为

- A. I期内痔
- B. II期内痔
- C. III期内痔
- D. IV期内痔
- E. 外痔

【正确答案】C

【答案解析】III期内痔：便血少或无便血，痔核大，呈灰白色，便时痔核经常脱出肛外，甚至行走、咳嗽、喷嚏、站立时也会脱出肛门，不能自行还纳，须用手托、平卧休息或热敷后方能复位。

31. 辨疼痛性质，病变在皮肉者多表现为

- A. 胀痛
- B. 裂痛
- C. 灼痛
- D. 绞痛
- E. 抽掣痛

【正确答案】 B

【答案解析】 裂痛：痛如撕裂，病变多在皮肉，如肛裂、手足皲裂较深者。

32. 肠梗阻的病因中，2岁以下小儿最多见的是

- A. 肠道先天畸形
- B. 肠套叠
- C. 蛔虫团堵塞
- D. 肿瘤堵塞
- E. 粪块堵塞

【正确答案】 B

【答案解析】 新生婴儿以肠道先天性畸形最多见，2岁以下小儿则肠套叠多见，3岁以上儿童以蛔虫团堵塞所致的肠梗阻居多，老年人则以肿瘤及粪块堵塞常见。

33. 腹股沟斜疝与直疝的区别叙述正确的是

- A. 斜疝多见于老年体弱者，直疝多见于儿童及青壮年
- B. 斜疝是经腹股沟三角直接由后向前突出，不进入阴囊，直疝是经腹股沟突出，由外伤向右下前斜进入阴囊
- C. 斜疝疝块回纳后压住内环疝块仍突出，直疝疝块不再突出
- D. 直疝精索在疝囊前方，斜疝是精索在疝囊后方
- E. 直疝较高，斜疝较低

【正确答案】 D

【答案解析】 直疝精索在疝囊前方，斜疝是精索在疝囊后方，其他选项都是颠倒过来的。

34. 硬膜外麻醉的术后并发症不包括

- A. 脊髓前动脉综合症
- B. 硬膜外脓肿
- C. 硬膜外血肿
- D. 血压下降
- E. 神经损伤

【正确答案】 D

【答案解析】 硬膜外麻醉术后并发症：神经损伤、硬膜外血肿、硬膜外脓肿、脊髓前动脉综合征等。血压下降为硬膜外麻醉的术中并发症。

35. 血栓闭塞性脉管炎治疗中改善微循环的药物是

- A. 罂粟碱
- B. 潘生丁
- C. 烟酸

- D. 阿司匹林
- E. 己酮可可碱

【正确答案】 E

【答案解析】 血栓闭塞性脉管炎改善微循环的药物：（1）前列腺素 E₁。（2）己酮可可碱。

36. 气管内插管的拔管指征不包括

- A. 吞咽反射恢复
- B. 血氧饱和度正常
- C. 呼吸道通气量正常
- D. 病人处于完全清醒状态
- E. 肌张力大部分恢复正常

【正确答案】 E

【答案解析】 气管内插管的拔管指征：（1）病人完全清醒，呼之有明确反应。（2）呼吸道通气量正常，肌张力完全恢复。（3）吞咽反射、咳嗽反射恢复。（4）循环功能良好，血氧饱和度正常。

37. 治疗胰腺损伤之气郁血瘀证，常选用的方剂是

- A. 清营汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 越鞠丸合复元活血汤

【正确答案】 E

【答案解析】 胰腺损伤之气郁血瘀证。证候：上腹部疼痛，向腰背部放射，腹胀，恶心呕吐，上腹部压痛较剧；舌质红，苔黄，脉弦紧。治法：行气止痛，活血祛瘀。方药：越鞠丸合复元活血汤加减。

38. 治疗痈之热毒蕴结证，方剂选用

- A. 清营汤
- B. 清暑汤
- C. 托里消毒散
- D. 防风通圣散
- E. 仙方活命饮

【正确答案】 E

【答案解析】 痈之热毒蕴结证。证候：初起局部起一肿块，上有粟粒状脓头，肿块渐向周围扩大，脓头增多，色红灼热疼痛；舌红，苔黄，脉滑数。治法：和营托毒，清热利湿。方药：仙方活命饮加减。

39. 闭合性损伤不包括下列哪项

- A. 挫伤
- B. 扭伤
- C. 擦伤
- D. 挤压伤
- E. 冲击伤

【正确答案】 C

【答案解析】 选项 C 中擦伤属于开放性损伤，故根据题干要求，正确的选项是 C。

40. 治疗湿疹湿热浸淫证，代表方剂宜选用

- A. 除湿胃苓汤
- B. 仙方活命饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 萆薢渗湿汤合三妙丸

【正确答案】 E

【答案解析】 湿疹之湿热浸淫证。证候：发病急，皮损潮红灼热，瘙痒无休，抓破渗液流脂水；伴身热，心烦，口渴，大便干，尿短赤；舌质红，苔黄或黄腻，脉滑或数。治法：清热利湿。方药：萆薢渗湿汤合三妙丸加减。

41. 呼吸深快，呼出气体带酮味的酸碱平衡失调是

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性碱中毒
- D. 代谢性酸中毒
- E. 混合性碱中毒

【正确答案】 D

【答案解析】 代谢性酸中毒是临床上酸碱平衡失调中最常见第一种类型。是由于体内非挥发性酸积聚或生成过多，或因失碱过多，使血浆 HCO_3^- 原发性减少所引起。诊断：（1）有严重腹泻、肠痿等病史。（2）呼吸深而快，呼吸频率有时可达 40~50 次/分，呼出气带有酮味。

（3）血气分析 pH 值、 HCO_3^- 明显下降、 PCO_2 在正常范围或有所降低，AB、SB、BB 均降低，BE 负值增大。（4）酸中毒程度的估计可比照 CO_2CP ；轻度酸中毒 CO_2CP 为 15~22mmol/L；中度酸中毒 CO_2CP 为 8~15mmol/L；重度酸中毒 CO_2CP < 8mmol/L。

42. 治疗子痫的痰火上扰证选用的方剂是

- A. 天仙藤散
- B. 羚角钩藤汤
- C. 牛黄清心丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 半夏白术天麻汤

【正确答案】 C

【答案解析】 子痫之痰火上扰证。证候：妊娠晚期，或正值分娩时或新产后，头晕头重，胸闷烦躁泛恶，面浮肢肿，猝然昏不知人，面部口角及四肢抽搐，气粗痰鸣；舌红，苔黄腻，脉弦滑数。治法：清热豁痰，息风开窍。方药：牛黄清心丸。

43. 治疗痰湿阻滞型多囊卵巢综合征，方剂首选的是

- A. 左归丸
- B. 二陈汤
- C. 桂枝茯苓丸
- D. 萆薢渗湿汤

E. 苍附导痰丸合佛手散

【正确答案】E

【答案解析】多囊卵巢综合征之痰湿阻滞证。证候：月经量少，经行延后，甚至停闭，婚久不孕，带下量多，头晕头重，胸闷泛恶，四肢倦怠，形体肥胖，多毛；舌体胖大，色淡，苔白腻，脉滑。治法：燥湿除痰，通络调经。方药：苍附导痰丸合佛手散。

44. 流产后出血的瘀阻子宫证首选方剂是

A. 八珍汤

B. 生化汤

C. 固经丸

D. 苍附导痰丸

E. 甘麦大枣汤

【正确答案】B

【答案解析】流产后出血之瘀阻子宫证。证候：出血量时多时少，或淋漓不净，色紫黯，有血块，小腹阵发性疼痛，腰骶酸胀；舌紫黯，脉细涩。治法：活血化瘀，固冲止血。方药：生化汤。

45. 排卵多发生在下次月经来潮前几日左右

A. 7日

B. 10日

C. 12日

D. 14日

E. 18日

【正确答案】D

【答案解析】排卵多发生在下次月经来潮前14日左右。

46. 治疗妊娠剧吐之肝胃不和证首选的方剂是

A. 逍遥散

B. 柴胡疏肝散

C. 生脉散合增液汤

D. 橘皮竹茹汤加黄连

E. 香砂六君子汤加生姜

【正确答案】D

【答案解析】妊娠剧吐之肝胃不和证。证候：妊娠早期，恶心呕吐，甚则食入即吐，呕吐酸水或苦水，口苦咽干，头晕而胀，胸胁胀痛；舌质红，苔薄黄或黄，脉弦滑数。治法：清肝和胃，降逆止呕。方药：橘皮竹茹汤加黄连。

47. 治疗气虚型产后出血的代表方剂是

A. 保阴煎

B. 归脾汤

C. 生化汤

D. 升举大补汤

E. 胶艾汤加味

【正确答案】D

【答案解析】产后出血之气虚证。证候：新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目花，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白；舌淡，脉虚数。治法：补气固冲，摄血止崩。方药：升举大补汤。

48. 中医古籍中阴道又称为

- A. 子门
- B. 子户
- C. 子处
- D. 子脏
- E. 子肠

【正确答案】E

【答案解析】阴道又称子肠、产道，宫颈外口被称为子门、子户。子宫又称为女子胞、胞宫、胞脏、子脏、子处、血室。

49. 中医上将未嫁女性的阴道口和处女膜称为

- A. 阴户
- B. 产户
- C. 龙门
- D. 胞门
- E. 玉门

【正确答案】E

【答案解析】中医古籍中将外阴称之为阴户，又名四边、产户；将阴毛称为毛际；将阴道口和处女膜称为玉门（未嫁）、龙门（未产）、胞门（已产）。

50. 妊娠剧吐之脾胃虚弱证的治法为

- A. 调气和中，降逆止呕
- B. 健脾和胃，降逆止呕
- C. 清肝和胃，降逆止呕
- D. 调气和胃，降逆止呕
- E. 补脾益胃，降逆止呕

【正确答案】B

【答案解析】妊娠剧吐之脾胃虚弱证。证候：妊娠早期，恶心呕吐，甚则食入即吐，口淡，吐出物为清水或食物，头晕，神疲倦怠，嗜睡；舌淡，苔白，脉缓滑无力。治法：健脾和胃，降逆止呕。方药：香砂六君子汤加生姜。

51. 下列不属于前置胎盘分类的是

- A. 完全性前置胎盘
- B. 中央性前置胎盘
- C. 部分性前置胎盘
- D. 边缘性前置胎盘
- E. 周围性前置胎盘

【正确答案】E

【答案解析】根据胎盘下缘与宫颈内口的关系，前置胎盘分为3类：（1）完全性前置胎盘：宫颈内口全被胎盘覆盖。又称为中央性前置胎盘。（2）部分性前置胎盘：宫颈内口部分被

胎盘覆盖。(3) 边缘性前置胎盘：胎盘下缘附着于子宫下段，胎盘边缘达宫颈内口，但未超越宫颈内口。选项 E 为干扰项，其不属于前置胎盘的分类范畴。故根据题干要求，正确的选项是 E。

52. 子宫脱垂最主要的病因是

- A. 分娩损伤
- B. 慢性咳嗽
- C. 长期排便困难
- D. 盆底退行性变
- E. 盆底组织发育不良

【正确答案】A

【答案解析】子宫脱垂的西医病因：(1) 分娩损伤：为最主要的病因。(2) 长期腹压增加：慢性咳嗽、长期排便困难、经常超重负荷、腹部巨大肿瘤、大量腹水等均使腹内压力增加，迫使子宫下移。(3) 盆底组织发育不良或退行性变。

53. 治疗寒凝血瘀所致的子宫内膜异位症，方剂宜首选的是

- A. 膈下逐瘀汤
- B. 少腹逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 清热调血汤
- E. 桃红四物汤

【正确答案】B

【答案解析】子宫内膜异位症之寒凝血瘀证。证候：经前或经行小腹冷痛、绞痛，拒按，得热痛减，经行量少，色紫黯，或经血淋漓不净，或月经延期，不孕，下腹结块，固定不移，形寒肢冷，面色青白；舌紫黯，苔薄白，脉沉弦或紧。治法：温经散寒，化瘀止痛。方药：少腹逐瘀汤。

54. 治疗肝肾不足型闭经的首选方为

- A. 归肾丸
- B. 加减一阴煎
- C. 知柏地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】A

【答案解析】闭经之肝肾不足证。证候：年满十六周岁尚未行经，或初潮较晚，月经量少，周期延后，渐致经闭不行，头晕耳鸣，腰腿酸软，两目干涩，或夜尿频多，阴部干涩，带下量少；舌质淡，苔少，脉沉细弱。治法：滋补肝肾，养血调经。方药：归肾丸。

55. 以不思乳食，食而不化，脘腹胀满，暖气酸腐，大便溏泄，气味酸臭为特征的是

- A. 厌食
- B. 积滞
- C. 疳证
- D. 鼓胀
- E. 痢疾

【正确答案】B

【答案解析】积滞的诊断要点：（1）有伤乳、伤食史。（2）以不思乳食，食而不化，脘腹胀满，暖气酸腐，大便溏泄或便秘，气味酸臭为特征。（3）可伴有烦躁不安，夜间哭闹或呕吐等症。（4）大便化验检查，可见不消化食物残渣、脂肪滴。

56. 小儿注意力缺陷多动障碍的痰火内扰证常用方是

- A. 归脾汤
- B. 涤痰汤
- C. 杞菊地黄丸
- D. 黄连温胆汤
- E. 麻杏石甘汤

【正确答案】D

【答案解析】小儿注意力缺陷多动障碍之痰火内扰证。证候：多动多语，烦躁不宁，冲动任性，难以制约，兴趣多变，注意力不集中，胸闷烦热，懊恼不眠，口苦食少，溲赤便结，舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热化痰，宁心安神。方药：黄连温胆汤加减。

57. 小儿病毒性心肌炎心阳虚弱证常用方剂是

- A. 生脉散合参附龙牡救逆汤
- B. 葛根黄芩黄连汤
- C. 附子理中汤合四神丸
- D. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤
- E. 瓜蒌薤白半夏汤合失笑散

【正确答案】D

【答案解析】病毒性心肌炎之心阳虚弱证。证候：心悸怔忡，神疲乏力，畏寒肢冷，面色苍白，头晕多汗，甚则肢体浮肿，呼吸急促，舌质淡胖或淡紫，脉缓无力或结代。治法：温振心阳，宁心复脉。方药：桂枝甘草龙骨牡蛎汤加减。

58. 猩红热之邪侵肺卫证，治法宜选用

- A. 辛凉宣透，清热利咽
- B. 疏风透疹，清热解毒
- C. 清热解毒，佐以透发
- D. 宣肺开闭，清热解毒
- E. 清热解毒，利咽消肿

【正确答案】A

【答案解析】猩红热之邪侵肺卫证。证候：发热骤起，头痛，恶寒，灼热无汗，或伴呕吐，咽部红肿疼痛，上腭有粟粒样红疹，皮肤潮红，丹疹隐隐，舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数有力。治法：辛凉宣透，清热利咽。方药：解肌透痧汤加减。

59. 下列关于小儿中药用量叙述错误的是

- A. 新生儿用成人量的 1/6
- B. 乳婴儿为成人量的 1/2
- C. 幼儿为成人量的 1/2
- D. 学龄儿童为成人量的 2/3
- E. 学龄儿童可用成人量

【正确答案】B

【答案解析】新生儿用成人量的1/6，乳婴儿为成人量的1/3，幼儿为成人量的1/2，学龄儿童为成人量的2/3或成人量。

60. 过敏性紫癜肝肾阴虚证常用方剂是

- A. 四妙散
- B. 银翘散
- C. 茜根散
- D. 犀角地黄汤
- E. 葛根黄芩黄连汤

【正确答案】C

【答案解析】过敏性紫癜之肝肾阴虚证。证候：起病缓慢，时发时隐，或紫癜已退，仍有腰背酸软，五心烦热，潮热盗汗，头晕耳鸣，尿血，便血，舌质红，少苔，脉细数。治法：滋阴补肾，活血化瘀。方药：茜根散加减。

61. 治疗反复呼吸道感染肺脾两虚、气血不足证的首选方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 人参养荣汤
- C. 附子理中汤
- D. 黄芪桂枝五物汤
- E. 炙甘草汤合生脉散

【正确答案】A

【答案解析】反复呼吸道感染之肺脾两虚，气血不足证。证候：屡受外邪，咳喘迁延不已，或愈后又作，面黄少华，厌食，或恣食肥甘生冷，肌肉松弛，或大便溏薄，咳嗽多汗，唇口色淡，舌质淡红，脉数无力，指纹淡。治法：健脾益气，补肺固表。方药：玉屏风散加味。

62. 治疗病毒性脑炎痰瘀阻络证的首选方剂是

- A. 二陈汤
- B. 导痰汤
- C. 涤痰汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 指迷茯苓丸合桃红四物汤

【正确答案】E

【答案解析】病毒性脑炎之痰瘀阻络证。证候：神识不明，肢体不用，僵硬强直，或震颤抖动，肌肉萎软，或见面瘫、斜视，舌紫暗或有瘀点，舌苔薄白，脉弦滑。治法：涤痰通络，活血化瘀。方药：指迷茯苓丸合桃红四物汤加减。

63. 治疗小儿热性哮喘的治法是

- A. 健脾化痰
- B. 行气化痰
- C. 清热化痰，止咳定喘
- D. 温肺散寒，化痰定喘
- E. 降气化痰，补肾纳气

【正确答案】C

【答案解析】热性哮喘。证候：咳喘哮鸣，声高息涌，痰稠色黄，发热面红，胸闷膈满，渴喜冷饮，小便黄赤，大便干燥或秘结，舌红，舌苔黄腻，脉象滑数。治法：清热化痰，止咳定喘。方药：麻杏石甘汤或定喘汤加减。故此题的正确选项是C。

64. 治疗麻疹收没期首选方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 清解透表汤
- C. 宣毒发表汤
- D. 清咽下痰汤
- E. 麻杏石甘汤

【正确答案】A

【答案解析】麻疹阴津耗伤证（收没期）。证候：疹点出齐后，发热渐退，咳嗽渐减，胃纳增加，精神好转，疹点依次渐回，皮肤呈糠麸状脱屑，留有色素沉着，舌红少津，苔薄，脉细数。治法：养阴生津，清解余邪。方药：沙参麦冬汤加减。

65. 治疗暑邪感冒的首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 清营汤
- C. 新加香薷饮
- D. 普济消毒饮
- E. 荆防败毒散

【正确答案】C

【答案解析】暑邪感冒的证候：发热，无汗或汗出热不解，头晕、头痛，鼻塞，身重困倦，胸闷，泛恶，口渴心烦，食欲不振，或有呕吐、泄泻，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉数或指纹紫滞。治法：清暑解表。方药：新加香薷饮加减。

66. 治疗小儿气虚咳嗽的常用方剂是

- A. 归脾汤
- B. 六君子汤
- C. 四君子汤
- D. 附子理中汤
- E. 沙参麦冬汤

【正确答案】B

【答案解析】气虚咳嗽证候：咳嗽反复不已，咳而无力，痰白清稀，面色苍白，气短懒言，语声低微，自汗畏寒，舌淡嫩，边有齿痕，脉细无力。治法：健脾补肺，益气化痰。方药：六君子汤加味。

67. 治疗特发性血小板减少性紫癜气滞血瘀证的首选方剂是

- A. 茜根散
- B. 桃仁汤
- C. 大补阴丸
- D. 犀角地黄汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】B

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜之气滞血瘀证。证候：病程缠绵，出血反复不止，皮肤紫癜色暗，面色晦暗，舌暗红或紫或边有紫斑，苔薄白，脉细涩。治法：活血化瘀，理气止血。方药：桃仁汤加减。

68. 患者，女，55岁，诊断为心律失常，症见心悸不宁，心烦少寐，头晕目眩，手足心热，耳鸣腰酸，舌质红，苔少，脉细数。其中医治法是

- A. 温补心阳，安神定悸
- B. 补血养心，益气安神
- C. 清热化痰，宁心安神
- D. 镇惊定志，养心安神
- E. 滋阴清火，养心安神

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现，辨证为阴虚火旺证。证候：心悸不宁，心烦少寐，头晕目眩，手足心热，盗汗，耳鸣，舌质红，少苔，脉细数。治法：滋阴清火，养心安神。方药：天王补心丹加减。

69. 患者，男，32岁，胃脘痞闷，胃部胀痛，痛窜胁背，气怒痛重，暖气呕吐，嘈杂吐酸，舌苔薄白，脉弦。治疗首选方剂为

- A. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- B. 保和丸加减
- C. 黄芪建中汤
- D. 失笑散合丹参饮加减
- E. 柴胡疏肝散加减

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的症状可以判断属于肝气犯胃证。证候：胃脘痞闷，胃部胀痛，痛窜胁背，气怒痛重，暖气呕吐，嘈杂吐酸，舌苔薄白，脉弦。治法：疏肝和胃，理气止痛。方药：柴胡疏肝散加减。

70. 患者，男，23岁，痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。其中医诊断为

- A. 痫证之风痰闭阻证
- B. 痫证之痰火扰神证
- C. 痫证之瘀阻脑络证
- D. 痫证之心脾两虚证
- E. 痫证之心肾亏虚证

【正确答案】E

【答案解析】根据题干辨证为痫证之心肾亏虚证。证候：痫病频发，神思恍惚，心悸，健忘失眠，头晕目眩，两目干涩，面色晦暗，耳轮焦枯不泽，腰膝酸软，大便干燥，舌质淡红，脉沉细而数。治法：补益心肾，潜阳安神。方药：左归丸合天王补心丹加减。

71. 患者，男性，56岁，有慢性阻塞性肺疾病史，现喘促短气，言语无力，痰吐稀薄，自汗畏风，面色苍白，食少脘胀，食后即便，舌胖，边有齿痕，苔白腻，脉细弱，治疗首选方为

- A. 补虚汤合参蛤散
- B. 真武汤合五苓散

- C. 生脉散合六君子汤
- D. 二陈汤合三子养亲汤
- E. 越婢加半夏汤

【正确答案】C

【答案解析】根据患者的病史不难判断，患者是慢性阻塞性肺疾病。诊断为肺脾气虚证，治疗应健脾益肺，方选生脉散合六君子汤加减。

72. 患者，女，48岁。症见腹中气聚，攻窜胀痛，时聚时散，脘闷纳呆，舌苔白腻，脉象弦缓。治宜选用

- A. 六磨汤
- B. 金铃子散
- C. 失笑散
- D. 木香顺气散
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】D

【答案解析】积聚之肝气郁结证。证候：腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，脘肋胀闷不适，苔薄，脉弦等。治法：疏肝解郁，行气散结。方药：逍遥散、木香顺气散加减。

73. 患者，女，38岁。症见：发热，热势较低，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面色少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。辨证应属

- A. 阴虚发热证
- B. 气虚发热证
- C. 血虚发热证
- D. 血瘀发热证
- E. 气郁发热证

【正确答案】C

【答案解析】根据患者的表现辨证为血虚发热证。证候：发热，热势多为低热，头晕眼花，体倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。治法：益气养血。方药：归脾汤加减。

74. 患者，女，57岁。高血压病史10余年。因情绪激动后剧烈头痛，面色潮红，烦躁不安，恶心呕吐，心悸，汗出，视物模糊。查体：BP：265/135mmHg，心率118次/分。诊断为

- A. 高血压脑病
- B. 高血压危象
- C. 高血压三期
- D. 恶性高血压
- E. 单纯收缩期高血压

【正确答案】B

【答案解析】高血压危象：因紧张、疲劳、寒冷、嗜铬细胞瘤发作、突然停用降压药等诱因，小动脉发生强烈痉挛，血压急剧上升，影响重要脏器血液供应而产生危急症状。在高血压早期与晚期均可发生。危象发生时，出现头痛、烦躁、眩晕、恶心、呕吐、心悸、气急及视力模糊等严重症状，以及伴有痉挛动脉（椎-基底动脉、颈内动脉、视网膜动脉、冠状动脉等）累及相应的靶器官缺血症状。

75. 患者，男，62岁，有肺心病病史6年，现喘咳无力，气短难续，痰吐不爽，心悸，胸闷，口干，面色晦暗，唇甲紫绀，神疲乏力，舌淡暗，脉细涩无力。其证型是

- A. 风热犯肺证
- B. 痰热壅肺证
- C. 痰浊壅肺证
- D. 痰蒙清窍证
- E. 气虚血瘀证

【正确答案】E

【答案解析】慢性肺源性心脏病气虚血瘀证。证候：喘咳无力，气短难续，痰吐不爽，心悸，胸闷，口干，面色晦暗，唇甲紫绀，神疲乏力，舌淡暗，脉细涩无力。治法：益气活血，止咳化痰。方药：生脉散合血府逐瘀汤加减。

76. 某女，32岁，病起3日，恶寒发热，鼻塞流涕，少汗身痛，咳嗽气急，痰稠色黄，咽痛声哑，苔薄黄，舌尖红，脉浮数。证属

- A. 风寒束表证
- B. 风热犯表证
- C. 暑湿伤表证
- D. 气虚感冒
- E. 阴虚感冒

【正确答案】B

【答案解析】风热犯表证证候：身热较著，微恶风，汗泄不畅，头胀痛，面赤，咳嗽，痰黏或黄，咽燥，或咽喉乳蛾红肿疼痛，鼻塞，流黄浊涕，口干欲饮，舌苔薄白微黄，舌边尖红，脉浮数。治法：辛凉解表。方药：银翘散或葱豉桔梗汤加减。

77. 某女，22岁，喘逆上气，息粗鼻扇。咳而不爽，痰吐稠黏，形寒身热，身痛无汗，口渴，苔薄白或黄、质红，脉浮数。治疗方剂宜首选

- A. 麻黄汤
- B. 小青龙汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 桑白皮汤
- E. 三子养亲汤

【正确答案】C

【答案解析】喘证之表寒肺热证。证候：喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，有汗或无汗，口渴，苔薄白或罩黄，舌边红，脉浮数或滑。治法：解表清里，化痰平喘。方药：麻杏石甘汤加减。

78. 患者，男，42岁。患慢性肝炎十余年。近一周来出现腹胀大，按之不坚，胁下胀满疼痛，纳食减少，食后作胀，得暖气、矢气稍减，小便短少，苔白腻，脉弦。选用的治法为

- A. 疏肝理气，运脾利湿
- B. 温中健脾，行气利水
- C. 清热利湿，攻下逐水
- D. 活血化瘀，行气利水
- E. 温补脾肾，化气利水

【正确答案】A

【答案解析】鼓胀之气滞湿阻证。证候：腹胀按之不坚，胁下胀满或疼痛，饮食减少，食后胀甚，得暖气、矢气稍减，小便短少，舌苔薄白腻，脉弦。治法：疏肝理气，运脾利湿。方药：柴胡疏肝散合胃苓汤加减。

79. 患者，女，24岁。因数日前淋雨后出现身体不适，现症见四肢痿软，身体困重，麻木、微肿，以下肢为主，伴有发热，胸痞脘闷，小便短赤涩痛，苔黄腻，脉细数。其中医治法是

- A. 清热解毒，凉血活血
- B. 清热润燥，养肺生津
- C. 清热利湿，通利筋脉
- D. 补脾益气，健运升清
- E. 补益肝肾，滋阴清热

【正确答案】C

【答案解析】结合患者病因及症状，诊断患者为痿证之湿热浸淫，气血不运证，治宜清热利湿，通利筋脉，选用加味二妙散加减。

80. 患者，女，35岁，全身性冻伤，现症见：四肢厥逆，恶寒蜷卧，极度疲乏，昏昏欲睡，呼吸微弱；苔白，脉沉微细。治疗应选用的方药是

- A. 四妙勇安汤
- B. 葛根芩连汤
- C. 人参养荣汤
- D. 四逆加入参汤
- E. 人参养荣汤或八珍汤

【正确答案】D

【答案解析】患者为冷伤之阴盛阳衰证，治宜回阳救逆、温通血脉，选用四逆加入参汤加减。

81. 患者，女，42岁，胃溃疡病史5年，现症见：全腹痛，腹膜刺激征明显，肝浊音界消失，X线检查可见膈下游离气体。诊断考虑为

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 胃溃疡穿孔
- D. 急性胃肠炎
- E. 急性肠系膜淋巴结炎

【正确答案】C

【答案解析】胃十二指肠溃疡穿孔：多有上消化道溃疡病史，突然出现上腹部剧烈疼痛并迅速波及全腹。腹膜刺激征明显，多有肝浊音界消失，可出现休克，X线检查常可发现膈下游离气体。

82. 患者，男，65岁，西医诊断为动脉硬化性闭塞症，表现为全身怕冷，肢体发凉，肌肉枯萎，神疲乏力，足跟及腰疼痛，阳痿，性欲减退，食少纳呆，膀胱胀满；舌质淡，苔白，脉沉细。选用的治法为

- A. 清热解毒、利湿通络
- B. 补肾健脾、益气活血
- C. 活血化瘀、通络止痛
- D. 温经散寒、活血化瘀

E. 补气养血、益气通络

【正确答案】B

【答案解析】根据患者的表现诊断为脾肾阳虚证。证候：年老体弱，全身怕冷，肢体发凉，肌肉枯萎，神疲乏力，足跟及腰疼痛，阳痿，性欲减退，食少纳呆，膀胱胀满；舌质淡，苔白，脉沉细。治法：补肾健脾，益气活血。方药：八珍汤合左归丸或右归丸加减。

83. 患者，男，33岁，急性阑尾炎，中医证型为湿热型，以下不会出现的症状为

- A. 右下腹压痛、反跳痛
- B. 右下腹可扪及包块
- C. 恶心、纳差
- D. 舌红，苔黄腻
- E. 脉细数

【正确答案】E

【答案解析】湿热证。证候：腹痛加剧，右下腹或全腹压痛、反跳痛，腹皮挛急，右下腹可摸及包块；壮热，恶心纳差，便秘或腹泻；舌红苔黄腻，脉弦数或滑数。治法：通腑泻热，利湿解毒。方药：大黄牡丹汤合红藤煎剂加败酱草、白花蛇舌草、蒲公英。

84. 患者，男，28岁，睾丸肿痛剧烈，阴囊红肿灼热，若脓成则按之应指；高热，口渴，小便黄赤短少；舌红苔黄腻，脉洪数。选用的治法为

- A. 滋阴降火
- B. 温经散寒止痛
- C. 益气养阴，清热除湿
- D. 清热解毒，活血透脓
- E. 清热利湿，解毒消肿

【正确答案】D

【答案解析】睾丸炎与附睾炎之火毒炽盛证。证候：睾丸肿痛剧烈，阴囊红肿灼热，若脓成则按之应指；高热，口渴，小便黄赤短少；舌红苔黄腻，脉洪数。治法：清热解毒，活血透脓。方药：仙方活命饮加减。

85. 患者，男，32岁。症见局部疮顶不高，根盘散漫，疮色紫滞，疮口干枯无脓，灼热疼痛；伴有壮热口渴，便秘溲赤，烦躁不安；舌质红绛，苔黄燥，脉洪数。治疗宜选用的方药为

- A. 清营汤
- B. 五味消毒饮
- C. 托里消毒散
- D. 附子理中汤
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】A

【答案解析】根据患者的表现，诊断为全身性感染之火陷证。证候：局部疮顶不高，根盘散漫，疮色紫滞，疮口干枯无脓，灼热疼痛；伴有壮热口渴，便秘溲赤，烦躁不安，甚者神昏谵语、发痉；舌质红绛，苔黄燥或黄腻，脉洪数或滑数。治法：凉血解毒，泄热养阴，清心开窍。方药：清营汤加减。

86. 患者，男，21岁，腹部受伤数周后出现包块，隐痛不适，俯仰转侧则疼痛加重；纳呆便秘，低热；舌偏红，苔黄干，脉细数或弦涩。本病的证型为

- A. 气郁血瘀证
- B. 热毒内蕴证
- C. 气血瘀结证
- D. 肾络损伤证
- E. 气阴两虚证

【正确答案】C

【答案解析】腹部损伤之气血瘀结证。证候：伤后数周或数年上腹部出现包块，隐痛不适，或出现肩背部放射痛，俯仰转侧则疼痛加重；纳呆便秘，低热；舌偏红，苔黄干，脉细数或弦涩。治法：行气活血，化瘀散结。方药：膈下逐瘀汤加味。

87. 男性，35岁。暴饮暴食后，突然腹痛，恶心呕吐，呕吐物为胃内容，吐后疼痛不缓解，腹胀，查体：体温38.3℃，脉搏96次/分，脐周压痛，反跳痛，肌紧张不明显，无移动性浊音，肠鸣音减弱。血白细胞 $12.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞88%。为进一步明确诊断需进行以下哪项检查

- A. 心电图
- B. 动脉造影
- C. 腹部立位平片
- D. 血、尿淀粉酶测定
- E. 肝胆胰脾彩色超声检查

【正确答案】D

【答案解析】患者有暴饮暴食史，并结合患者的症状“腹痛，恶心、呕吐，腹胀，发热及压痛反跳痛”，考虑患者为急性胰腺炎，为了确诊可行血、尿淀粉酶测定检查。

88. 患者，男，58岁。中晚期胃癌合并幽门梗阻，现症见：头晕身重，呕吐痰涎，胃脘痞满疼痛；口淡少食，腹胀便溏，痰核累累；舌淡胖苔浊，脉濡滑。选用的治法为

- A. 疏肝和胃，降逆止痛
- B. 温中散寒，健脾和胃
- C. 养阴清热，和胃止痛
- D. 健脾化湿，软坚散结
- E. 补气养血，健脾补肾

【正确答案】D

【答案解析】根据患者的表现辨证为脾虚痰湿证。证候：多见于中、晚期胃癌合并贲门或幽门梗阻者。头晕身重，呕吐痰涎，胃脘痞满疼痛；口淡少食，腹胀便溏，痰核累累；舌淡胖苔浊，脉濡滑。治法：健脾化湿，软坚散结。方药：参苓白术散合二陈汤加减。

89. 患者，女，18岁，右乳外上线可扪及一圆形肿块，不痛，质地坚韧，表面光滑，边缘清楚，与周围组织无粘连，极易推动，挤压无乳头溢液，腋窝淋巴结不肿大。其诊断最可能的是

- A. 急性乳腺炎
- B. 乳腺癌
- C. 乳房纤维腺瘤
- D. 乳腺囊性增生症
- E. 乳腺导管扩张症

【正确答案】C

【答案解析】乳房纤维腺瘤：乳房肿块；乳房轻微疼痛；乳房内可扪及单个或多个圆形或卵圆形肿块，质地坚韧，表面光滑，边缘清楚，无粘连，极易推动。患乳外观无异常，腋窝淋巴结不肿大。

90. 患者女，30岁，产后1周，恶露过期不止，量较多，色鲜红，质黏稠，有臭气，面色潮红，口燥咽干；舌红，苔少，脉细数。治疗宜选用

- A. 生化汤
- B. 保阴煎
- C. 养荣壮肾汤
- D. 桃红四物汤
- E. 独活寄生汤

【正确答案】B

【答案解析】患者为产后病中晚期产后出血的血热证的表现，治法为养阴清热，安冲止血。方用保阴煎。

91. 患者，女，34岁，已婚。近3年月经停闭，小腹冷痛拒按，得热痛减，形寒肢冷，面色青白；舌紫黯，苔白，脉沉紧。治法为

- A. 养阴清热，养血调经
- B. 燥湿化痰，活血通经
- C. 行气活血，祛瘀通经
- D. 温经散寒，活血通经
- E. 益气健脾，养血调经

【正确答案】D

【答案解析】根据患者的症状可以辨证为闭经之寒凝血瘀证。证候：月经停闭，小腹冷痛拒按，得热痛减，形寒肢冷，面色青白；舌紫黯，苔白，脉沉紧。治法：温经散寒，活血通经。方药：温经汤。

92. 患者，女性，28岁。停经1月余，突发下腹一侧撕裂样剧痛，阴道不规则少量流血，面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，妊娠试验阳性；后穹隆穿刺提示腹腔内出血；舌淡，苔薄白，脉细数无力。诊断为输卵管妊娠破裂。其首选方剂是

- A. 理冲丸
- B. 四逆散
- C. 宫外孕I号
- D. 宫外孕II号
- E. 参附汤合生脉散

【正确答案】E

【答案解析】异位妊娠休克型之气陷血脱证（多见于输卵管妊娠破裂）。证候：停经后突发下腹一侧撕裂样剧痛，阴道不规则少量流血，面色苍白，四肢厥冷，冷汗淋漓，烦躁不安，甚或昏厥；妊娠试验阳性或弱阳性；B型超声或后穹隆穿刺提示腹腔内出血；舌淡，苔薄白，脉细数无力或芤。治法：回阳救逆，益气固脱。方药：参附汤合生脉散。

93. 患者，女，26岁，症见：外阴瘙痒，局部皮肤黏膜薄脆，变白，弹性减弱，腰背酸楚，小便频数，四肢欠温，形寒畏冷，面浮肢肿，纳差便溏，舌淡胖，苔薄白或薄润，脉沉细无力。西医诊断为外阴硬化性苔癣。其首选方剂是

- A. 右归丸
- B. 左归丸
- C. 归肾丸
- D. 二至丸
- E. 人参养荣汤

【正确答案】A

【答案解析】从患者的表现辨证为外阴硬化性苔癣之脾肾阳虚证。脾肾阳虚证证候：外阴瘙痒，局部皮肤黏膜薄脆，变白，弹性减弱，腰背酸楚，小便频数，四肢欠温，形寒畏冷，面浮肢肿，纳差便溏，性欲淡漠；舌淡胖，苔薄白或薄润，脉沉细无力。治法：温肾健脾，养血润燥。方药：右归丸。

94. 患者，女性，30岁，产后1周。现症见：乳少，乳汁清稀，乳房柔软，无胀感，面色少华，神疲乏力，食欲不振，伴有心悸头晕；舌淡白，脉虚细。其治法宜首选

- A. 益气生津，通络下乳
- B. 补气养血，佐以通乳
- C. 益气补血，通络下乳
- D. 养阴补血，通络下乳
- E. 益气养血，通络下乳

【正确答案】B

【答案解析】产后缺乳之气血虚弱证。证候：产后乳少或全无，乳汁清稀，乳房柔软，无胀感，面色少华，神疲乏力，食欲不振，或心悸头晕；舌淡白，脉虚细。治法：补气养血，佐以通乳。

95. 患者女，30岁，已婚。继发加重性痛经伴经量过多3年，经前小腹冷痛，拒按，得热痛减，下腹结块，固定不移，形寒肢冷，舌暗苔白，脉弦紧。已确诊为子宫内膜异位症，治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 桃红四物汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 膈下逐瘀汤右归丸

【正确答案】D

【答案解析】子宫内膜异位症之寒凝血瘀证，方用少腹逐瘀汤。

96. 患者，女性，28岁。西医诊断为功能失调性子宫出血，现症见：月经提前，经量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，食少纳差；舌淡，脉缓弱。治法宜选用

- A. 健脾益气，固冲摄血
- B. 健脾益气，固冲调经
- C. 健脾益气，凉血调经
- D. 补气摄血，固冲调经
- E. 补肾益气，固冲调经

【正确答案】B

【答案解析】患者的表现为功能失调性子宫出血之脾气虚弱证。证候：月经提前，或兼量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。治法：健脾益气，固冲调经。方药：补中益气汤。

97. 患者，女，26岁，症见：妊娠期阴道下血，色深红，质稠，腰腹坠胀作痛，心烦少寐，口干口渴；舌质红，苔黄，脉滑数。其治疗首选方剂是

- A. 胎元饮
- B. 保阴煎
- C. 一贯煎
- D. 寿胎丸
- E. 补肾固冲丸

【正确答案】B

【答案解析】根据患者的表现可辨证为流产之血热证。证候：妊娠期阴道下血，色深红或鲜红，质稠，或腰腹坠胀作痛，心烦少寐，口干口渴，溲赤便结；舌质红，苔黄，脉滑数。治法：清热凉血，固冲安胎。方药：保阴煎。

98. 患者，女，28岁，已婚。产后乳汁甚少，乳汁浓稠，乳房胀硬，情志抑郁，食欲不振；舌质黯红，苔微黄，脉弦数。治疗首选方为

- A. 理中汤
- B. 通乳丹
- C. 补中益气汤
- D. 人参养荣汤
- E. 下乳涌泉散

【正确答案】E

【答案解析】此患者表现为产后缺乳之肝郁气滞证。证候：产后乳汁甚少或全无，乳汁浓稠，乳房胀硬或疼痛，情志抑郁，或有微热，食欲不振；舌质正常或黯红，苔微黄，脉弦或弦数。治法：疏肝解郁，通络下乳。方药：下乳涌泉散。

99. 患者，女，49岁。经断前后，时而烘热汗出，时而畏寒肢冷，腰酸乏力，头晕耳鸣，浮肿便溏，月经紊乱，色淡，舌淡苔薄，脉沉弱。治疗首选方剂为

- A. 一贯煎
- B. 天王补心丹
- C. 知柏地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 二仙汤合二至丸

【正确答案】E

【答案解析】绝经综合征之肾阴阳两虚证。证候：经断前后，时而烘热汗出，时而畏寒肢冷，腰酸乏力，头晕耳鸣，浮肿便溏，月经紊乱，月经过多或过少，淋漓不断，或突然暴下如注，色淡或黯，舌淡，苔薄，脉沉弱。治法：滋阴补肾，调补冲任。方药：二仙汤合二至丸。

100. 患儿，症见：低热起伏不定，面白少华，动则汗出，咳嗽无力，纳差便溏，神疲乏力，舌质偏淡，舌苔薄白，脉细无力。诊断为小儿肺炎，其治法宜选用

- A. 养阴清肺，润肺止咳
- B. 补肺健脾，益气化痰

- C. 清热涤痰，开肺定喘
- D. 辛凉宣肺，清热化痰
- E. 温补心阳，救逆固脱

【正确答案】B

【答案解析】小儿肺炎之肺脾气虚证。证候：低热起伏不定，面白少华，动则汗出，咳嗽无力，纳差便溏，神疲乏力，舌质偏淡，舌苔薄白，脉细无力。治法：补肺健脾，益气化痰。方药：人参五味子汤加减。

101. 患儿，6岁。西医诊断为过敏性紫癜，症见：下半身出现紫癜，以下肢和臀部为多，呈对称性，颜色鲜红，大小形态不一，伴发热咳嗽，关节痛，尿血，舌质红，苔薄黄，脉浮数。其治法首选

- A. 祛风清热，凉血安络
- B. 清热解毒，凉血化斑
- C. 清热利湿，通络止痛
- D. 泻火解毒，清胃化斑
- E. 滋阴补肾，活血化瘀

【正确答案】A

【答案解析】根据患儿的表现可以辨证为过敏性紫癜之风热伤络证。证候：紫癜见于下半身，以下肢和臀部为多，呈对称性，颜色鲜红，呈丘疹或红斑，大小形态不一，可融合成片，或有痒感，伴发热，微恶风寒，咳嗽，咽红，或见关节痛，腹痛，便血，尿血，舌质红，苔薄黄，脉浮数。治法：祛风清热，凉血安络。方药：银翘散加减。

102. 患儿，男，3岁。咳嗽重浊，痰多，色白清稀，喉间痰声辘辘，纳呆，舌淡红，苔白腻，脉滑。宜选方

- A. 桑菊饮
- B. 六君子汤
- C. 藿香正气散
- D. 清金化痰汤
- E. 三拗汤合二陈汤

【正确答案】E

【答案解析】此患儿为痰湿咳嗽的表现。痰湿咳嗽证候：咳嗽重浊，痰多壅盛，色白而稀，喉间痰声辘辘，胸闷，神乏困倦，纳呆，舌淡红，苔白腻，脉滑。治法：燥湿化痰止咳。方药：三拗汤合二陈汤加减。

103. 某患儿，腹痛经久不愈，痛有定处，痛如锥刺，或腹部癥块拒按，肚腹硬胀，青筋显露，舌紫暗，脉涩，指纹紫滞。治疗宜选用

- A. 养脏汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 桃红四物汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】C

【答案解析】腹痛之气滞血瘀证。证候：腹痛经久不愈，痛有定处，痛如锥刺，或腹部癥块拒按，肚腹硬胀，青筋显露，舌紫暗或有瘀点，脉涩，或指纹紫滞。治法：活血化瘀，行气止痛。方药：少腹逐瘀汤加减。

104. 患儿，男，1岁。腹泻时轻时重，大便稀溏，色淡无臭，多于食后作泻，面色萎黄，形体消瘦，舌淡苔白，指纹色淡。其中医治法宜选用

- A. 运脾和胃，消食化滞
- B. 疏风散寒，化湿和中
- C. 清肠解热，化湿止泻
- D. 健脾益气，助运止泻
- E. 温补脾肾，固涩止泻

【正确答案】D

【答案解析】此患儿为脾虚泄泻的表现：大便稀溏，色淡不臭，多于食后作泻，时轻时重，面色萎黄，形体消瘦，神疲倦怠，舌淡苔白，脉缓弱，指纹淡。治法：健脾益气，助运止泻。方药：参苓白术散加减。故正确的选项是D。

105. 患儿，女，7岁。乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多，伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红，苔黄，脉弦数。治疗首选方为

- A. 知柏地黄丸
- B. 丹栀逍遥散
- C. 普济消毒饮
- D. 黄连解毒汤
- E. 清瘟败毒散

【正确答案】B

【答案解析】此患儿表现为性早熟之肝经郁热证。证候：女孩乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多；男孩阴茎勃起，变声。伴胸闷不舒、心烦易怒、痤疮、便秘、舌红，苔黄或黄腻，脉弦数或弦细数。治法：疏肝解郁，清利湿热。方药：丹栀逍遥散加减。故此题的正确选项是B。

106. 患儿，3岁，西医诊断为营养性缺铁性贫血，现症见：头晕目涩，面色苍白，肌肤不泽，毛发枯黄，爪甲易脆，四肢震颤抽动，两颧潮红，潮热盗汗，发育迟缓，舌红少苔，脉弦数。治宜首选方剂为

- A. 八珍汤
- B. 左归丸
- C. 大补元煎
- D. 参苓白术散
- E. 补中益气汤

【正确答案】B

【答案解析】营养性缺铁性贫血之肝肾阴虚证。证候：头晕目涩，面色苍白，肌肤不泽，毛发枯黄，爪甲易脆，四肢震颤抽动，两颧潮红，潮热盗汗，发育迟缓，舌红，苔少或光剥，脉弦数或细数。治法：滋养肝肾，益精生血。方药：左归丸加减。

107. 患儿，男，6岁，西医诊断为病毒性心肌炎，现症见：低热，鼻塞流涕，咽红肿痛，咳嗽有痰，肌痛肢楚，头晕乏力，心悸气短，胸闷胸痛，舌质红，舌苔薄，脉数。其治疗首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 葛根黄芩黄连汤
- C. 炙甘草汤合生脉散
- D. 瓜蒌薤白半夏汤
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

【正确答案】A

【答案解析】此患者为病毒性心肌炎之风热犯心证。证候：发热，低热绵延，或不发热，鼻塞流涕，咽红肿痛，咳嗽有痰，肌痛肢楚，头晕乏力，心悸气短，胸闷胸痛，舌质红，舌苔薄，脉数或结代。治法：清热解毒，宁心复脉。方药：银翘散加减。

108. 患儿，男，4岁。症见持续高热，谵妄烦躁，反复抽搐，腹痛拒按，伴呕吐，大便黏腻，舌红，苔黄腻，脉滑数。诊断为急惊风，中医治疗首选的方剂是

- A. 琥珀抱龙丸
- B. 清瘟败毒饮
- C. 黄连解毒汤
- D. 黄连温胆汤
- E. 羚角钩藤汤

【正确答案】C

【答案解析】此患儿为急惊风之湿热疫毒证的表现。证候：持续高热，神志昏迷，谵妄烦躁，反复抽搐，腹痛拒按，呕吐，大便黏腻或夹脓血，舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热化湿，解毒息风。方药：黄连解毒汤加减。

109. 患儿，女，6岁，2天前出现壮热、烦躁不安，口渴引饮，现症见：面赤唇红，口舌生疮，痘疹密布，疹色紫暗，疱浆混浊，大便干结，小便黄赤，舌质红绛，舌苔黄糙而干，脉洪数。治疗首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 清营汤
- C. 化斑解毒汤
- D. 透疹凉解汤
- E. 凉营清气汤

【正确答案】B

【答案解析】此患者为水痘毒炽气营证的表现。证候：壮热烦躁，口渴引饮，面赤唇红，口舌生疮，痘疹密布，疹色紫暗，疱浆混浊，甚至出现出血性皮肤病，大便干结，小便黄赤，舌质红绛，舌苔黄糙而干，脉洪数。治法：清气凉营，化湿解毒。方药：清营汤加减。

110. 患者，男，50岁。乙型肝炎12年，现持续性肝区疼痛，消瘦，发热，乏力，食欲不振。查体：营养不良，腹部结块。舌质暗红，有瘀斑，苔薄黄，脉弦。

110. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肝炎
- B. 肝硬化
- C. 慢性迁延性肝炎

- D. 肝血管瘤
- E. 肝癌

【正确答案】 E

【答案解析】 通过乙型肝炎病史 12 年，及持续性肝区疼痛，消瘦，营养不良等症状体征，可见属肝癌。

111. 患者，男，50 岁。乙型肝炎 12 年，现持续性肝区疼痛，消瘦，发热，乏力，食欲不振。查体：营养不良，腹部结块。舌质暗红，有瘀斑，苔薄黄，脉弦。

中医证型是

- A. 气滞血瘀证
- B. 湿热瘀毒证
- C. 肝胃不和证
- D. 气血两虚证
- E. 脾胃虚寒证

【正确答案】 A

【答案解析】 属肝癌之气滞血瘀证。证候：两胁胀痛，腹部结块，推之不移，脘腹胀闷，纳呆乏力，暖气泛酸，大便不实，舌质红或暗红，有瘀斑，苔薄白或薄黄，脉弦或涩。治法：疏肝理气，活血化瘀。方药：逍遥散合桃红四物汤加减。

112. 患者，男，50 岁。乙型肝炎 12 年，现持续性肝区疼痛，消瘦，发热，乏力，食欲不振。查体：营养不良，腹部结块。舌质暗红，有瘀斑，苔薄黄，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 茵陈蒿汤合鳖甲煎丸
- B. 逍遥散合桃红四物汤
- C. 滋水清肝饮
- D. 鳖甲煎丸
- E. 秦艽鳖甲散

【正确答案】 B

【答案解析】 属肝癌之气滞血瘀证。证候：两胁胀痛，腹部结块，推之不移，脘腹胀闷，纳呆乏力，暖气泛酸，大便不实，舌质红或暗红，有瘀斑，苔薄白或薄黄，脉弦或涩。治法：疏肝理气，活血化瘀。方药：逍遥散合桃红四物汤加减。

113. 患者，女，50 岁。发作性心悸 2 年，近一个月发作次数频繁，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。今日突发心悸来诊，血压 90/60mmHg，心电图：心率 160 次/分，QRS 波规则，逆行性 P 波出现在 QRS 波之后。最有可能的诊断是

- A. 室性心动过速
- B. 房颤
- C. 室上性心动过速
- D. 心房扑动
- E. 窦性心动过速

【正确答案】 C

【答案解析】 根据病史、症状及心电图，排除其他选项，诊断为室上性心动过速。

114. 患者，女，50岁。发作性心悸2年，近一个月发作次数频繁，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。今日突发心悸来诊，血压90/60mmHg，心电图：心率160次/分，QRS波规则，逆行性P波出现在QRS波之后。中医证型是

- A. 心阳不振证
- B. 心脉瘀阻证
- C. 痰火扰心证
- D. 气阴两虚证
- E. 气血不足证

【正确答案】C

【答案解析】痰火扰心证。证候：心悸时发时止，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。治法：清热化痰，宁心安神。方药：黄连温胆汤加减。

115. 患者，女，50岁。发作性心悸2年，近一个月发作次数频繁，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。今日突发心悸来诊，血压90/60mmHg，心电图：心率160次/分，QRS波规则，逆行性P波出现在QRS波之后。中医治法是

- A. 清热化痰，宁心安神
- B. 活血化瘀，理气通络
- C. 益气养阴，养心安神
- D. 滋阴清火，养心安神
- E. 镇惊定志，养心安神

【正确答案】A

【答案解析】痰火扰心证。证候：心悸时发时止，胸闷烦躁，失眠多梦，口干口苦，大便秘结，小便黄赤，舌质红，舌苔黄腻，脉弦滑。治法：清热化痰，宁心安神。方药：黄连温胆汤加减。

116. 患者，女，26岁。症见胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。X线钡餐造影见溃疡龛影。根据患者症状此病辨证为

- A. 肝胃郁热证
- B. 气滞血瘀证
- C. 脾胃虚寒证
- D. 肝胃不和证
- E. 胃络瘀阻证

【正确答案】A

【答案解析】患者为消化性溃疡之肝胃郁热证。证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

117. 患者，女，26岁。症见胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。X线钡餐造影见溃疡龛影。其中医治法是

- A. 活血化瘀，通络和胃
- B. 温中散寒，健脾和胃

- C. 健脾养阴，益胃止痛
- D. 清胃泄热，疏肝理气
- E. 疏肝理气，健脾和胃

【正确答案】D

【答案解析】患者为消化性溃疡之肝胃郁热证。证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

118. 患者，女，26岁。症见胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。X线钡餐造影见溃疡龛影。应选用的方药是

- A. 黄芪建中汤加减
- B. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- C. 柴胡疏肝散合五磨饮子加减
- D. 化肝煎合左金丸加减
- E. 活络效灵丹合丹参饮加减

【正确答案】D

【答案解析】患者为消化性溃疡之肝胃郁热证。证候：胃脘灼热疼痛，胸胁胀满，泛酸，口苦口干，烦躁易怒，大便秘结，舌红，苔黄，脉弦数。治法：清胃泄热，疏肝理气。方药：化肝煎合左金丸加减。

119. 患者，男，现见胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，舌质紫暗，脉沉涩。根据患者症状此病辨证为

- A. 瘀血阻络证
- B. 肝胆湿热证
- C. 肝络失养证
- D. 气阴两虚证
- E. 肝郁气滞证

【正确答案】A

【答案解析】胁痛之瘀血阻络证。证候：胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，肋肋下或见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩。治法：祛瘀通络。方药：血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

120. 患者，男，现见胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，舌质紫暗，脉沉涩。其中医治法是

- A. 疏肝理气
- B. 清热利湿
- C. 祛瘀通络
- D. 养阴柔肝
- E. 滋阴固肾

【正确答案】C

【答案解析】胁痛之瘀血阻络证。证候：胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，肋肋下或见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩。治法：祛瘀通络。方药：血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

121. 患者，男，现见胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，舌质紫暗，脉沉涩。应选用的方药是

- A. 一贯煎
- B. 血府逐瘀汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 金匱肾气丸

【正确答案】B

【答案解析】胁痛之瘀血阻络证。证候：胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，胁肋下或见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩。治法：祛瘀通络。方药：血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

122. 患者，男，38岁。因出演爆破戏时不慎被烧伤，症见神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，自汗肢冷，体温不升反低，尿少；全身水肿，创面大量液体渗出；舌淡暗苔灰黑，脉虚大无力。根据患者症状此病辨证为

- A. 火毒伤津证
- B. 阴伤阳脱证
- C. 脾虚阴伤证
- D. 火毒内陷证
- E. 火毒炽盛证

【正确答案】B

【答案解析】根据患者的表现，诊断为烧伤之阴伤阳脱证。证候：神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，自汗肢冷，体温不升反低，尿少；全身或局部水肿，创面大量液体渗出；舌淡暗苔灰黑，或舌淡嫩无苔，脉微欲绝或虚大无力等。治法：回阳救逆，益气护阴。方药：四逆汤、参附汤合生脉散加味。

123. 患者，男，38岁。因出演爆破戏时不慎被烧伤，症见神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，自汗肢冷，体温不升反低，尿少；全身水肿，创面大量液体渗出；舌淡暗苔灰黑，脉虚大无力。治疗时采用的治法为

- A. 补气养血，兼清余毒
- B. 补气健脾，益胃养阴
- C. 回阳救逆，益气护阴
- D. 清热解毒，益气养阴
- E. 清营凉血解毒

【正确答案】C

【答案解析】根据患者的表现，诊断为烧伤之阴伤阳脱证。证候：神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，自汗肢冷，体温不升反低，尿少；全身或局部水肿，创面大量液体渗出；舌淡暗苔灰黑，或舌淡嫩无苔，脉微欲绝或虚大无力等。治法：回阳救逆，益气护阴。方药：四逆汤、参附汤合生脉散加味。

124. 患者，男，38岁。因出演爆破戏时不慎被烧伤，症见神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，自汗肢冷，体温不升反低，尿少；全身水肿，创面大量液体渗出；舌淡暗苔灰黑，脉虚大无力。中医治疗方剂宜选用

- A. 紫雪丹
- B. 四君子汤
- C. 安宫牛黄丸
- D. 人参养荣汤

E. 四逆汤合生脉散

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现，诊断为烧伤之阴伤阳脱证。证候：神疲倦卧，面色苍白，呼吸气微，表情淡漠，嗜睡，自汗肢冷，体温不升反低，尿少；全身或局部水肿，创面大量液体渗出；舌淡暗苔灰黑，或舌淡嫩无苔，脉微欲绝或虚大无力等。治法：回阳救逆，益气护阴。方药：四逆汤、参附汤合生脉散加味。

125. 患者，女性，32岁，已婚。症见：月经提前，经量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。根据患者症状，此病的中医证型为

- A. 脾气虚弱证
- B. 血瘀证
- C. 肾气不固证
- D. 阴虚血热证
- E. 阳盛血热证

【正确答案】A

【答案解析】患者为功能失调性子宫出血中，黄体功能不足（月经先期）之脾气虚弱证。证候：月经提前，或兼量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。治法：健脾益气，固冲调经。方药：补中益气汤。

126. 患者，女性，32岁，已婚。症见：月经提前，经量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。其治疗宜

- A. 健脾益气，凉血调经
- B. 补肾益气，固冲摄血
- C. 健脾益气，固冲调经
- D. 补气摄血，固冲调经
- E. 补肾益气，固冲调经

【正确答案】C

【答案解析】患者为功能失调性子宫出血中，黄体功能不足（月经先期）之脾气虚弱证。证候：月经提前，或兼量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。治法：健脾益气，固冲调经。方药：补中益气汤。

127. 患者，女性，32岁，已婚。症见：月经提前，经量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。其治疗首选方为

- A. 清热固经汤
- B. 补中益气汤
- C. 桃红四物汤
- D. 保阴煎合生脉散
- E. 固本止崩汤合举元煎

【正确答案】B

【答案解析】患者为功能失调性子宫出血中，黄体功能不足（月经先期）之脾气虚弱证。证候：月经提前，或兼量多，色淡质稀，神疲肢倦，面色萎黄，气短懒言，小腹空坠，食少纳差；舌淡，脉缓弱。治法：健脾益气，固冲调经。方药：补中益气汤。

128. 患儿，5岁。发热恶寒2天，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，咯白稀痰，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。根据患儿症状此病辨证为

- A. 痰热闭肺证
- B. 风寒闭肺证
- C. 阴虚闭肺证
- D. 肺脾气虚证
- E. 毒热闭肺证

【正确答案】B

【答案解析】此患儿为小儿肺炎风寒闭肺证的表现。风寒闭肺证证候：恶寒发热，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀，口不渴，咽不红，舌质不红，舌苔薄白或白腻，脉浮紧，指纹浮红。治法：辛温宣肺，化痰止咳。方药：华盖散加减。

129. 患儿，5岁。发热恶寒2天，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，咯白稀痰，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。其治法宜选用

- A. 辛凉宣肺，清热化痰
- B. 清热涤痰，开肺定喘
- C. 清热解毒，泻肺开闭
- D. 养阴清肺，润肺止咳
- E. 辛温宣肺，化痰止咳

【正确答案】E

【答案解析】此患儿为小儿肺炎风寒闭肺证的表现。风寒闭肺证证候：恶寒发热，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀，口不渴，咽不红，舌质不红，舌苔薄白或白腻，脉浮紧，指纹浮红。治法：辛温宣肺，化痰止咳。方药：华盖散加减。

130. 患儿，5岁。发热恶寒2天，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，咯白稀痰，口不渴，咽不红，舌苔薄白，脉浮紧。治疗采用的代表方为

- A. 华盖散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 人参五味子汤
- D. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 银翘散合麻杏石甘汤

【正确答案】A

【答案解析】此患儿为小儿肺炎风寒闭肺证的表现。风寒闭肺证证候：恶寒发热，无汗，呛咳不爽，呼吸气急，痰白而稀，口不渴，咽不红，舌质不红，舌苔薄白或白腻，脉浮紧，指纹浮红。治法：辛温宣肺，化痰止咳。方药：华盖散加减。

131. 糖尿病患者近期病情监测的指标是

- A. 空腹血糖
- B. 果糖胺
- C. 糖化血红蛋白
- D. 葡萄糖耐量试验
- E. 胰岛素释放试验

【正确答案】B

【答案解析】血浆蛋白（主要为白蛋白）同样也可与葡萄糖发生非酶催化的糖化反应而形成果糖胺，其形成的量与血糖浓度相关，正常值为1.7~2.8mmol/L。由于白蛋白在血中浓度稳定，其半衰期为19天，故果糖胺反映患者近2~3周内总的血糖水平，为糖尿病患者近期病情监测的指标。

132. 鉴别1型糖尿病与2型糖尿病最有意义的检测是

- A. 空腹血糖
- B. 果糖胺
- C. 糖化血红蛋白
- D. 葡萄糖耐量试验
- E. 胰岛素释放试验

【正确答案】E

【答案解析】鉴别1型糖尿病与2型糖尿病最有意义的检测是胰岛素释放试验。

133. 溃疡性结肠炎用驻车丸治疗的证型是

- A. 肝郁脾虚证
- B. 阴血亏虚证
- C. 湿热内蕴证
- D. 脾胃虚弱证
- E. 脾肾阳虚证

【正确答案】B

【答案解析】溃疡性结肠炎阴血亏虚证治宜滋阴养血、清热化湿，选用驻车丸。

134. 溃疡性结肠炎用四神丸治疗的证型是

- A. 肝郁脾虚证
- B. 阴血亏虚证
- C. 湿热内蕴证
- D. 脾胃虚弱证
- E. 脾肾阳虚证

【正确答案】E

【答案解析】溃疡性结肠炎脾肾阳虚证治宜健脾温肾止泻，选用四神丸加味。

135. 久病尿血，血色淡红，头晕耳鸣，精神困惫，腰膝酸软，舌质淡，脉沉弱。其证型为

- A. 脾不统血证
- B. 肾气不固证
- C. 血热妄行证
- D. 阴虚火旺证
- E. 气虚不摄证

【正确答案】B

【答案解析】尿血之肾气不固证。证候：久病尿血，血色淡红，头晕耳鸣，精神困惫，腰膝酸软，舌质淡，脉沉弱。治法：补益肾气，固摄止血。方药：无比山药丸加减。

136. 便血色红或紫黯，食少，体倦，面色萎黄，心悸，少寐，舌质淡，脉细。其证型为

- A. 脾不统血证
- B. 肾气不固证
- C. 血热妄行证
- D. 阴虚火旺证
- E. 气虚不摄证

【正确答案】 E

【答案解析】 便血之气虚不摄证。证候：便血色红或紫黯，食少，体倦，面色萎黄，心悸，少寐，舌质淡，脉细。治法：益气摄血。方药：归脾汤加减。

137. 虚证泄泻的特点是

- A. 大便清稀，完谷不化，腹部喜温
- B. 大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热
- C. 泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减
- D. 大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按
- E. 每因抑郁恼怒或情绪紧张之时，即发生腹痛泄泻

【正确答案】 D

【答案解析】 选项 A 为寒证泄泻的特点；选项 B 为湿热泄泻的特点；选项 C 为实证泄泻的特点；选项 D 为虚证泄泻的特点；选项 E 为肝郁泄泻的特点。

138. 实证泄泻的特点是

- A. 大便清稀，完谷不化，腹部喜温
- B. 大便色黄褐而臭，泻下急迫，肛门灼热
- C. 泻下腹痛，痛势急迫拒按，泻后痛减
- D. 大便时溏时泻，腹痛不甚，喜温喜按
- E. 每因抑郁恼怒或情绪紧张之时，即发生腹痛泄泻

【正确答案】 C

【答案解析】 选项 A 为寒证泄泻的特点；选项 B 为湿热泄泻的特点；选项 C 为实证泄泻的特点；选项 D 为虚证泄泻的特点；选项 E 为肝郁泄泻的特点。

139. 属于西医急性蜂窝组织炎的是

- A. 暑疖
- B. 骷髅疔
- C. 手发背
- D. 丹毒
- E. 委中毒

【正确答案】 C

【答案解析】 中医的锁喉疔、疔发、手发背、足发背属于西医的急性蜂窝组织炎；中医的红丝疔、颈痈、腋痈、胯腹痛、委中毒属于西医急性淋巴管炎与淋巴结炎。

140. 属于西医急性淋巴管炎与淋巴结炎的是

- A. 暑疖
- B. 骷髅疔
- C. 手发背

- D. 丹毒
- E. 委中毒

【正确答案】 E

【答案解析】 中医的锁喉痈、腭发、手发背、足发背属于西医的急性蜂窝组织炎；中医的红丝疔、颈痈、腋痈、胯腹痛、委中毒属于西医急性淋巴管炎与淋巴结炎。

141. 头面及颈部的切口拆线时间为

- A. 4~5 日
- B. 6~7 日
- C. 7~9 日
- D. 10~12 日
- E. 14 日

【正确答案】 A

【答案解析】 切口缝线的拆除时间：可根据切口部位、局部血液供应情况、患者年龄来决定。一般头、面、颈部 4~5 日拆线，下腹部、会阴部 6~7 日，胸部、上腹部、背部、臀部 7~9 日，四肢 10~12 日，减张缝线 14 日。

142. 下腹部及会阴部的拆线时间为

- A. 4~5 日
- B. 6~7 日
- C. 7~9 日
- D. 10~12 日
- E. 14 日

【正确答案】 B

【答案解析】 切口缝线的拆除时间：可根据切口部位、局部血液供应情况、患者年龄来决定。一般头、面、颈部 4~5 日拆线，下腹部、会阴部 6~7 日，胸部、上腹部、背部、臀部 7~9 日，四肢 10~12 日，减张缝线 14 日。

143. 气血虚弱型胎漏治法宜选用

- A. 补肾益气，固冲安胎
- B. 补气养血，固肾安胎
- C. 清热凉血，固冲安胎
- D. 益气养血，调固冲任
- E. 补肾益气，调固冲任

【正确答案】 B

【答案解析】 胎漏气血虚弱证。证候：妊娠期阴道少量流血，色淡红，质稀薄，或腰腹胀痛，小腹下坠，神疲肢倦，面色（白光）白，头晕眼花，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细滑。治法：补气养血，固肾安胎。方药：胎元饮。

144. 肾虚型胎漏治法宜选用

- A. 补肾益气，固冲安胎
- B. 补气养血，固肾安胎
- C. 清热凉血，固冲安胎

- D. 益气养血，调固冲任
- E. 补肾益气，调固冲任

【正确答案】A

【答案解析】胎漏肾虚证。证候：妊娠期阴道少量流血，色淡黯，腰酸，腹坠痛，头晕耳鸣，两膝酸软，小便频数，夜尿多，或曾屡次堕胎；舌淡，苔白，脉沉细滑尺弱。治法：补肾益气，固冲安胎。方药：寿胎丸。

145. 包块型异位妊娠方剂首选

- A. 宫外孕 I 号方
- B. 宫外孕 II 号方
- C. 参附汤合生脉散
- D. 固冲汤
- E. 理冲丸

【正确答案】E

【答案解析】包块型之瘀结成癥证（指陈旧性宫外孕）。证候：输卵管妊娠破损日久，腹痛减轻或消失，盆腔有局限性包块；血 β -hCG 持续下降或阴性；舌质黯，苔薄白，脉弦细或涩。治法：活血化瘀，消癥散结。方药：理冲丸。

146. 异位妊娠未破损期方剂首选

- A. 宫外孕 I 号方
- B. 宫外孕 II 号方
- C. 参附汤合生脉散
- D. 固冲汤
- E. 理冲丸

【正确答案】B

【答案解析】异位妊娠未破损期之胎瘀阻络证。证候：短暂停经后下腹一侧隐痛，或伴呕恶，妊娠试验阳性或弱阳性，血 β -hCG 升高；B 型超声证实输卵管妊娠但未破损；舌黯红或正常，苔薄白，脉弦滑。治法：活血祛瘀，杀胚消癥。方药：宫外孕 II 号方。

147. 治疗猩红热毒在气营证首选方剂是

- A. 凉营清气汤
- B. 解肌透痧汤
- C. 黄连解毒汤
- D. 沙参麦冬汤
- E. 葶藶胜湿汤

【正确答案】A

【答案解析】猩红热之毒在气营证。证候：壮热不解，面赤，口渴，咽喉肿痛，伴糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，甚则色紫如斑。疹由颈、胸开始，继则弥漫全身，压之退色，见疹后的 1~2 天舌红起刺，苔黄燥，3~4 天后舌光红起刺，苔剥脱，状如草莓，脉数有力。治法：清气凉营，泻火解毒。方药：凉营清气汤加减。

148. 治疗猩红热疹后伤阴证首选方剂是

- A. 凉营清气汤
- B. 解肌透痧汤

- C. 黄连解毒汤
- D. 沙参麦冬汤
- E. 萆薢胜湿汤

【正确答案】D

【答案解析】猩红热之疹后伤阴证。证候：丹痧布齐后1~2天，身热渐退，咽部糜烂疼痛减轻，见低热，唇口干燥，或伴有干咳，食欲不振，舌红少津，苔剥脱，脉细数。治法：养阴生津，清热润喉。方药：沙参麦冬汤加味。

149. 治疗疳积宜选用的方剂是

- A. 肥儿丸
- B. 资生健脾丸
- C. 石斛夜光丸
- D. 泻心导赤散
- E. 防己黄芪汤

【正确答案】A

【答案解析】疳积证候：形体明显消瘦，肚腹胀大，甚则青筋暴露，面色萎黄，毛发稀疏结穗，食欲减退，精神烦躁，夜卧不宁，或伴有动作异常，揉鼻挖眉，吮齿磨牙，或善食易饥，大便下虫，或嗜食异物，舌质偏淡，苔腻，脉沉细而滑。治法：消积理脾。方药：肥儿丸加减。

150. 治疗眼疳宜选用的方剂是

- A. 肥儿丸
- B. 资生健脾丸
- C. 石斛夜光丸
- D. 泻心导赤散
- E. 防己黄芪汤

【正确答案】C

【答案解析】眼疳证候：兼见两目干涩，畏光羞明，眼角赤烂，甚则黑睛浑浊，白睛生翳，或夜间视物不明等。治法：养血柔肝，滋阴明目。方药：石斛夜光丸加减。