

2019 年中医执业助理医师-模拟试题（第二单元）

一、A1

1. 阴虚感冒，其治法是

- A. 益气解表
- B. 辛凉解表
- C. 辛温解表
- D. 滋阴解表
- E. 以上均非

【正确答案】 D

【答案解析】 阴虚感冒

证候主症：身热，微恶风寒，少汗，头昏，心烦，口干咽燥，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴解表。

2. 消渴的病机主要是

- A. 血脉瘀滞
- B. 燥热内结
- C. 气阴两虚
- D. 阴虚燥热
- E. 阴阳两虚

【正确答案】 D

【答案解析】 消渴病机主要在于阴津亏损，燥热偏胜。

3. 尿血肾气不固者的中医治法是

- A. 清热利湿，凉血止血
- B. 滋阴降火，凉血止血
- C. 补中健脾，益气摄血
- D. 补益肾气，固摄止血
- E. 以上均非

【正确答案】 D

【答案解析】 尿血肾气不固证

证候主症：久病尿血，血色淡红，头晕耳鸣，精神困倦，腰脊酸痛，舌质淡，脉沉弱。

治法：补益肾气，固摄止血。

4. 冷哮咳痰特点

- A. 臭脓痰
- B. 痰稠黄胶黏
- C. 痰少咯吐不爽，色白而多泡沫
- D. 痰如白沫量多
- E. 痰黄白相兼

【正确答案】 C

【答案解析】 冷哮证

证候主症：喉中哮鸣如水鸡声，呼吸急促，喘憋气逆，胸膈满闷如塞，咳不甚，痰少咯吐不爽，色白而多泡沫，口不渴或渴喜热饮，形寒怕冷，天冷或受寒易发，面色青晦，舌苔白滑，脉弦紧或浮紧。

5. 下列症状对胃痛和胁痛的鉴别诊断最具有价值者为

- A. 疼痛的兼症
- B. 疼痛的诱因
- C. 疼痛的部位
- D. 疼痛的性质
- E. 疼痛的持续时间

【正确答案】 C

【答案解析】 胃痛与胁痛鉴别：胁痛是以胁部疼痛为主症，可伴发热恶寒，或目黄肤黄，或胸闷太息，极少伴嘈杂泛酸、噯气吞腐。肝气犯胃的胃痛有时亦可攻痛连胁，但仍以胃脘部疼痛为主症。

6. 治疗寒湿腰痛的主方是

- A. 青娥丸
- B. 四妙丸
- C. 左归丸
- D. 右归丸
- E. 甘姜苓术汤

【正确答案】 E

【答案解析】 寒湿腰痛

证候主症：腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重，舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。

治法：散寒行湿，温经通络。

代表方：甘姜苓术汤加减。

7. 外感咳嗽与内伤咳嗽的鉴别，下列哪项无意义

- A. 病程的长短
- B. 起病的缓急
- C. 咳嗽的多少
- D. 疾病的新久
- E. 属实属虚

【正确答案】 C

【答案解析】 咳嗽辨外感内伤：外感咳嗽，多为新病，起病急，病程短，常伴恶寒、发热、头痛等肺卫表证。内伤咳嗽，多为久病，常反复发作，病程长，可伴它脏见症。

8. 眩晕的病变脏腑为

- A. 心、肺、脾
- B. 心、肝、肺
- C. 心、肝、肾
- D. 肺、脾、肾
- E. 肝、脾、肾

【正确答案】 E

【答案解析】 眩晕的病位在于头窍，其病变脏腑与肝、脾、肾三脏相关。

9. 下列各项，不属淋证病因的是

- A. 禀赋不足
- B. 瘀浊内停
- C. 外感湿热
- D. 饮食不节
- E. 情志内伤

【正确答案】 B

【答案解析】 淋证的病因：外感湿热、饮食不节、情志失调、禀赋不足或劳伤久病。

10. 阳黄的颜色特征是

- A. 黄色鲜明
- B. 黄色晦暗
- C. 淡黄色
- D. 深黄色
- E. 金黄色

【正确答案】 A

【答案解析】 阳黄黄色鲜明，发病急，病程短，常伴身热、口干苦、舌苔黄腻、脉弦数。

11. 治疗颤证阳气虚衰证，应首选的方剂是

- A. 人参养荣汤
- B. 地黄饮子
- C. 附子理中丸
- D. 龟鹿二仙膏
- E. 金匱肾气丸

【正确答案】 B

【答案解析】 颤证之阳气虚衰证
证候主症：头摇肢颤，筋脉拘挛，面色（白光）白，畏寒肢冷，四肢麻木，心悸懒言，动则气短，自汗，小便清长或自遗，大便溏；舌质淡，舌苔薄白，脉沉迟无力。

治法：补肾助阳，温煦筋脉。

代表方：地黄饮子加减。

12. 泄泻与痢疾主要的鉴别点是

- A. 有无腹泻
- B. 有无腹痛
- C. 有无发热
- D. 有无大便不成形
- E. 有无便下赤白脓血

【正确答案】 E

【答案解析】 泄泻与痢疾：两者均为大便次数增多、粪质稀薄的病证。泄泻以大便次数增加，粪质稀溏，甚则如水样，或完谷不化为主症，大便不带脓血，也无里急后重，或无腹痛。而痢疾以腹痛、里急后重、便下赤白脓血为特征。

13. 痞满的病机关键是

- A. 胃失和降，膈间气机不利
- B. 脾胃肝肾功能失调，津枯血燥，气痰瘀互结
- C. 胃气阻滞，胃失和降，不通则痛
- D. 胃失和降，胃气上逆
- E. 中焦气机不利，脾胃升降失职

【正确答案】 E

【答案解析】 中焦气机不利，脾胃升降失职为痞满发生的病机关键。

14. 肺痈的特征性临床表现中，错误的是

- A. 咳吐腥臭脓痰
- B. 咯铁锈色痰
- C. 咳嗽
- D. 胸痛
- E. 发热

【正确答案】 B

【答案解析】 肺痈是肺叶生疮，形成脓疡的一种病证，属内痈之一。临床以咳嗽、胸痛、发热、咯吐腥臭浊痰甚则脓血相兼为主要特征。

15. 下列各项，不属于便秘病因的是

- A. 年老体虚
- B. 感受外邪
- C. 饮食不节
- D. 情志失调
- E. 外伤

【正确答案】 E

【答案解析】 便秘病因：饮食不节、情志失调、年老体虚、感受外邪。

16. 痫病病位在脑，涉及的脏腑为

- A. 肝、脾、心、肾
- B. 肝、心、脾、肺
- C. 肝、脾、肺、肾
- D. 肺、脾、心、肾
- E. 肝、肺、心、肾

【正确答案】 A

【答案解析】 痫病的病位在脑，涉及肝、脾、心、肾诸脏。

17. 噎膈与梅核气最主要的鉴别点是

- A. 有无吞咽困难
- B. 有无进行性消瘦
- C. 有无胸骨后不适，呈烧灼感
- D. 有无情志不畅、酒食不节史
- E. 有无自觉咽中梗塞不舒

【正确答案】 A

【答案解析】 噎膈与梅核气：两者均见咽中梗塞不舒的症状。噎膈系有形之物瘀阻于食道，吞咽困难。梅核气则系气逆痰阻于咽喉，为无形之气，咽中有梗塞不舒的感觉，但无吞咽困难及饮食不下的症状。

18. 下列不属于疔病的临床特点的是

- A. 可发生于身体各处
- B. 此愈彼起，日久不愈，反复发作
- C. 好发于项后发际部、臀部
- D. 多发于儿童头部
- E. 好发于消渴患者

【正确答案】 D

【答案解析】 疔病的临床特点：

好发于项后发际、背部、臀部。几个到几十个，反复发作，缠绵不愈。也可在身体各处散发疔肿，一处将愈，他处续发，或间隔周余、月余再发。患消渴病、习惯性便秘或营养不良者易患本病。

19. 疮疡三陷证中，火陷证的治法是

- A. 托毒透邪，养阴清心开窍
- B. 生津养胃，清心解毒
- C. 凉血清热解毒，兼顾护津液
- D. 补益气血，清心安神开窍
- E. 温补脾肾，清心开窍

【正确答案】 C

【答案解析】 火陷证，当凉血清热解毒为主，并顾护津液；干陷证，当补养气血，托毒透邪；虚陷证，当温补脾肾或生津养胃。

20. 下列哪项不是丹毒的临床特点

- A. 边界清楚
- B. 不易复发
- C. 病起突然，恶寒发热
- D. 局部皮肤忽然变赤
- E. 局部皮肤灼热肿胀，迅速扩大

【正确答案】 B

【答案解析】 丹毒是患部皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病。其特点是病起突然，恶寒发热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，焮热肿胀，边界清楚，迅速扩大，数日内可逐渐痊愈，但容易复发。

21. 下列关于肛痈的描述，不正确的是

- A. 深部脓肿应行弧形切口
- B. 高位脓肿多采用一次切开法
- C. 多与肛门腺感染有关
- D. 溃后多形成肛漏
- E. 青壮年人多见

【正确答案】 B

【答案解析】 高位脓肿多采用一次切开挂线法。脓肿一次切开法适用于浅部脓肿。分次手术适用于体质虚弱或不愿住院治疗的深部脓肿。

手术切口浅部脓肿可行放射状切口，深部脓肿应行弧形切口，避免损伤括约肌。

22. 子痰之浊痰凝结证，常选用的方剂是

- A. 黄连解毒汤加减
- B. 滋阴除湿汤加减
- C. 阳和汤加减
- D. 透脓散加减
- E. 橘核丸加减

【正确答案】 C

【答案解析】 子痰之浊痰凝结证：见于初起硬结期。肾子处酸胀不适，附睾硬结，子系呈串珠状硬肿，无明显全身症状。苔薄，脉滑。

治法：温经通络，化痰散结。

方药：阳和汤加减，配服小金丹。

23. 丹毒湿热毒蕴证的治法为

- A. 清肝泻火利湿
- B. 清肝泻火解毒
- C. 疏风清热解毒
- D. 凉血清热解毒
- E. 利湿清热解毒

【正确答案】 E

【答案解析】 丹毒，湿热毒蕴证

证候：发于下肢，局部红赤肿胀、灼热疼痛，或见水疱、紫斑，甚至结毒化脓或皮肤坏死。或反复发作，可形成大脚风。伴发热，胃纳不香。舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：利湿清热解毒。

24. 乳核肝气郁结证的主治方剂宜选用

- A. 小柴胡汤
- B. 大柴胡汤
- C. 桃红四物汤
- D. 逍遥散
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】 D

【答案解析】 乳核，肝气郁结证

证候：肿块较小，发展缓慢，不红不热，不觉疼痛，推之可移，伴胸闷叹息。舌质正常，苔薄白，脉弦。

治法：疏肝解郁，化痰散结。

方药：逍遥散加减。

25. 脱肛脾虚气陷证的主治方剂为

- A. 独参汤
- B. 六君子汤
- C. 参苓白术散
- D. 补中益气汤
- E. 萆薢渗湿汤

【正确答案】 D

【答案解析】 脱肛，脾虚气陷证

症候：便时肛内肿物脱出，轻重不一，色淡红，伴有肛门坠胀，大便带血，神疲乏力，食欲不振，甚则头昏耳鸣，腰膝酸软。舌淡、苔薄白，脉细弱。

方药：补中益气汤加减。

26. 石瘿相当于西医的

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 甲状腺良性肿瘤
- C. 甲状腺恶性肿瘤
- D. 甲状腺炎
- E. 以上均非

【正确答案】 C

【答案解析】 石瘿，好发于40岁以上中年人。相当于西医的甲状腺癌，属于甲状腺恶性肿瘤。

27. 牛皮癣肝郁化火证的主治方剂为

- A. 消风散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 当归饮子
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 大黄牡丹汤

【正确答案】 B

【答案解析】 牛皮癣，肝郁化火证

证候：皮疹色红，伴心烦易怒，失眠多梦，眩晕，心悸，口苦咽干；舌边尖红，脉弦数。

治法：疏肝理气，清肝泻火。

方药：龙胆泻肝汤加减。

28. 油风气滞血瘀证的治疗方剂为

- A. 四物汤
- B. 桃红四物汤
- C. 通窍活血汤
- D. 八珍汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】 C

【答案解析】 油风，气滞血瘀证

证候：病程较长，头发脱落前先有头痛或胸胁疼痛等症；伴夜多噩梦，烦热难眠；舌质暗红，有瘀点、瘀斑，舌苔薄，脉沉细。

治法：通窍活血，祛瘀生发。

方药：通窍活血汤加减。

29. 中医说的“鹅掌风”相当于西医的

- A. 蛇肚疔
- B. 手癣
- C. 足癣

- D. 蛇头疔
E. 以上均非

【正确答案】 B

【答案解析】 鹅掌风，相当于西医的手癣。

30. 确诊为急性阑尾炎的主要依据是

- A. 右侧腹痛，伴恶寒、发热
B. 阵发性右侧腹疼痛，伴恶心欲呕
C. 转移性右下腹疼痛，麦氏点压痛
D. 突发性右下腹绞痛，腹软，肾区叩痛
E. 右下腹痛突然而剧烈，检查发现右侧囊性肿物

【正确答案】 C

【答案解析】 急性阑尾炎以转移性右下腹痛为主症，麦氏点压痛，可有反跳痛或肌紧张。经腹部 X 线平片和 B 超检查即可鉴别。

31. 下列关于股肿发病特点的叙述，不正确的是

- A. 肢体疼痛
B. 肢体肿胀
C. 浅静脉怒张
D. 局部皮温升高
E. 足背动脉搏动减弱

【正确答案】 E

【答案解析】 股肿是相当于西医的下肢深静脉血栓形成，以往称血栓性深静脉炎。其发病特点为肢体肿胀、疼痛、局部皮温升高和浅静脉怒张四大症状，好发于下肢髂股静脉和股腘静脉，可并发肺栓塞和肺梗塞而危及生命。足背动脉、胫后动脉搏动减弱是脱疽的特点。

32. 接触性皮炎主要治法为

- A. 养血润燥
B. 清热利湿
C. 解毒止痒
D. 清热祛湿止痒
E. 疏风清热止痒

【正确答案】 D

【答案解析】 接触性皮炎以清热祛湿止痒为主要治法。

33. 下列关于子宫位置的描述，不正确的是

- A. 带脉之下
B. 耻骨上方
C. 小腹正中
D. 膀胱之后
E. 直肠之前

【正确答案】 B

【答案解析】 子宫位于带脉之下，小腹正中，膀胱之后，直肠之前，下口连接阴道。

34. 止带方常用于治疗带下过多的何证型

- A. 脾虚证
- B. 湿毒证
- C. 肾阳虚证
- D. 肾阴虚证
- E. 湿热下注证

【正确答案】 E

【答案解析】 带下过多之湿热下注证

主要证候：带下量多，色黄或呈脓性，质黏稠，有臭气，或带下色白质黏，呈豆渣样，外阴瘙痒；小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清利湿热，佐以解毒杀虫。

方药：止带方。

35. 受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿，称为

- A. 胎漏
- B. 暗产
- C. 暗经
- D. 居经
- E. 激经

【正确答案】 E

【答案解析】 受孕初期仍能按月经周期有少量出血而无损于胎儿者，称为“激经”，又称“盛胎”或“垢胎”。

36. 属妊娠腹痛气滞证临床表现的是

- A. 妊娠后小腹常感隐痛不适，或刺痛，痛处不移
- B. 素有癥瘕
- C. 妊娠后小腹绵绵作痛
- D. 妊娠后小腹胸胁胀痛
- E. 妊娠后小腹冷痛，绵绵不休

【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠腹痛之气滞证

主要证候：妊娠后小腹胸胁胀痛，或少腹胀痛；情志抑郁，暖气吐酸，或烦躁易怒；苔薄黄，脉弦滑。

37. 产后恶露不绝之血瘀证选用的方剂是

- A. 血府逐瘀汤
- B. 少腹逐瘀汤
- C. 生化汤
- D. 失笑散
- E. 逍遥丸

【正确答案】 C

【答案解析】 产后恶露不绝之血瘀证

主要证候：恶露过期不尽，量时多或时少，色暗有块，小腹疼痛拒按；舌紫黯或边有瘀点，脉沉涩。

治法：活血化瘀止血。

方药：生化汤加益母草、炒蒲黄。

38. 治疗经行乳房胀痛肝肾亏虚证，应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 二至丸
- C. 一贯煎
- D. 六味地黄丸
- E. 左归丸

【正确答案】 C

【答案解析】 经行乳房胀痛之肝肾亏虚证

主要证候：经行或经后两乳作胀作痛，乳房按之柔软无块，月经量少，色淡；两目干涩，咽干口燥，五心烦热；舌淡或舌红，少苔，脉细数。

治法：滋肾养肝，和胃通络。

方药：一贯煎或滋水清肝饮加麦芽、鸡内金。

39. 治疗经间期出血之湿热证，应首选的方剂是

- A. 举元煎
- B. 补中益气汤
- C. 加减一阴煎
- D. 清肝止淋汤
- E. 逐瘀止血汤

【正确答案】 D

【答案解析】 经间期出血之湿热证

主要证候：两次月经中间，阴道出血量稍多，色深红，质黏腻，无血块。平时带下量多色黄，小腹时痛；神疲乏力，骨节酸楚，胸闷烦躁，口苦咽干，纳呆腹胀，小便短赤；舌质红，苔黄腻，脉细弦或滑数。

治法：清利湿热，固冲止血。

方药：清肝止淋汤加减。

40. 月经先期肾气虚证的治法是

- A. 补益肾气，固冲调经
- B. 补益脾肾，摄血调经
- C. 益气养血，止血调经
- D. 补益肾气，调经止血
- E. 补脾益气，摄血调经

【正确答案】 A

【答案解析】 月经先期之肾气虚证

主要证候：周期提前，经量或多或少，色淡黯，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦黯或有黯斑；舌淡黯，苔白润，脉沉细。

治法：补益肾气，固冲调经。

方药：固阴煎或归肾丸。

41. 滑胎肾气不足证的中医治法是

- A. 补肾健脾，固冲安胎
- B. 益气养血，固冲安胎
- C. 温补肾阳，固冲安胎

D. 补肾填精，固冲安胎

E. 清热养血，滋肾安胎

【正确答案】 A

【答案解析】 滑胎之肾气不足证

主要证候：屡孕屡堕，甚或应期而堕；孕后腰酸膝软，头晕耳鸣，夜尿频多，面色晦暗；舌质淡，苔薄白，脉细滑尺脉沉弱。

治法：补肾健脾，固冲安胎。

方药：补肾固冲丸。

42. 关于经行情志异常肝经郁热证临床表现，错误的是

A. 烦躁易怒，抑郁不乐

B. 胸胁胀满，不思饮食

C. 口苦咽干，头晕目眩

D. 月经量多，色深红

E. 舌淡苔白，脉细数

【正确答案】 E

【答案解析】 经行情志异常肝经郁热证

主要证候：经前或经期，烦躁易怒，或抑郁不乐，头晕闷眩，口苦咽干，胸胁胀满，不思饮食，月经量多，色深红；舌红，苔黄，脉弦数。

43. 治疗慢性盆腔炎气滞血瘀证，应首选的方剂是

A. 桃红四物汤

B. 理冲汤

C. 膈下逐瘀汤

D. 少腹逐瘀汤

E. 大黄牡丹汤

【正确答案】 C

【答案解析】 慢性盆腔炎气滞血瘀证

主要证候：少腹部胀痛或刺痛，经行腰腹疼痛加重，经血量多有块，瘀块排出则痛减，带下量多，婚久不孕；经行情志抑郁，乳房胀痛；舌体紫黯，有瘀斑、瘀点，苔薄，脉弦涩。

治法：活血化瘀，理气止痛。

方药：膈下逐瘀汤。

44. 对于产后发热感染邪毒证，治疗应首选

A. 荆防四物汤

B. 八珍汤

C. 生化汤

D. 五味消毒饮合失笑散

E. 桃红消瘀汤

【正确答案】 D

【答案解析】 产后发热感染邪毒证

主要证候：产后高热寒战，热势不退，小腹疼痛拒按，恶露量或多或少，色紫暗如败酱，气臭秽；心烦口渴，尿少色黄，大便燥结；舌红苔黄，脉数有力。

治法：清热解毒，凉血化瘀。

方药：五味消毒饮合失笑散加减或解毒活血汤加减。

45. 下列关于癥瘕定义的叙述，正确的是

- A. 妇人下腹结块，或痛，或胀，或满
- B. 癥属气病，瘕属血病
- C. 癥多为恶性，瘕多为良性
- D. 癥有形可征，固定不移，痛无定处
- E. 瘕聚散无常，推之可移，痛有定处

【正确答案】 A

【答案解析】 妇人下腹结块，伴有或胀、或痛、或满、或异常出血者，称为癥瘕。癥者有形可征，同定不移，痛有定处；瘕者假聚成形，聚散无常，推之可移，痛无定处。一般以为癥属血病，瘕属气病，但临床常难以划分，故并称癥瘕。癥瘕有良性和恶性之分。

46. 对于产后腹痛气血两虚证，治疗应首选

- A. 血府逐瘀汤
- B. 当归芍药散
- C. 小建中汤
- D. 八珍汤
- E. 肠宁汤

【正确答案】 E

【答案解析】 产后腹痛之气血两虚证

主要证候：产后小腹隐隐作痛数日不止，喜按喜揉，恶露量少，色淡红，质稀无块，面色苍白，头晕眼花，心悸怔忡，大便干结；舌质淡，苔薄白，脉细弱。

治法：补血益气，缓急止痛。

方药：肠宁汤或内补当归建中汤或当归生姜羊肉汤。

47. 治疗不孕症之肾气虚证，首选

- A. 肾气丸
- B. 毓麟珠
- C. 温胞饮
- D. 养精种玉汤
- E. 知柏地黄丸

【正确答案】 B

【答案解析】 不孕症之肾气虚证

主要证候：婚久不孕，月经不调或停闭，经量或多或少，色暗；头晕耳鸣，腰膝酸软，精神疲倦，小便清长；舌淡，苔薄，脉沉细，两尺尤甚。

治法：补肾益气，温养冲任。

方药：毓麟珠。

48. 关于小儿血压计算中，舒张压是收缩压的

- A. 1/3
- B. 2/3
- C. 1/2
- D. 1/4
- E. 3/4

【正确答案】 B

【答案解析】 不同年龄小儿血压正常值可用以下公式推算（注：1kPa=7.5mmHg）：

收缩压（mmHg）=80+2×年龄；

舒张压（mmHg）=收缩压×2/3。

49. 呕吐、泄泻、疳证等疾病为小儿时期的多发病，原因主要是

- A. 肾常虚
- B. 心气未充
- C. 肝气未实
- D. 肺常不足
- E. 脾常不足

【正确答案】 E

【答案解析】 小儿“脾常不足”，脾胃之体成而未全，脾胃之气全而未壮，因而易于因家长喂养不当、小儿饮食失节，在临床上出现脾胃纳化功能紊乱的病证。所以，呕吐、泄泻、厌食、积滞、疳证等疾病为小儿时期的常见病多发病。

50. 小儿水肿气阴两虚证的治法是

- A. 滋阴补肾，平肝潜阳
- B. 益气养阴，利水消肿
- C. 益气健脾，利水消肿
- D. 清热解毒，利水消肿
- E. 活血化瘀，利水消肿

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿水肿之气阴两虚证

证候：面色无华，腰膝酸软，或有浮肿，耳鸣目眩，咽干口燥，舌稍红，苔少，脉细弱。

治法：益气养阴，利水消肿。

代表方剂：六味地黄丸加黄芪。

51. 乳蛾风热搏结证的治疗方剂是

- A. 银翘马勃散
- B. 牛蒡甘桔汤
- C. 养阴清肺汤
- D. 普济消毒饮
- E. 荆防败毒散

【正确答案】 A

【答案解析】 乳蛾之风热搏结证

证候：喉核赤肿，咽喉疼痛，或咽痒不适，吞咽不利，发热重，恶寒轻，鼻塞流涕，头痛身痛，舌红，苔薄白或黄，脉浮数或指纹浮紫。

治法：疏风清热，利咽消肿。

代表方剂：银翘马勃散。

52. 关于生理性黄疸，说法正确的是

- A. 足月儿血清总胆红素 $>221\mu\text{mol/L}$
- B. 血清总胆红素每日上升幅度 $>85.5\mu\text{mol/L}$
- C. 生后24h以内出现黄疸

D. 黄疸持续时间足月儿>2周

E. 生后第2~3日出现黄疸

【正确答案】 E

【答案解析】 生理性黄疸：生后第2~3日出现黄疸，第4~6日达高峰。足月儿在出生后2周消退，早产儿可延迟至3~4周消退。黄疸程度轻（足月儿血清总胆红素 $\leq 221 \mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $\leq 257 \mu\text{mol/L}$ ）。在此期间，小儿一般情况良好，除偶有轻微食欲不振外，不伴有其他临床症状。

病理性黄疸：黄疸出现早（出生后24小时以内）、发展快（血清总胆红素每日上升幅度 $> 85.5 \mu\text{mol/L}$ 或每小时上升幅度 $> 8.5 \mu\text{mol/L}$ ）、程度重（足月儿血清总胆红素 $> 221 \mu\text{mol/L}$ ，早产儿 $> 257 \mu\text{mol/L}$ ）、消退迟（黄疸持续时间足月儿 > 2 周，早产儿 > 4 周）或黄疸退而复现。伴随各种临床症状。

53. 治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是

A. 乌梅丸

B. 驱虫粉

C. 使君子散

D. 化虫丸

E. 追虫丸

【正确答案】 C

【答案解析】 蛔虫病之肠虫证

证候：脐腹部疼痛，轻重不一，时作时止，或不思饮食，或嗜食异物，大便不调，或泄泻或便秘，或便下蛔虫，面色多黄滞，可见面部白斑，白睛蓝斑，唇内粟状白点，夜寐齟齬。甚者，腹部可扪及条索状物，时聚时散，形体消瘦，肚腹胀大，青筋显露。舌苔多见花剥或腻，舌尖红赤，脉弦滑。

治法：驱蛔杀虫，调理脾胃。

代表方剂：使君子散。

54. 风痧邪犯肺卫证，治疗应选用

A. 清营汤

B. 银翘散

C. 桑菊饮

D. 白虎汤

E. 透疹凉解汤

【正确答案】 B

【答案解析】 风痧之邪犯肺卫证

证候：发热恶风，喷嚏流涕，轻微咳嗽，精神倦怠，饮食欠佳，皮疹先起于头面、躯干，随即遍及四肢，分布均匀，疹点稀疏细小，疹色淡红，一般2~3日渐见消退，肌肤轻度瘙痒，耳后及枕部淋巴结肿大触痛，舌质偏红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热透疹。

方药：银翘散。

55. 贫血心脾两虚证，应首选方剂是

A. 右归丸

B. 四物汤

- C. 归脾汤
- D. 六君子汤
- E. 左归丸

【正确答案】 C

【答案解析】 贫血之心脾两虚证

证候：面色萎黄或苍白，唇淡甲白，发黄稀疏，时有头晕目眩，心悸心慌，夜寐欠安，语声不振甚至低微，气短懒言，体倦乏力，食欲不振，舌淡红，脉细弱，指纹淡红。

治法：补脾养心，益气生血。

代表方剂：归脾汤。

56. 治疗疝气证应首选的方剂是

- A. 肥儿丸
- B. 八珍汤
- C. 资生健脾丸
- D. 六君子汤
- E. 四君子汤

【正确答案】 C

【答案解析】 疝气证

证候：形体略瘦，面色少华，毛发稀疏，不思饮食，精神欠佳，性急易怒，大便干稀不调，舌质略淡，苔薄微腻，脉细有力。

治法：调脾健运。

代表方剂：资生健脾丸。

57. 以下哪一项不属于小儿厌食的诊断要点

- A. 除外其他外感、内伤慢性疾病
- B. 可见精神倦怠、大便不调、或有发热等症
- C. 有喂养不当、病后失调、先天不足或情志失调史
- D. 长期食欲不振，厌恶进食，食量明显少于同龄正常儿童
- E. 面色少华，形体偏瘦，但精神尚好，活动如常

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿厌食的诊断要点

- (1) 有喂养不当、病后失调、先天不足或情志失调史。
- (2) 长期食欲不振，厌恶进食，食量明显少于同龄正常儿童。
- (3) 面色少华，形体偏瘦，但精神尚好，活动如常。
- (4) 除外其他外感、内伤慢性疾病。

58. 下列哪项是治疗积滞乳食内积证的首选方剂

- A. 肥儿丸或疝积散
- B. 消乳丸或保和丸
- C. 健脾丸
- D. 七味白术散
- E. 枳实导滞丸

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿积滞之乳食内积证

证候：不思乳食，暖腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满疼痛，大便酸臭，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热，舌质红，苔白厚或黄厚腻，脉象弦滑，指纹紫滞。

治法：消乳化食，和中导滞。

代表方剂：乳积者，选消乳丸；食积者，选保和丸。

59. 治疗急惊风气营两燔证应首选的方剂是

- A. 白虎汤
- B. 藿香正气散
- C. 新加香薷饮
- D. 清瘟败毒饮
- E. 清营汤

【正确答案】 D

【答案解析】 急惊风之气营两燔证

证候：多见于盛夏之季，起病较急，壮热多汗，头痛项强，恶心呕吐，烦躁嗜睡，抽搐，口渴便秘，舌红苔黄，脉弦数。病情严重者高热不退，反复抽搐，神志昏迷，舌红，苔黄腻，脉滑数。

治法：清气凉营，息风开窍。

代表方剂：清瘟败毒饮。

60. 疟腮的流行季节是

- A. 夏秋
- B. 秋冬
- C. 冬春
- D. 春夏
- E. 不分季节

【正确答案】 C

【答案解析】 本病一年四季均可发生，以冬春两季易于流行。

61. 小儿遗尿肾气不足证的治法是

- A. 补肾纳气，泻肝止遗
- B. 补肺益脾，固涩膀胱
- C. 补肾益气，升提固摄
- D. 温补肾阳，固涩膀胱
- E. 益气滋肾，固涩缩尿

【正确答案】 D

【答案解析】 小儿遗尿之肾气不足证

证候：寐中多遗，可达数次，小便清长，面白少华，神疲乏力，智力较同龄儿稍差，肢冷畏寒，舌质淡，苔白滑，脉沉无力。

治法：温补肾阳，固涩膀胱。

代表方剂：菟丝子散。

62. 治疗反复呼吸道感染肺脾气虚证应首选的方剂是

- A. 生脉散合沙参麦冬汤
- B. 玉屏风散合六君子汤
- C. 补中益气汤
- D. 黄芪桂枝五物汤

E. 金匱肾气丸合理中丸

【正确答案】 B

【答案解析】 反复呼吸道感染肺脾气虚证

证候：反复外感，面黄少华，形体消瘦，肌肉松软，少气懒言，气短，自汗多汗，食少纳呆，大便不调，舌质淡，苔薄白，脉无力，指纹淡。

治法：补肺固表，健脾益气。

代表方剂：玉屏风散合六君子汤。

63. 不属于重型再生障碍性贫血的主要临床表现是

- A. 贫血
- B. 脾肿大
- C. 出血
- D. 感染
- E. 发热

【正确答案】 B

【答案解析】 重型再障：起病急，进展迅速，常以出血、感染和发热为主要首表现。发病初期贫血常不明显，但进行性加重。几乎所有患者都有出血倾向，皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血、消化道出血、血尿、妇女月经过多等均常见，颅内出血发生率高，可致死亡。感染发热多为高热，常见皮肤、肺部和口腔感染等，可因败血症而死亡。病程短，患者常在数月至1年内死亡。

64. 甲亢最严重的临床表现为

- A. 甲状腺危象
- B. 甲亢性肌病
- C. 甲亢性心脏病并房颤
- D. 浸润性突眼
- E. 重症肌无力

【正确答案】 A

【答案解析】 甲状腺危象是甲状腺毒症急性加重的综合征，多发生于较重的甲亢未予治疗或治疗不充分的患者。

65. 有关类风湿关节炎关节表现特点的叙述，不正确的是

- A. 累及小关节
- B. 关节畸形
- C. 对称性
- D. 游走性
- E. 晨僵

【正确答案】 D

【答案解析】 类风湿关节炎关节表现：（1）晨僵见于95%以上患者，经夜间休息后，晨起时受累关节出现较长时间的僵硬、胶黏着样感觉，一般持续1小时以上。（2）疼痛出现最早的表现。最常出现的部位为腕、掌指关节，近端指间关节，其次是趾、膝、踝、肘、肩等关节。多呈对称性、持续性，但时轻时重。（3）肿胀呈对称性，以腕、掌指关节，近端指间关节，膝关节最常受累。（4）关节畸形多见于较晚期患者，常见的有手指关节的尺侧偏斜、鹅颈样畸形、纽扣花畸形等。（5）关节功能障碍 分为4级：① I级：能照常进行日常生活和工作；

②II级：能生活自理，并参加一定工作，但活动受限；③III级：仅能生活自理，不能参加工作和其他活动；④IV级：生活不能自理。

66. 胃溃疡最主要的症状是

- A. 恶心，呕吐
- B. 呕吐，黑粪
- C. 上腹疼痛
- D. 食欲减退
- E. 嗝气，反酸

【正确答案】 C

【答案解析】 上腹部疼痛是消化性溃疡的主要症状。

67. 某患者急性中毒皮肤潮红，皮肤黏膜呈樱桃红色，则其中毒现象见于

- A. 毒蕈中毒
- B. 阿托品中毒
- C. 吗啡中毒
- D. 甲醇中毒
- E. 一氧化碳中毒

【正确答案】 E

【答案解析】 一氧化碳中毒常表现为皮肤潮红、胸闷、气短、呼吸困难、幻觉、视物不清、判断力降低、运动失调、嗜睡、意识模糊或浅昏迷。口唇黏膜可呈樱桃红色。

68. 二尖瓣狭窄伴有何种心律失常最易并发栓塞

- A. 窦性心动过缓
- B. 房颤
- C. 阵发性心动过速
- D. 房室传导阻滞
- E. 室性期前收缩

【正确答案】 B

【答案解析】 二尖瓣狭窄伴房颤的患者赘生物引起动脉栓塞占20%~40%，栓塞可发生在机体的任何部位。脑、心脏、脾、肾、肠系膜和四肢为临床所见的体循环动脉栓塞部位。

69. 下列哪项不是原发性肝癌的致癌因素

- A. 病毒性肝炎
- B. 家族史及遗传因素
- C. 黄曲霉污染食物
- D. 肝硬化
- E. 胆道感染

【正确答案】 E

【答案解析】 原发性肝癌的病因

1. 病毒性肝炎：乙型病毒性肝炎病毒（HBV）和丙型病毒性肝炎病毒（HCV）与原发性肝癌有着明显的相关性。

2. 黄曲霉毒素污染：黄曲霉菌的代谢产物黄曲霉毒素B1是动物肝癌最强的致癌剂。

3. 肝硬化：肝硬化与肝癌密切相关。
4. 家族史及遗传因素：高发地区家族史是原发性肝癌发生的重要危险因素。
5. 其他：其他致癌物质或被疑为致癌的因素有：①酒精中毒；②亚硝胺类物质；③有机氯类农药；④雄激素及类固醇；⑤微量元素如低硒、锌及高镍、砷等；⑥铁代谢障碍。

70. 心力衰竭的基本病因中，属增加心脏容量负荷的是

- A. 肺动脉高压
- B. 肺动脉瓣狭窄
- C. 高血压
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

【正确答案】 E

【答案解析】 容量负荷过重：①心脏瓣膜关闭不全如二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全等；②左、右心或动静脉分流性先天性心血管病如室间隔缺损、动脉导管未闭等。

71. 下列哪项有助于判断气流阻塞严重程度的是

- A. 肺功能检查
- B. 血气分析
- C. 病史
- D. 肺气肿体征
- E. X线检查

【正确答案】 A

【答案解析】 肺功能检查是判断气流受限的主要客观指标，对诊断 COPD、评估严重程度、疾病进展、预后及对治疗的反应等有重要意义。

72. 下列属于行政处罚的是

- A. 警告
- B. 记过
- C. 降职
- D. 降级
- E. 开除

【正确答案】 A

【答案解析】 行政处罚的种类主要有警告、罚款、没收非法财物、没收违法所得、责令停产停业、暂扣或吊销有关许可证等。除了 A 以外，其余各项均为行政处分的范畴。

73. 国务院卫生行政部门建立重大、紧急疫情的

- A. 制定行政区域应急预案
- B. 预防控制体系
- C. 信息报告系统
- D. 监测与预警系统
- E. 制定全国突发事件应急预案

【正确答案】 C

【答案解析】国家建立突发事件应急报告制度国务院卫生行政主管部门制定突发事件应急报告规范，建立重大、紧急疫情信息报告系统。

[执业与助理共用题]74. 医疗事故争议协商不成的，当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起多长时间内，可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请

- A. 1 个月内
- B. 3 个月内
- C. 6 个月内
- D. 1 年内
- E. 2 年内

【正确答案】 D

【答案解析】 医疗事故争议协商不成的，当事人自知道或者应当知道其身体健康受到损害之日起 1 年内，可以向卫生行政部门提出医疗事故争议处理申请，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。

二、A2

75. 某患者，口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面色潮红，舌红干少苔，脉细数。其证候是

- A. 肺阴虚
- B. 肝阴虚
- C. 肾阴虚
- D. 心阴虚
- E. 脾胃阴虚

【正确答案】 E

【答案解析】 虚劳之脾胃阴虚证

证候主症：口干唇燥，不思饮食，大便燥结，甚则干呕，呃逆，面色潮红。

76. 患者，男性，43 岁。喘逆上气，咳痰不爽，痰质稠、色黄，恶寒身热，无汗，舌红苔黄，脉浮滑而数。治疗应首选

- A. 银翘散
- B. 桑白皮汤
- C. 麻杏石甘汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 清金化痰汤

【正确答案】 C

【答案解析】 喘证之表寒肺热证

证候主症：喘逆上气，胸胀或痛，息粗，鼻扇，咳而不爽，吐痰稠黏，伴形寒，身热，烦闷，身痛，有汗或无汗，口渴，舌苔薄白或罩黄，舌边红，脉浮数或滑。

证机概要：寒邪束表，热郁于肺，肺气上逆。

治法：解表清里，化痰平喘。

代表方：麻杏石甘汤加味。

77. 患者小便点滴不通，烦渴欲饮，咽干，呼吸短促，咳嗽，舌苔薄黄，脉数。

其主治方剂是

- A. 代抵挡丸

- B. 沉香散
- C. 八正散
- D. 清肺饮
- E. 以上均非

【正确答案】 D

【答案解析】 癃闭之肺热壅盛证

证候主症：小便不畅或点滴不通，咽干，烦渴欲饮，呼吸急促，或有咳嗽，舌红，苔薄黄，脉数。

治法：清泄肺热，通利水道。

代表方：清肺饮加减。

78. 患者咳逆阵作，痰中带血，时时汗出，胸胁胀痛，口苦咽干，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。其诊断是

- A. 肺痈成痈期
- B. 咳嗽痰热郁肺证
- C. 肺癆阴虚火旺证
- D. 咳血肝火犯肺证
- E. 喘证肺气郁痹证

【正确答案】 D

【答案解析】 咳血之肝火犯肺证

证候主症：咳嗽阵作，痰中带血或纯血鲜红，胸胁胀痛，烦躁易怒，口苦，舌质红，苔薄黄，脉弦数。

79. 患者肋肋胀痛，走窜不定，甚则引及胸背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，暖气频作，得暖气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。其证候是

- A. 肝郁化热证
- B. 肝脾不调证
- C. 肝胃不和证
- D. 肝络瘀阻证
- E. 肝郁气滞证

【正确答案】 E

【答案解析】 胁痛之肝郁气滞证

证候主症：肋肋胀痛，走窜不定，甚则引及胸背肩臂，疼痛每因情志变化而增减，胸闷腹胀，暖气频作，得暖气而胀痛稍舒，纳少口苦，舌苔薄白，脉弦。

80. 胸痹患者，女性，45岁。胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

- A. 寒凝气滞证
- B. 气虚血瘀证
- C. 饮邪上犯证
- D. 痰浊闭阻证
- E. 心血瘀阻证

【正确答案】 D

【答案解析】 胸痹之痰浊闭阻证

证候主症：胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，苔浊腻或白滑，脉滑。

81. 患者，男性，35岁。发热而欲近衣，形寒怯冷，四肢不温，少气懒言，头晕嗜卧，腰膝酸软，纳少便溏，面色（白光）白，舌质淡胖，边有齿痕，苔白润，脉沉细无力。此时的证候诊断是

- A. 阳虚发热证
- B. 气郁发热证
- C. 气虚发热证
- D. 血虚发热证
- E. 阴虚发热证

【正确答案】 A

【答案解析】 内伤发热之阳虚发热证

证候主症：发热而欲近衣，形寒怯冷，四肢不温，少气懒言，头晕嗜卧，腰膝酸软，纳少便溏，面色（白光）白，舌质淡胖，或有齿痕，苔白润，脉沉细无力。

82. 金某，女性，22岁。1周来双侧肩、肘、膝关节游走性疼痛，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，有皮下结节，伴有发热、恶风、汗出、口渴，舌质红，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 痹证的风湿热痹
- B. 痹证痰瘀痹阻证
- C. 痹证的行痹
- D. 痹证的着痹
- E. 痹证的痛痹

【正确答案】 A

【答案解析】 风湿热痹

证候主症：游走性关节疼痛，可涉及一个或多个关节，活动不便，局部灼热红肿，痛不可触，得冷则舒，可有皮下结节或红斑，常伴有发热、恶风、汗出、口渴、烦躁不安等全身症状，舌质红，舌苔黄或黄腻，脉滑数或浮数。

83. 患者虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。辨证为

- A. 不寐之心肾不交证
- B. 不寐之心胆气虚证
- C. 不寐之肝火扰心证
- D. 不寐之痰热扰心证
- E. 不寐之心脾两虚证

【正确答案】 B

【答案解析】 不寐之心胆气虚证。主症：虚烦不寐，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力，舌淡，脉弦细。

84. 患者，女性，29岁。左肩部可及4cm×2.5cm×3cm的肿物，质地软，呈分叶状，推之可移，无明显压痛，局部皮色正常，病史已有4年。应首先考虑的是

- A. 血管瘤

- B. 骨瘤
- C. 肉瘤
- D. 气瘤
- E. 脂瘤

【正确答案】 C

【答案解析】 肉瘤多见于成年女性，可发于身体各部，好发于肩、背、腹、臀及前臂皮下。大小不一，边界清楚，皮色不变，生长缓慢，触之柔软，呈扁平团块状或分叶状，推之可移动，基底较广阔，一般无疼痛。

85. 患者，女性，26岁，患慢性淋病，小便不畅；短涩，淋漓不尽，腰酸腿软，五心烦热，食少纳差；舌红，苔少，脉细数。其证候是

- A. 热毒入络
- B. 脾虚湿蕴
- C. 湿热毒蕴
- D. 阴虚毒恋
- E. 毒邪流窜

【正确答案】 D

【答案解析】 淋病之阴虚毒恋证（慢性淋病）

证候：小便不畅、短涩，淋漓不尽，女性带下多，或尿道口见少许黏液，酒后或疲劳易复发；腰酸腿软，五心烦热，食少纳差；舌红，苔少，脉细数。

治法：滋阴降火，利湿祛浊。

方药：知柏地黄丸酌加土茯苓、萆薢等。

86. 患者，女，45岁。颈前喉结一侧有一结块，柔韧而圆，如肉之团，随吞咽动作而上下移动，发展缓慢。诊断为

- A. 气瘰
- B. 肉瘰
- C. 石瘰
- D. 脂瘤
- E. 肉瘤

【正确答案】 B

【答案解析】 肉瘰是瘰病中较常见的一种，其临床特点是颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之团，随吞咽动作而上下移动，发展缓慢。好发于青年女性及中年人。相当于西医的甲状腺腺瘤或囊肿，属甲状腺的良性肿瘤。

87. 患者王某，下肢粗肿，发病较急，局部发热、发红，疼痛，活动受限，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。中医辨病为股肿，治疗宜选用

- A. 二妙散
- B. 活血通脉汤
- C. 参苓白术散
- D. 四妙勇安汤
- E. 复元活血汤

【正确答案】 D

【答案解析】 股肿之湿热下注证

证候：发病较急，表现为下肢粗肿，局部发热、发红，疼痛，活动受限，舌质红，苔黄腻，脉弦滑。

治法：清热利湿，活血化瘀。

代表方：四妙勇安汤加味。

88. 患者排尿或大便时偶有白浊，尿道不适，遗精或血精，腰膝酸软，五心烦热，失眠多梦。舌红少苔，脉细数，诊断为慢性前列腺炎。其证候为

- A. 湿热蕴结证
- B. 阴虚火旺证
- C. 肾阳虚损证
- D. 气滞血瘀证
- E. 以上均非

【正确答案】 B

【答案解析】 慢性前列腺炎之阴虚火旺证：排尿或大便时偶有白浊，尿道不适，遗精或血精，腰膝酸软，五心烦热，失眠多梦。舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火。

方药：知柏地黄汤加减。

89. 患者乳汁郁积结块，皮色不变或微红，肿胀疼痛。伴有恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘，苔薄，脉数。诊断为乳痈，治疗宜选用

- A. 透脓散
- B. 瓜蒌牛蒡汤
- C. 托里消毒散
- D. 白头翁汤
- E. 以上均非

【正确答案】 B

【答案解析】 乳痈之气滞热壅证

证候：乳汁郁积结块，皮色不变或微红，肿胀疼痛。伴有恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘，苔薄，脉数。

治法：疏肝清胃，通乳消肿。

方药：瓜蒌牛蒡汤加减。

90. 患者素有足癣史，1周前左第1、2指缝间作痒，糜烂流脓加重，2天前左大趾至小腿内侧出现红丝1条，宽约3mm，色红灼热，边界清楚，压痛明显，并伴有左腹股沟结块疼痛，诊断是

- A. 丹毒
- B. 烂疗
- C. 类丹毒
- D. 附骨疽
- E. 丝红疔

【正确答案】 E

【答案解析】 题目中出现红丝1条，可以快速判断是红丝疔。

红丝疔是发于四肢，皮肤呈红丝显露，迅速向上走窜的急性感染性疾病。其特点是先有手足疔疮或皮肤破损，红肿热痛，继则患肢内侧皮肤出现红丝一条或数条，迅速向躯干方向走窜，可伴恶寒发热等症状，邪毒重者可内攻脏腑，发生走黄。

91. 患者，女性，36岁，已婚。每于经期大便溏泄，脘腹胀满，月经量多，色淡质稀，神疲肢软，舌淡苔薄白，脉濡。治疗应首选

- A. 痛泻要方
- B. 四苓散
- C. 参苓白术散
- D. 健固汤
- E. 柴胡疏肝散

【正确答案】 C

【答案解析】 经行泻泄之脾虚证以经期大便溏泄，脘腹胀满，面浮肢肿，月经量多，色淡质稀，神疲肢软，舌淡苔薄白，脉濡为主证。

治法：健脾渗湿，理气调经。

方药：参苓白术散。

92. 患者停经50天，7天前查尿妊娠试验阳性，近3天恶心，呕吐酸水，恶闻油腻，口干口苦，胸满胁痛，舌淡红，苔微黄，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 香砂六君子汤
- B. 橘皮竹茹汤
- C. 左金丸
- D. 小半夏加茯苓汤
- E. 加味温胆汤

【正确答案】 B

【答案解析】 妊娠恶阻肝胃不和证

主要证候：妊娠早期，恶心，呕吐酸水或苦水，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息；舌淡红，苔微黄，脉弦滑。

治法：清肝和胃，降逆止呕。

方药：橘皮竹茹汤或苏叶黄连汤加减。

93. 患者月经周期延后，量少，色淡红，质清稀，小腹绵绵作痛；头晕眼花，心悸少寐，面色苍白；舌质淡红，脉细弱。其治法是

- A. 补血益气调经
- B. 滋肾养血调经
- C. 补益脾肾调经
- D. 健脾益气调经
- E. 滋补肝肾调经

【正确答案】 A

【答案解析】 月经后期之血虚证

主要证候：周期延后，量少，色淡红，质清稀，或小腹绵绵作痛；或头晕眼花，心悸少寐，面色苍白或萎黄；舌质淡红，脉细弱。

治法：补血益气调经。

方药：大补元煎。

94. 患者，女，26岁。经期小腹绵绵作痛，经色黯淡，量少，质稀薄；头晕耳鸣，面色晦黯，健忘失眠；舌质淡红，苔薄，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 温经汤

- C. 肾气丸
- D. 调肝汤
- E. 补中益气汤

【正确答案】 D

【答案解析】 根据患者的症状可辨证为痛经之肾气亏损证

主要证候：经期或经后 1~2 天内小腹绵绵作痛，伴腰骶酸痛；经色黯淡，量少，质稀薄；头晕耳鸣，面色晦黯，健忘失眠；舌质淡红，苔薄，脉沉细。

治法：补肾益精，养血止痛。

方药：益肾调经汤或调肝汤。

95. 患者，女性，28 岁，已婚，停经 46 天，妊娠试验 (+)，恶心，呕吐酸水，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息；舌淡红，苔微黄，脉弦滑。其证候是

- A. 肝胃不和
- B. 肝热
- C. 痰滞
- D. 胃虚
- E. 以上均非

【正确答案】 A

【答案解析】 妊娠恶阻之肝胃不和证

主要证候：妊娠早期，恶心，呕吐酸水或苦水，恶闻油腻；烦渴，口干口苦，头胀而晕，胸满胁痛，暖气叹息；舌淡红，苔微黄，脉弦滑。

96. 患者，女性，32 岁，已婚，曾孕 3 次，均自然流产，平日头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡，现又妊娠 33 天，夜尿频多，面色晦暗，舌淡苔白，脉沉弱，治疗应首选

- A. 补肾固冲丸
- B. 泰山磐石散
- C. 加味阿胶汤
- D. 补肾安胎饮
- E. 以上均非

【正确答案】 A

【答案解析】 滑胎之肾气不足证

主要证候：屡孕屡堕，甚或应期而堕；孕后腰酸膝软，头晕耳鸣，夜尿频多，面色晦暗；舌质淡，苔薄白，脉细滑尺脉沉弱。

治法：补肾健脾，固冲安胎。

方药：补肾固冲丸。

97. 患者人工流产后 3 天，高热腹痛，下腹部疼痛拒按，阴道流血，气味臭秽，量较多，脓血混杂，大便燥结，小便黄；舌红，苔黄厚，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 清瘟败毒饮
- B. 黄连解毒汤
- C. 仙方活命饮
- D. 少腹逐瘀汤

E. 五味消毒饮合大黄牡丹汤

【正确答案】 E

【答案解析】 急性盆腔炎之热毒炽盛证

主要证候：高热腹痛，恶寒或寒战，下腹部疼痛拒按，咽干口苦，大便秘结，小便短赤，带下量多，色黄，或赤白兼杂，质黏稠，如脓血，味臭秽，月经量多或淋漓不净；舌红，苔黄厚，脉滑数。

治法：清热解毒，利湿排脓。

方药：五味消毒饮合大黄牡丹汤。

98. 患者阴部瘙痒难忍，会阴部肤色变浅白，皮肤粗糙，皲裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮；舌红苔少，脉细数无力。治疗应首选的方剂是

- A. 易黄汤
- B. 左归丸
- C. 六味地黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 知柏地黄汤

【正确答案】 E

【答案解析】 阴痒之肝肾阴虚证

主要证候：阴部瘙痒难忍，干涩灼热，夜间加重，或会阴部肤色变浅白，皮肤粗糙，皲裂破溃；眩晕耳鸣，五心烦热，烘热汗出，腰酸腿软，口干不欲饮；舌红苔少，脉细数无力。

治法：滋阴补肾，清肝止痒。

方药：知柏地黄汤加减。

99. 患儿，8个月。晨起啼哭不安，阵阵捧腹啼叫，已解清稀大便3次，便多泡沫，臭气轻，可闻肠鸣，伴恶寒发热，鼻流清涕，指纹淡红。其证候是

- A. 脾虚泻
- B. 脾肾阳虚泻
- C. 湿热泻
- D. 风寒泻
- E. 伤食泻

【正确答案】 D

【答案解析】 风寒泻证

证候：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。

治法：疏风散寒，化湿和中。

代表方剂：藿香正气散。

100. 患儿，3岁。近日咳嗽频作，痰白质稀，鼻塞流涕，恶寒发热，无汗，查舌脉：苔薄白，脉浮紧。可辨证为

- A. 气虚咳嗽
- B. 风热咳嗽
- C. 痰热咳嗽
- D. 风寒咳嗽

E. 阴虚咳嗽

【正确答案】 D

【答案解析】 风寒咳嗽症状要点：咳嗽频作、声重，咽痒，痰白清稀，鼻塞流涕，恶寒无汗，发热头痛，全身酸痛，舌苔薄白，脉浮紧或指纹浮红。

治法：疏风散寒，宣肺止咳。

代表方剂：杏苏散、金沸草散。

101. 患儿，6岁。晨起喷嚏，流涕，继而发热，体温38.3℃，精神倦怠，晚间头面、躯干见稀疏细小皮疹，疹色淡红。治疗应首选

- A. 杏苏散
- B. 清营汤
- C. 银翘散
- D. 葱豉汤
- E. 桑菊饮

【正确答案】 C

【答案解析】 风痧之邪犯肺卫证

证候：发热恶风，喷嚏流涕，轻微咳嗽，精神倦怠，饮食欠佳，皮疹先起于头面、躯干，随即遍及四肢，分布均匀，疹点稀疏细小，疹色淡红，一般2~3日渐见消退，肌肤轻度瘙痒，耳后及枕部淋巴结肿大触痛，舌质偏红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

治法：疏风清热透疹。

代表方剂：银翘散。

102. 患儿，11个月。近来不思乳食，脘腹胀满，疼痛拒按，呕吐酸馊，烦躁哭吵，大便较干，臭秽，舌淡苔白腻。其诊断是

- A. 积滞
- B. 呕吐
- C. 厌食
- D. 腹痛
- E. 疳证

【正确答案】 A

【答案解析】 厌食是指小儿较长时间见食不贪，甚至拒食的一种病证。

疳证是一种脾胃虚损，运化失健引起的慢性营养障碍性疾病。临床以形体消瘦、面黄发枯，精神萎靡，饮食异常为特征。

积滞是指小儿乳食不节，停滞中脘，食积不化所致的一种脾胃病证。临床以不思乳食，食而不化，腹部胀满，大便不调等为特征。患儿近来不思乳食，脘腹胀满，疼痛拒按，呕吐酸馊，烦躁哭吵，大便较干，臭秽，舌淡苔白腻，综合患儿的症状表现，诊断为积滞。

103. 患儿，6岁。身体瘦弱，汗出较多，神萎不振，心烦少寐，寐后汗多，低热，口干，手足心热，哭声无力，唇舌色淡，苔少，脉细弱。治疗应首选

- A. 生脉散
- B. 玉屏风散
- C. 人参五味子汤
- D. 四物汤

E. 黄芪桂枝五物汤

【正确答案】 A

【答案解析】 小儿汗证之气阴亏虚证

证候：以盗汗为主，也常伴自汗，形体消瘦，汗出较多，神萎不振，心烦少寐，寐后汗多，或伴低热、口干、手足心灼热，哭声无力，口唇淡红，舌质淡，苔少或见剥苔，脉细弱或细数。

治法：益气养阴。

代表方剂：生脉散、当归六黄汤。

104. 患儿，5岁。气喘，喉间哮鸣，咳嗽，痰稀色白有泡沫，流清涕，唇青，形寒肢凉，无汗，口不渴，小便清长，大便溏薄，咽不红，舌淡红，苔薄白，脉浮紧。其证候是

- A. 风寒束肺证
- B. 痰热阻肺证
- C. 外寒内热证
- D. 肺实肾虚证
- E. 肺脾气虚证

【正确答案】 A

【答案解析】 哮喘之风寒束肺证

证候：气喘，喉间哮鸣，咳嗽，胸闷，痰稀色白有泡沫，喷嚏鼻塞，流清涕，唇青，形寒肢凉，无汗，口不渴，小便清长，大便溏薄，咽不红，舌质淡红，苔薄白或白滑，脉浮紧，指纹红。

治法：温肺散寒，涤痰定喘。

代表方剂：小青龙汤合三子养亲汤。

105. 患儿，2岁。两目干涩，怕光照，眼角赤烂，甚至黑睛混浊，白翳遮睛。诊断为疳证，其辨证治疗时宜用

- A. 泻心导赤散
- B. 八珍汤
- C. 防己黄芪汤
- D. 一贯煎
- E. 石斛夜光丸

【正确答案】 E

【答案解析】 疳证之眼疳：

症状：两目干涩，畏光羞明，眼角赤烂，甚则黑睛混浊，白翳遮睛或有夜盲等。

治法：养血柔肝，滋阴明目。

主方：石斛夜光丸加减。

106. 患者59岁，COPD病史11年，近来因咳、痰、喘加重就诊，查体示P2亢强，剑突下可触及心脏搏动，该患者最可能的诊断是

- A. 合并支气管肺炎
- B. 合并支气管扩张
- C. 合并冠心病
- D. 慢性肺源性心脏病
- E. COPD急性加重期

【正确答案】 D

【答案解析】 依据病史诊断为慢性肺源性心脏病。患者 COPD 病史 11 年，近来咳、痰、喘加重。且 P2 亢强，剑突下可触及心脏搏动是肺动脉高压和右心室肥大的表现，符合慢性肺源性心脏病的临床表现：

1. 原发疾病表现 COPD 病史最常见。
2. 肺动脉高压和右心室肥大体征
 - (1) 肺动脉高压：肺动脉瓣区 S2 亢进。
 - (2) 右心室肥大：心浊音界向左扩大，剑突下触及心脏收缩期搏动，三尖瓣区闻及收缩期杂音。

107. 男性患者，慢性肺心病病史 5 年，受凉后出现咳、痰量较多，伴气喘加重、下肢浮肿，其关键性的治疗措施是

- A. 控制肺部感染
- B. 解痉平喘
- C. 吸氧
- D. 应用利尿剂
- E. 使用洋地黄

【正确答案】 A

【答案解析】 控制感染为治疗慢性肺心病的关键措施。慢性肺心病并发的感染多为混合性感染，故应联合用药，一般可选用青霉素类、氨基糖甙类、氟喹诺酮类及头孢菌素类等。根据痰培养和药物敏感试验选用抗生素更合理。多采用静脉用药。长期应用抗生素要防止真菌感染。

108. 男性，42 岁，胃溃疡病史 12 年，近 2 个月上腹痛失去原规律性，伴反酸、暖气，内科治疗疗效不满意，急需检查的是

- A. 钡餐检查
- B. B 超检查
- C. 胃酸测定
- D. 便隐血试验
- E. 胃镜+活检检查

【正确答案】 E

【答案解析】 胃镜检查 and 黏膜活检可直接观察黏膜情况，确定病变的部位、大小、数目、表面状态、有无活动出血及其他合并疾病的存在，同时可以取活组织进行病理检查和 Hp 检测，是诊断消化性溃疡最有价值的检查方法。

109. 女性，54 岁，腹部 B 超检查发现肝占位性病变，查肝功能正常。最有助于诊断或排除原发性肝癌的是

- A. 7-GT
- B. AFP
- C. AST
- D. ALT
- E. LPH

【正确答案】 B

【答案解析】 甲胎蛋白（AFP）是当前诊断肝细胞癌最特异的标志物。检测血清中 AFP，有助于原发性肝癌的早期诊断。

110. 男性，50岁，既往体健，查体时发现肝右季肋下2cm，质硬无压痛，脾可触及，ALT正常范围，肝穿刺病理：假小叶形成，诊断是

- A. 慢性活动性肝病
- B. 慢性持续性肝炎
- C. 代偿期肝硬化
- D. 肝脓肿
- E. 肝纤维化

【正确答案】 C

【答案解析】 肝穿刺活检有假小叶形成，可确诊肝硬化。在肝硬化代偿期：症状轻微，表现为乏力、食欲减退、腹部不适、恶心、上腹部隐痛、轻微腹泻等，症状多呈间歇性。查体示肝脏轻度肿大，质地偏硬，无或轻度压痛，脾轻度或中度肿大。肝功能检查多数正常或轻度异常。

111. 女性，30岁，尿痛、尿频、尿急2天，伴发热、腰痛、恶心、呕吐，血压120/80mmHg，尿常规检查有红、白细胞及白细胞管型，其诊断可能是

- A. 急性膀胱炎
- B. 急性肾盂肾炎
- C. 慢性肾盂肾炎
- D. 急性肾炎
- E. 慢性肾炎

【正确答案】 B

【答案解析】 急性肾盂肾炎常发生于育龄妇女，临床表现有：①泌尿系统症状：膀胱刺激征、腰痛和（或）下腹部痛、肋脊角及输尿管点压痛、肾区压痛和叩击痛；腰痛程度不一，多为钝痛、酸痛；②全身感染症状：寒战、发热、头痛、恶心呕吐、食欲不振等，体温多在38℃~39℃，常伴有血白细胞计数升高和血沉增快。血常规急性肾盂肾炎时，血白细胞及中性粒细胞可升高。尿常规出现白细胞管型多提示为肾盂肾炎。

112. 男性，21岁，发热、反复感染、周身乏力2个月，拟诊为急性白血病，行骨髓检查有核细胞显著增生，有助于确诊的结果是

- A. 原始细胞>5%
- B. 原始细胞>10%
- C. 原始细胞>15%
- D. 原始细胞>20%
- E. 原始细胞>30%

【正确答案】 E

【答案解析】 急性白血病骨髓象：多数病例骨髓增生明显活跃或极度活跃，原始细胞等于或大于全部骨髓有核细胞的30%。

113. 患者，女，50岁，颈部肿块坚硬，不痛不胀，尚可推动，患部初起皮色如常，以后可呈橘皮样变，伴畏寒肢冷，纳呆便溏。舌质淡，苔白腻，脉沉细。治疗选方为

- A. 五味消毒饮
- B. 化痰开郁方
- C. 阳和汤

D. 化坚二陈丸

E. 八珍汤

【正确答案】 C

【答案解析】 失荣阴毒结聚证

证候：颈部肿块坚硬，不痛不胀，尚可推动，患部初起皮色如常，以后可呈橘皮样变，伴畏寒肢冷，纳呆便溏。舌质淡，苔白腻，脉沉细或弦细。

治法：温阳散寒，化痰散结。

方药：阳和汤加减。

114. 患儿，6岁患肾病综合征症见高度水肿，按之没指，腰腹下肢尤甚，面白无华，神疲畏寒，舌质淡，苔白，脉细无力其证候是

A. 脾肾阳虚证

B. 风水相搏证

C. 湿热内侵证

D. 肝肾阴虚证

E. 脾虚湿困证

【正确答案】 A

【答案解析】 小儿水肿之脾肾阳虚证

证候：全身浮肿，以腰腹、下肢为甚，按之深陷难起，畏寒肢冷，面白无华，神倦乏力，小便量少，甚或无尿，大便溏，舌淡胖，苔白滑，脉沉细。

三、A3/A4

(115~117 共用题干)

某患者，男，54岁。最近肢体关节疼痛较剧，痛有定处，得热痛减，遇寒痛增，关节不可屈伸，局部皮色不红，触之不热，舌苔薄白，脉弦紧。

115. 治疗方剂宜首选

A. 防风汤

B. 双合汤

C. 薏苡仁汤

D. 乌头汤

E. 宣痹汤

【正确答案】 D

【答案解析】 痛痹

证候主症：肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。

治法：散寒通络，祛风除湿。

代表方：乌头汤加减。

116. 根据患者症状采用的治法为

A. 清热通络，祛风除湿

B. 散寒通络，祛风除湿

C. 祛风通络，散寒舒筋

D. 除湿通络，祛风散寒

E. 培补肝肾，舒筋止痛

【正确答案】 B

【答案解析】 痛痹

证候主症：肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。

治法：散寒通络，祛风除湿。

代表方：乌头汤加减。

117. 关节发凉，疼痛剧烈，遇冷更甚，可加的药物为

- A. 萆薢、木通
- B. 半夏、南星
- C. 杜仲、桑寄生、淫羊藿
- D. 茯苓、泽泻、车前子
- E. 桂枝、干姜、全当归

【正确答案】 E

【答案解析】 痛痹

证候主症：肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感，舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。

治法：散寒通络，祛风除湿。

代表方：乌头汤加减。

加减：关节发凉，疼痛剧烈，遇冷更甚，加附子、细辛、桂枝、干姜、全当归，温经散寒，通脉止痛。

（118~120 共用题干）

患者头面部可见淡红色斑片，头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白，脉细数。

118. 其属中医的

- A. 脂溢性皮炎
- B. 头癣
- C. 油风
- D. 虫咬皮炎
- E. 接触性皮炎

【正确答案】 A

【答案解析】 脂溢性皮炎的概念：因皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑而得名，是发生在皮脂溢出部位的慢性炎症性皮肤病。根据本病皮疹干性与湿性的临床特点，干性者以养血润燥为主，湿性者以清热祛湿为主，内外治相结合。

脂溢性皮炎之风热血燥证

证候：多发于头面部，为淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，或头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白或黄，脉细数。

治法：祛风清热，养血润燥。

方药：消风散合当归饮子加减。

119. 辨证为

- A. 血热内蕴证
- B. 风热血燥证
- C. 肠胃湿热证

D. 心肾不交证

E. 血虚风燥证

【正确答案】 B

【答案解析】 脂溢性皮炎的概念：因皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑而得名，是发生在皮脂溢出部位的慢性炎症性皮肤病。根据本病皮疹干性与湿性的临床特点，干性者以养血润燥为主，湿性者以清热祛湿为主，内外治相结合。

脂溢性皮炎之风热血燥证

证候：多发于头面部，为淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，或头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白或黄，脉细数。

治法：祛风清热，养血润燥。

方药：消风散合当归饮子加减。

120. 治疗应选代表方剂为

A. 四物汤合六味地黄汤

B. 增液汤合益胃汤

C. 龙胆泻肝汤合化斑解毒汤

D. 参苓白术散合茵陈蒿汤

E. 消风散合当归饮子

【正确答案】 E

【答案解析】 脂溢性皮炎的概念：因皮肤油腻，出现红斑，覆有鳞屑而得名，是发生在皮脂溢出部位的慢性炎症性皮肤病。根据本病皮疹干性与湿性的临床特点，干性者以养血润燥为主，湿性者以清热祛湿为主，内外治相结合。

脂溢性皮炎之风热血燥证

证候：多发于头面部，为淡红色斑片，干燥、脱屑、瘙痒，受风加重，或头皮瘙痒，头屑多，毛发干枯脱落；伴口干口渴，大便干燥；舌质偏红，舌苔薄白或黄，脉细数。

治法：祛风清热，养血润燥。

方药：消风散合当归饮子加减。

（121~123 共用题干）

患者，女，27岁。经期头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，面色不华。舌淡胖，苔白腻，脉滑。

121. 根据患者症状此病辨证为

A. 痰湿中阻证

B. 虚寒证

C. 肝火证

D. 血瘀证

E. 寒凝血瘀证

【正确答案】 A

【答案解析】 经行头痛痰湿中阻证

证候：经前或经期头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，舌淡胖，苔白腻，脉滑。

治法：燥湿化痰，通络止痛。

方药：半夏白术天麻汤加葛根、丹参。

122. 此病治疗时的治法是

- A. 温经扶阳，暖宫止痛
- B. 温经散寒，化瘀止痛
- C. 清热除湿，化瘀止痛
- D. 健胃祛痰，活血止痛
- E. 燥湿化痰，通络止痛

【正确答案】 E

【答案解析】 经行头痛痰湿中阻证

证候：经前或经期头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，舌淡胖，苔白腻，脉滑。

治法：燥湿化痰，通络止痛。

方药：半夏白术天麻汤加葛根、丹参。

123. 治疗采用的代表方为

- A. 清热固经汤
- B. 逐瘀止血汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 半夏白术天麻汤
- E. 参苓白术散汤

【正确答案】 D

【答案解析】 经行头痛痰湿中阻证

证候：经前或经期头痛，头晕目眩，形体肥胖，胸闷泛恶，平日带多稠黏，月经量少，色淡，舌淡胖，苔白腻，脉滑。

治法：燥湿化痰，通络止痛。

方药：半夏白术天麻汤加葛根、丹参。

(124~126 共用题干)

患儿，2岁。发热咳嗽2天，高热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，呼吸困难，突见面色苍白，口唇紫绀，精神萎靡，肋下痞块，舌质紫，苔薄白，指纹紫滞。

124. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风热闭肺
- B. 毒热闭肺
- C. 邪陷厥阴
- D. 心阳虚衰
- E. 痰热闭肺

【正确答案】 D

【答案解析】 小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证

证候：面色苍白，唇指紫绀，呼吸浅促、困难，四肢不温，多汗，肋下痞块，心悸动数，虚烦不安，神委淡漠，小便减少，舌质淡紫，脉细弱疾数，指纹紫滞，可达命关。

治法：温补心阳，救逆固脱。

代表方剂：参附龙牡救逆汤。

125. 治疗宜采用的治法为

- A. 辛温宣肺，化痰止咳。
- B. 温补心阳，救逆固脱
- C. 清心开窍，平肝息风
- D. 补肺益气，健脾化痰
- E. 清热涤痰，开肺定喘

【正确答案】 B

【答案解析】 小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证

证候：面色苍白，唇指紫绀，呼吸浅促、困难，四肢不温，多汗，肋下痞块，心悸动数，虚烦不安，神委淡漠，小便减少，舌质淡紫，脉细弱疾数，指纹紫滞，可达命关。

治法：温补心阳，救逆固脱。

代表方剂：参附龙牡救逆汤。

126. 治疗采用的代表方为

- A. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤
- B. 人参五味子汤
- C. 参附龙牡救逆汤
- D. 羚角钩藤汤合牛黄清心丸
- E. 麻杏石甘汤

【正确答案】 C

【答案解析】 小儿肺炎喘嗽心阳虚衰证

证候：面色苍白，唇指紫绀，呼吸浅促、困难，四肢不温，多汗，肋下痞块，心悸动数，虚烦不安，神委淡漠，小便减少，舌质淡紫，脉细弱疾数，指纹紫滞，可达命关。

治法：温补心阳，救逆固脱。

代表方剂：参附龙牡救逆汤。

四、B

(127~128 共用选项)

- A. 六磨汤
- B. 柴胡疏肝散合失笑散
- C. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- D. 八珍汤合化积丸
- E. 逍遥散

127. 腹胀，腹部时有条索状物、按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。治疗应首选

【正确答案】 A

【答案解析】 积聚之食滞痰阻证

证候主症：腹胀或痛，腹部时有条索状物聚起，按之胀痛更甚，便秘，纳呆，舌苔腻，脉弦滑。

治法：理气化痰，导滞散结。

代表方：六磨汤加减。

128. 腹部积块明显，质地较硬，固定不移，刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，舌质紫，脉细涩。治疗应首选

【正确答案】 C

【答案解析】 积聚之瘀血内结证

证候主症：腹部积块明显，质地较硬，固定不移，隐痛或刺痛，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑，面颈胸臂或有血痣赤缕，女子可见月事不下，舌质紫或有瘀斑瘀点，脉细涩。

治法：祛瘀软坚，佐以扶正健脾。

代表方：膈下逐瘀汤合六君子汤加减。

（129~130 共用选项）

- A. 左归丸
- B. 大补元煎
- C. 滋水清肝饮
- D. 黄连阿胶汤
- E. 二阴煎

129. 治肾精不足之眩晕首选

【正确答案】 A

【答案解析】 眩晕肾精不足证

证候主症：眩晕日久不愈，精神萎靡，腰酸膝软，少寐多梦，健忘，两目干涩，视力减退，或遗精滑泄，耳鸣齿摇。或颧红咽干，五心烦热，舌红少苔，脉细数；或面色（白光）白，形寒肢冷，舌淡嫩，苔白，脉弱尺甚。

治法：滋养肝肾，益精填髓。

代表方：左归丸加减。

130. 治疗肾虚头痛首选

【正确答案】 B

【答案解析】 肾虚头痛

证候主症：头痛且空，眩晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力，滑精或带下，舌红少苔，脉细无力。

治法：养阴补肾，填精生髓。

代表药：大补元煎加减。

（131~132 共用选项）

- A. 一贯煎
- B. 芍药汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 柴胡疏肝散
- E. 龙胆泻肝汤

131. 胁痛瘀血阻络证的主方

【正确答案】 C

【答案解析】 胁痛之瘀血阻络证

证候主症：胁肋刺痛，痛有定处，痛处拒按，入夜痛甚，肋肋下或见有癥块，舌质紫暗，脉沉涩。

治法：祛瘀通络。

代表方：血府逐瘀汤或复元活血汤加减。

132. 胁痛肝络失养证的主方

【正确答案】 A

【答案解析】 胁痛之肝络失养证

证候主症：胁肋隐痛，悠悠不休，遇劳加重，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，舌红少苔，脉细弦而数。

治法：养阴柔肝。

代表方：一贯煎加减。

（133~134 共用选项）

- A. 黏液脓血便
- B. 便血少或无便血
- C. 呈滴血或射血状
- D. 水样便
- E. 羊粪样便

133. III期内痔便血的特点是

【正确答案】 B

【答案解析】 III期内痔：便血少或无便血，痔核大，呈灰白色，便时痔核经常脱出肛外。

134. II期内痔便血的特点是

【正确答案】 C

【答案解析】 内痔分期

（1）I期内痔无明显自觉症状，痔核小，便时粪便带血，或滴血，量少，无痔核脱出，镜检痔核小，质软，色红。

（2）II期内痔周期性、无痛性便血，呈滴血或射血状，量较多，痔核较大，便时痔核能脱出肛外，便后能自行还纳。

（3）III期内痔便血少或无便血，痔核大，呈灰白色，便时痔核经常脱出肛外，甚至行走、咳嗽、喷嚏、站立时也会脱出肛门，不能自行还纳，须用手托、平卧休息或热敷后方能复位。

（4）IV期内痔平时或腹压稍大时痔核即脱出肛外，手托亦常不能复位，痔核经常位于肛外，易感染，形成水肿、糜烂和坏死，疼痛剧烈。

（135~136 共用选项）

- A. 三金排石汤加减
- B. 八正散加减
- C. 知柏地黄汤加减
- D. 济生肾气丸加减
- E. 金铃子散合石苇散加减

135. 尿石症之气血瘀滞证的主治方剂是

【正确答案】 E

【答案解析】 尿石症之气血瘀滞证：

发病急骤，腰腹胀痛或绞痛，疼痛向外阴部放射，尿频，尿急，尿黄或赤。舌暗红或有瘀斑，脉弦或弦数。

治法：理气活血，通淋排石。

方药：金铃子散合石苇散加减。

136. 尿石症之肾气不足证的主治方剂是

【正确答案】 D

【答案解析】 尿石症之肾气不足证：

结石日久，留滞不去，腰部胀痛，时发时止，遇劳加重，疲乏无力，尿少或频数不爽，或面部轻度浮肿。舌淡苔薄，脉细无力。

治法：补肾益气，通淋排石。

方药：济生肾气丸加减。

（137～138 共用选项）

- A. 血瘀证
- B. 痰湿证
- C. 气滞证
- D. 血虚证
- E. 虚寒证

137. 经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。其证候是

【正确答案】 D

【答案解析】 月经过少之血虚证

主要证候：经来血量渐少，或点滴即净，色淡，质稀；或伴小腹空坠，头晕眼花，心悸怔忡，面色萎黄；舌淡红，脉细。

138. 患者月经量少，色淡红，质黏腻如痰；形体肥胖，胸闷呕恶，带多黏腻；舌淡，苔白腻，脉滑。其证候是

【正确答案】 B

【答案解析】 月经过少之痰湿证

主要证候：经行量少，色淡红，质黏腻如痰；形体肥胖，胸闷呕恶，或带多黏腻；舌淡，苔白腻，脉滑。

（139～140 共用选项）

- A. 左归丸
- B. 固经汤
- C. 固本止崩汤
- D. 上下相资汤
- E. 知柏地黄丸

139. 崩漏虚热证所选用的方剂是

【正确答案】 D

【答案解析】 崩漏之虚热证

主要证候：经来无期，量少淋漓不尽或量多势急，血色鲜红；面颊潮红，烦热少寐，咽干口燥，便结，舌红，少苔，脉细数。

治法：养阴清热，固冲止血。

方药：上下相资汤。

140. 崩漏脾虚证所选用的方剂是

【正确答案】 C

【答案解析】 崩漏之脾虚证

主要证候：经血非时暴下不止，或淋漓日久不尽，血色淡，质清稀；面色（白光）白，神疲气短，或面浮肢肿，小腹空坠，四肢不温，纳呆便溏；舌质淡胖，边有齿印，苔白，脉沉弱。

治法：补气摄血，固冲止崩。

方药：固本止崩汤或固冲汤。

（141~142 共用选项）

- A. 甘露消毒丹
- B. 银翘散
- C. 清瘟败毒饮
- D. 凉营清气汤
- E. 宣毒发表汤

141. 治疗手足口病湿热蒸盛证，应首选的方剂是

【正确答案】 C

【答案解析】 手足口病之湿热蒸盛证

证候：身热持续，烦躁口渴，小便黄赤，大便秘结，手、足、口部及四肢、臀部疱疹，痛痒剧烈，甚或拒食，疱疹色泽紫暗，分布稠密，或成簇出现，根盘红晕显著，疱液混浊，舌质红绛，苔黄厚腻或黄燥，脉滑数。

治法：清热凉营，解毒祛湿。

代表方剂：清瘟败毒饮。

142. 治疗手足口病邪犯肺脾证，应首选的方剂是

【正确答案】 A

【答案解析】 手足口病之邪犯肺脾证

证候：发热轻微，或无发热，或流涕咳嗽、纳差恶心、呕吐泄泻，1~2 天后或同时出现口腔内疱疹，破溃后形成小的溃疡，疼痛流涎，不欲进食。随病情进展，手掌、足跖部出现米粒至豌豆大斑丘疹，并迅速转为疱疹，分布稀疏，疹色红润，根盘红晕不著，疱液清亮，舌质红，苔薄黄腻，脉浮数。

治法：宣肺解表，清热化湿。

代表方剂：甘露消毒丹。

（143~144 共用选项）

- A. 生脉散合沙参麦冬汤
- B. 补中益气汤合生脉饮
- C. 黄芪桂枝五物汤
- D. 玉屏风散合六君子汤
- E. 金匱肾气丸合理中丸

143. 反复呼吸道感染脾肾两虚证应首选的方剂是

【正确答案】 E

【答案解析】 反复呼吸道感染之脾肾两虚证

证候：反复外感，面白少华，形体消瘦，肌肉松软，鸡胸龟背，腰膝酸软，形寒肢冷，发育落后，动则气喘，少气懒言，多汗易汗，食少纳呆，大便稀溏，舌质淡，苔薄白，脉沉细无力。

治法：温补肾阳，健脾益气。

代表方剂：金匱肾气丸合理中丸。

144. 反复呼吸道感染肺脾阴虚证应首选的方剂是

【正确答案】 A

【答案解析】 反复呼吸道感染之肺脾阴虚证

证候：反复外感，面白颧红少华，食少纳呆，口渴，盗汗自汗，手足心热，大便干结，舌质红，苔少或花剥，脉细数，指纹淡红。

治法：养阴润肺，益气健脾。

代表方剂：生脉散合沙参麦冬汤。

（145~146 共用选项）

- A. 导尿
- B. 血培养
- C. 尿常规
- D. 尿培养
- E. 静脉肾盂造影

145. 尿路感染的确诊依据是

【正确答案】 D

【答案解析】 中段尿细菌定量培养 $\geq 10^5$ / ml，称为真性菌尿，可确诊尿路感染。导尿或留置导尿管、膀胱镜和输尿管镜检查、逆行性尿路造影等可致尿路黏膜损伤、将细菌带入尿路，易引发医源性尿路感染。

146. 医源性尿路感染的常见原因是

【正确答案】 A

【答案解析】 中段尿细菌定量培养 $\geq 10^5$ / ml，称为真性菌尿，可确诊尿路感染。导尿或留置导尿管、膀胱镜和输尿管镜检查、逆行性尿路造影等可致尿路黏膜损伤、将细菌带入尿路，易引发医源性尿路感染。

（147~148 共用选项）

- A. 小脑出血
- B. 脑叶出血
- C. 壳核出血
- D. 丘脑出血
- E. 脑桥出血

147. 脑出血患者出现交叉性瘫痪、针尖样瞳孔和昏迷，判定出血部位是

【正确答案】 E

【答案解析】 脑桥出血：一侧脑桥少量出血，表现为交叉性瘫痪，两眼向病灶侧凝视麻痹。但多数累及两侧脑桥，出血破入第四脑室，迅速出现深度昏迷、双侧瞳孔针尖样缩小、四肢瘫痪和中枢性高热的特征性体征，并出现中枢性呼吸障碍和去脑强直，多于数天内死亡。

148. 脑出血患者表现为眩晕、共济失调而无瘫痪，可能的出血部位是

【正确答案】 A

【答案解析】 小脑出血：常有眩晕，频繁呕吐，后枕剧痛，步履不稳，构音障碍，共济失调和眼球震颤而无瘫痪。重症者因血肿压迫脑干或破入第四脑室，迅速出现昏迷、中枢性呼吸困难，常因急性枕骨大孔疝死亡。

（149~150 共用选项）

- A. 造成患者死亡、重度残疾

- B. 造成患者明显人身损害的其他后果
C. 造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍
D. 造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍
E. 造成患者重度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍
149. 属于四级医疗事故的是

【正确答案】 B

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

150. 属于一级医疗事故的是

【正确答案】 A

【答案解析】 根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：

一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；

二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；

三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；

四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

医学教育网

www.med66.com