

临床助理医师考试：《答疑周刊》2021 年第 27 期

【呼吸系统疾病】

1. 因结核引起的支气管扩张最好发的部位是

- A. 主支气管
- B. 上叶前段
- C. 上叶尖后段
- D. 下叶基底段
- E. 中叶

【正确答案】 C

【答案解析】 由于左侧总支气管较细长，与气管的交叉角度近于直角，因此痰液排出比右侧困难，特别是舌叶和下叶基底段更是易于引流不畅，导致继发感染，故肺部感染所致的支气管扩张左下叶支气管扩张较右下叶为多见。而结核性支气管扩张多见于上叶后段。故选 C。

2. 切断肺结核传染链的最有效方法是

- A. 增强所有公民的免疫力
- B. 在全民范围内进行科普宣传
- C. 发现并治愈涂阳病人
- D. 经常进行集体肺部 X 线检查
- E. 给所有应接种卡介苗者进行预防接种

【正确答案】 C

【答案解析】 痰菌阳性的患者说明排菌，是结核的传染源。

3. 呼吸中枢兴奋剂应用于下述哪种疾病

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 胸外伤引起肺通气量减少
- C. 严重脊柱畸形引起呼吸衰竭
- D. 急性多发性神经根炎引起呼吸衰竭
- E. 慢性肺心病引起呼吸衰竭

【正确答案】 E

【答案解析】 呼吸中枢兴奋剂主要作用于大脑皮层、延脑和脊髓，对于 CD 的呼

吸衰歇无作用。比如 C、D，由于呼吸中枢兴奋剂并不作用于脊柱和神经根，因此对急性多发性神经根炎不适用。AB 没有，目前临床上没有这种应用。

4. 患者，男性，71 岁，嗜烟 50 年。近 1 个多月因咳嗽性质改变，变为干咳，并出现血痰，胸闷明显，右胸隐痛，就诊时高度怀疑其患肺癌，应首选下列哪项检查

- A. 胸部 X 线正侧位照片
- B. 肺功能
- C. 血常规
- D. 纤维支气管镜
- E. 磁共振显像

【正确答案】 A

【答案解析】 肺功能不能帮助肺癌的定位定性诊断，所以不应该选 B。血常规也不能帮助肺癌的定位定性诊断，此时可能仅可以显示有无合并贫血，有无血小板减少致凝血功能障碍，有无白细胞增高合并感染，因此也不应该作为首选。怀疑肺癌做纤支镜检查前应该先做胸部 X 线照片或胸部 CT 片，尽可能先明确病灶部位在哪里，以减少做纤支镜的盲目性，故也不选 D。磁共振对诊断肺癌的意义远没有胸部 X 线照片或胸部 CT 片大，一般并不做此项检查，故也不应选 E。此时，最需要做的检查是胸部 X 线照片或胸部 CT 片，所以应该选 A。