

中西医外科 50 题



1. 饮食不洁同时感受外邪易发生

- A. 痈
- B. 疔
- C. 漏
- D. 痰
- E. 岩



2. 下列辨证中属阳的是

- A. 慢性发作的病
- B. 肿块坚硬如石
- C. 肿块平塌下陷
- D. 肿胀局限，根脚收束
- E. 脓液稀薄或见纯血水



3. 一切肿疡初起的治法总则是

- A. 消法
- B. 补法
- C. 补托法
- D. 透托法
- E. 药物疗法



4. 肿疡初起而肿势局限尚未成脓者选用

- A. 红灵丹
- B. 白降丹
- C. 九一丹
- D. 八宝丹
- E. 桃花散



5. 中医泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块为

- A. 结核
- B. 瘤
- C. 癭
- D. 疽
- E. 岩



6. 关于手术人员的准备下列哪项正确

- A. 一般准备

- B. 手臂消毒
C. 穿无菌手术衣
D. 戴无菌手套
E. 以上都是
7. 下列属于常用局麻药的是
- A. 苯巴比妥
B. 肾上腺素
C. 二甲双胍
D. 利多卡因
E. 哌替啶
8. 下列属气管插管适应证的是
- A. 颌面全麻手术
B. 颅脑外科全麻手术
C. 异常体位全麻手术
D. 控制性低血压手术
E. 以上都是
9. 关于麻醉前 ASA 病情分级标准错误的是
- A. I 级无脏器改变, 估计耐受麻醉手术良好
B. II 级化验有改变, 估计耐受麻醉手术有困难
C. III 级重要脏器功能有改变, 需重视术前准备工作
D. IV 级重要脏器功能明显改变, 麻醉手术有相当的危险
E. V 级重要脏器功能处于衰竭程度, 不论麻醉手术与否都有严重生命危险
10. 低位蛛网膜下腔麻醉, 麻醉最高平面在
- A. 胸 2
B. 胸 4
C. 胸 6
D. 胸 8
E. 胸 10
11. 急性呼吸性酸中毒应最先解决的问题是
- A. 肺部感染, 使用大量抗生素
B. 进行人工呼吸
C. 应用呼吸中枢兴奋剂
D. 解除呼吸道梗阻, 改善肺换气功能
E. 给予碱性液体
12. “三陷一低”见于
- A. 等渗性缺水轻度
B. 等渗性缺水中度
C. 低渗性缺水轻度
D. 低渗性缺水中度
E. 高渗性缺水轻度
13. 患者出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难时, 血清钾浓度为
- A. $<3.5\text{mmol/L}$
B. $<3.3\text{mmol/L}$

C. $<3.2\text{mmol/L}$

D. $<3.0\text{mmol/L}$

E. $<2.5\text{mmol/L}$

14. 低渗性缺水是指血清钠

A. $<135\text{mmol/L}$

B. $<140\text{mmol/L}$

C. $<145\text{mmol/L}$

D. $<150\text{mmol/L}$

E. $<155\text{mmol/L}$

15. 成分输血的优点是

A. 经济

B. 提高疗效

C. 使用合理

D. 减少不良反应

E. 以上都是

16. 关于溶血性反应的治疗，下列不正确的是

A. 抗休克

B. 保护肾功能

C. 防治弥散性血管内凝血

D. 换血治疗

E. 使用抗组胺药物

17. 外科输血的适应症中，急性出血需要输血时，失血量最少达总血量的

A. 8%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

E. 25%

18. 下列属于自体输血禁忌证的是

A. 有大出血的手术

B. 出血量在 1000ml 以上的择期手术

C. 胸腹开放性损伤超过 4 小时

D. 低温下的心内直视手术

E. 特殊血型无相应供血者

19. 下列描述错误的是

A. 切口裂开的诊断在术后 3~5 天

B. 切口裂开处理，全层裂开者要立即手术

C. 切口感染的处理包括抗感染及伤口扩创引流

D. 切口感染诊断包括术后伤口疼痛、体温升高、局部压痛

E. 切口部分裂开者可采用加压包扎

20. 对于糖尿病病人，其大手术前血糖应维持在

A. $4.8\sim9.6\text{mmol/L}$

B. $4.8\sim10.2\text{mmol/L}$

C. $5.0\sim11.2\text{mmol/L}$

D. 5.6~11.2mmol/L

E. 5.8~11.2mmol/L

21. 对于慢性疼痛的药物治疗中，常用于治疗轻度疼痛的药物是

A. 吗啡

B. 芬太尼

C. 可待因

D. 哌替啶

E. 阿司匹林

22. 网状淋巴管炎又称

A. 疔

B. 痈

C. 丹毒

D. 脓肿

E. 急性蜂窝织炎

23. 丹毒胎火胎毒证选用的治法是

A. 散风清火解毒

B. 清肝泻热利湿

C. 利湿清热解毒

D. 凉营清热解毒

E. 凉营泻火解毒

24. 治疗腰痛选用的治法是

A. 清热解毒

B. 清热利湿解毒

C. 散风清热，化痰消肿

D. 清肝解郁，消肿化毒

E. 和营祛瘀，清热利湿

25. 在原发病灶的基础上突然疮顶陷黑无脓，肿势软漫，迅速向周围扩散，皮色暗红，所属的中医证型为

A. 疔疮走黄证

B. 火陷证

C. 干陷证

D. 虚陷证

E. 红丝疔

26. 下列哪项属于特异性感染

A. 气性坏疽

B. 痈

C. 疔

D. 脓肿

E. 丹毒

27. 不宜行全脾切除术，宜保留副脾的人群是

A. 2岁以下儿童

B. 3岁以下儿童

C. 4岁以下儿童

D. 5岁以下儿童

E. 6岁以下儿童

28. 脑挫裂伤的西医治疗不正确的是

A. 脱水疗法

B. 低温疗法

C. 高压氧疗法

D. 肾上腺皮质激素

E. 神经营养剂和催眠药物

29. 尿道骑跨伤多引起

A. 前尿道损伤

B. 后尿道损伤

C. 尿潴留

D. 尿道完全断裂

E. 尿道狭窄

30. 成人头、颈部全部烧伤，其面积约为全身面积的

A. 3%

B. 6%

C. 9%

D. 18%

E. 20%

31. 兽咬伤前驱期治宜

A. 凉血解毒

B. 解毒固脱

C. 祛风解毒

D. 清热解毒

E. 泻火解毒

32. 下列有关纤维瘤的表述错误的是

A. 可有软硬两种

B. 软者有皮赘，大小不等

C. 软者多见于面、颈及胸背部

D. 硬者容易发生转移

E. 硬者生长缓慢，大小不定

33. 突眼征约占甲状腺功能亢进患者的

A. 30%~40%

B. 40%~50%

C. 50%~60%

D. 60%~70%

E. 70%~80%

34. 关于慢性淋巴性甲状腺炎的说法错误的是

A. 起病缓慢

B. 肿块质硬

C. 表面光滑

D. 肿大两侧多对称

E. 以甲状腺两侧叶为显著

35. 多为单发的乳腺肿块，边缘清楚，无粘连，极易推动，且无疼痛，腋窝淋巴结不大，可诊断为

A. 乳腺导管扩张症

B. 乳腺癌

C. 乳房纤维腺瘤

D. 积乳囊肿

E. 急性乳腺炎

36. 上消化道出血时若想要发现明显的出血部位需要做的检查是

A. B超

B. CT

C. MRI

D. 活组织检查

E. 纤维胃镜检查

37. 以下不属胃癌的 Borrmann 分型的是

A. 息肉样型

B. 浅表隆起型

C. 浸润溃疡型

D. 弥漫浸润型

E. 局限溃疡型

38. 门脉高压症内镜检查的最佳时间是在出血

A. 1小时内

B. 4小时内

C. 8小时内

D. 12小时内

E. 24小时内

39. 门静脉高压症的非特异性全身症状不包括

A. 乏力

B. 嗜睡

C. 厌食

D. 腹胀

E. 呕血

40. 肠梗阻的典型症状不包括

A. 腹痛

B. 腹胀

C. 腹泻

D. 呕吐

E. 停止排气排便

41. Charcot 三联征出现在

A. 急性化脓性胆囊炎

B. 急性梗阻性化脓性胆管炎

C. 急性出血、坏死性胰腺炎

D. 急性化脓性阑尾炎

E. 绞窄性小肠梗阻

42. 进食油腻食物后, 突发右上腹阵发性绞痛, 并向右肩部放射, 伴恶心、呕吐, 右上腹有腹膜刺激征, 可能为

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 黄疸型肝炎
- D. 壶腹部周围肿瘤
- E. 急性化脓性梗阻性胆管炎



43. 急性阑尾炎热毒证者宜用

- A. 大陷胸汤
- B. 大柴胡汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 大黄牡丹皮汤合透脓散
- E. 大黄牡丹皮汤合红藤煎



44. 腹股沟直疝最有效的治疗手段是

- A. 使用疝带
- B. 疝修补术
- C. 疝成形术
- D. 疝高位结扎
- E. 手术加强腹股沟三角



45. 股疝一旦嵌顿, 可迅速发展为

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 滑动性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝



46. 直肠癌常见的早期症状是

- A. 便血
- B. 腹痛
- C. 消瘦
- D. 大便变细或变形
- E. 排便习惯改变



47. 内痔的主要临床表现为

- A. 便血、贫血、坠胀
- B. 下血、嵌顿、贫血
- C. 便血、坠胀、肿块脱出
- D. 水肿、糜烂、坏死
- E. 嵌顿、坠胀、痔核脱出



48. 尿三杯试验的第三杯是指

- A. 最后 15ml
- B. 最后 12ml
- C. 最后 10ml
- D. 最后 8ml



E. 最后 6ml

49. 周围型下肢深静脉血栓形成发生的部位是

A. 腹壁浅静脉

B. 旋髂浅静脉

C. 股外侧静脉

D. 髂-股静脉

E. 股-腘静脉



50. 尖锐湿疣表皮赘生物的颜色为

A. 无色透亮

B. 暗红褐色

C. 皮色青紫

D. 皮色带绿

E. 以上均非



答案部分

1. 【正确答案】B

【答案解析】恣食膏粱厚味、醇酒炙博或辛辣刺激之品可使脾胃功能失调，湿热火毒内生，同时感受外邪则易发生痈、有头疽、疔疮等疾病。

2. 【正确答案】D

【答案解析】发病缓急：急性发作的病属阳；慢性发作的病属阴。

肿块硬度：肿块软硬适度，溃后渐消的属阳；坚硬如石或柔软如棉的属阴。

肿形高度：肿胀形势高起的属阳；平塌下陷的属阴。

肿胀范围：肿胀局限，根脚收束的属阳；肿胀范围不局限，根脚散漫的属阴。

脓液稀稠：溃后脓液稠厚的属阳；稀薄或纯血水的属阴。

3. 【正确答案】A

【答案解析】消法是运用不同的治疗方法和方药，使初起的肿疡邪毒不致结聚成脓而得到消散的治法，是一切肿疡初起的治法总则。

4. 【正确答案】A

【答案解析】肿疡初起而肿势局限尚未成脓者：阳证用阳毒内消散、红灵丹；阴证用阴毒内消散、桂麝散。

5. 【正确答案】A

【答案解析】结核即结聚成核之意，既是症状，又是病名。泛指一切皮里膜外浅表部位的病理性肿块。

6. 【正确答案】E

【答案解析】手术人员的准备：

- (1) 一般准备。
- (2) 手臂消毒。
- (3) 穿无菌手术衣和戴无菌手套。

7. 【正确答案】D

【答案解析】常用酯类局麻药有普鲁卡因、丁卡因等，酰胺类局麻药有利多卡因、布比卡因、罗哌卡因等。

8. 【正确答案】E

【答案解析】气管内插管的适应证：

- (1) 颌面、颈部、五官等需全麻大手术。
- (2) 开胸手术，需要肌肉松弛而使用肌肉松弛剂的上腹部或其他部位手术。
- (3) 急性消化道梗阻或急症饱食病人的手术。
- (4) 颅脑外科全麻手术。
- (5) 异常体位的全麻手术。
- (6) 颈部巨大包块，纵隔肿瘤或极度肥胖病人的手术。
- (7) 手术区位于或接近上呼吸道的全麻手术。
- (8) 低温或控制性低血压手术。
- (9) 急救与复苏。

9. 【正确答案】B

【答案解析】麻醉前 ASA 病情分级标准：

- I 级全身情况良好，无脏器改变，估计耐受麻醉手术良好；
- II 级轻微查体和/或化验有改变，但全身情况尚好，估计耐受麻醉手术仍好；
- III 级生命体征、重要脏器功能有改变，但处于代偿范围，需重视术前准备工作；
- IV 级生命体征、重要脏器功能明显改变，处于代偿不全状态，麻醉手术有相当的

危险；

V级生命体征、重要脏器功能处于衰竭程度，不论麻醉手术与否都有严重生命危险。

10. 【正确答案】E

【答案解析】低位蛛网膜下腔麻醉，麻醉最高平面在胸10。

11. 【正确答案】D

【答案解析】急性呼吸性酸中毒：尽快去除病因，保持呼吸道通畅，改善通气功能，必要时行气管插管或气管切开，或使用呼吸机。

12. 【正确答案】B

【答案解析】等渗性缺水中度：当体液大量迅速丧失达体重的4%~6%（相当于细胞外液的25%）时，可呈现血容量不足征象，表现为脉搏细快，肢端湿冷，“三网陷一低”即眼窝下陷、浅表静脉瘪陷、皮肤干陷（弹性差），血压降低或不稳。

13. 【正确答案】E

【答案解析】当血清钾 $<2.5\text{mmol/L}$ 时，可出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难。

14. 【正确答案】A

【答案解析】低渗性缺水是指血清钠 $<135\text{mmol/L}$ 。

15. 【正确答案】E

【答案解析】成分输血优点：

- (1) 提高疗效。
- (2) 减少不良反应。
- (3) 使用合理。
- (4) 经济。

16. 【正确答案】E

【答案解析】溶血反应的处理：

- (1) 抗休克。
- (2) 保护肾功能。
- (3) 若DIC明显，则使用肝素。
- (4) 必要时行血浆交换治疗。
- (5) 若血压低，则使用多巴胺、间羟胺升压。

17. 【正确答案】B

【答案解析】外科输血的适应证：

- (1) 急性出血，当失血量达总血容量的10%~20%（500~1000ml）。
- (2) 贫血或低蛋白血症。
- (3) 凝血机制异常和出血性疾病。
- (4) 重症感染。

18. 【正确答案】C

【答案解析】自体输血禁忌证：

- (1) 血液受胃肠道内容物或尿液等污染。
- (2) 血液可能有癌细胞的污染，如恶性肿瘤患者。
- (3) 心、肺、肝、肾功能不全者。
- (4) 贫血或凝血因子缺乏者。
- (5) 血液内可能有感染者。
- (6) 胸腹开放性损伤超过4小时以上者。

19. 【正确答案】A

【答案解析】切口裂开的诊断：

- (1) 1周左右。
- (2) 伤口渗液。
- (3) 肠襻与大网膜等脱出。

20. 【正确答案】D

【答案解析】大手术前，糖尿病患者血糖以控制在轻度升高状态（5.6~11.2mmol/L）较为适宜。禁食患者应用静脉胰岛素。

21. 【正确答案】E

【答案解析】慢性疼痛的药物治疗：多数癌痛可以使用口服止痛药。世界卫生组织（WHO）推荐三阶梯治疗方案。

- (1) 非阿片类止痛药如阿司匹林、对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药用于轻度疼痛。
- (2) “弱”的口服阿片类药物如布桂嗪、可待因和羟考酮等用于中度疼痛。
- (3) 强阿片类药物如吗啡、芬太尼和哌替啶等用于重度疼痛。对于顽固性疼痛和当患者无法口服药或者肠内吸收不良时可选用非肠道给药。

22. 【正确答案】C

【答案解析】丹毒即为网状淋巴管炎。

23. 【正确答案】D

【答案解析】胎火胎毒证的证候：脐腹部开始皮肤鲜红，向外游走遍体，压之减退，放手又显，表面紧张光亮，摸之灼手，肿胀触痛；兼有发热；舌红，苔黄，脉数。

治法：凉营清热解毒。

方药：犀角地黄汤加减。

24. 【正确答案】D

【答案解析】腋痛的证候：初起腋下可触及肿块，皮色不变，灼热疼痛，同时上肢活动不利；伴有恶寒发热，纳呆；舌红，苔薄白，脉滑数。

治法：清肝解郁，消肿化毒。

方药：柴胡清肝汤加减。

25. 【正确答案】A

【答案解析】疔疮走黄证：在原发病灶的基础上突然疮顶陷黑无脓，肿势软漫，迅速向周围扩散，皮色暗红；并伴有寒战高热，头痛，烦躁不安；舌质红绛，苔黄燥，脉洪数。

26. 【正确答案】A

【答案解析】痈、疖、脓肿、丹毒都属局部化脓性感染；气性坏疽属特异性感染。

27. 【正确答案】D

【答案解析】对于5岁以下儿童不宜行全脾切除术，应保留副脾或脾组织自体移植。

28. 【正确答案】E

【答案解析】脑挫裂伤的西医治疗：

- (1) 脱水疗法，一般用渗透性脱水剂或利尿脱水剂。
- (2) 肾上腺皮质激素。
- (3) 神经营养剂和促醒药物。
- (4) 高压氧疗法。
- (5) 低温疗法。
- (6) 防治并发症，积极防治消化道出血、肺炎、癫痫等并发症。

29. 【正确答案】A

【答案解析】尿道骑跨伤常发生会阴部、阴囊处淤斑、肿胀。前尿道损伤有会阴部疼痛，并可放射至尿道外口。所以说尿道骑跨伤多引起前尿道损伤。

30. 【正确答案】C

【答案解析】中国新九分法按体表面积划分为 11 个 9% 的等份，另加 1%，构成 100% 的体表面积，即头颈部：1×9%；躯干：3×9%；两上肢：2×9%；双下肢：5×9%+1%，共为 11×9%+1%。

31. 【正确答案】C

【答案解析】兽咬伤前驱期治宜祛风解毒，方用人参败毒散加减。

32. 【正确答案】D

【答案解析】纤维瘤临床表现：纤维瘤可分为软、硬两种。软者又称皮赘，有蒂，网大小不等，柔软无弹性，多见于面、颈及胸背部。硬者具有包膜，切除后不易复网发，不发生转移。其生长缓慢，大小不定，实性，圆形，质硬，光滑，界清，无粘连，活动度大，无压痛，很少引起压迫和功能障碍。

33. 【正确答案】D

【答案解析】甲状腺功能亢进 60%~70% 的患者有突眼征。

34. 【正确答案】E

【答案解析】慢性淋巴性甲状腺炎起病缓慢，初期甲状腺多呈轻中度弥漫性肿大，以峡部为显著，肿大两侧多对称，一侧肿大明显者少见；肿块质硬，病程较长者可扪及结节。

35. 【正确答案】C

【答案解析】乳房纤维腺瘤临床表现

1. 症状

(1) 乳房肿块。

(2) 乳房轻微疼痛。

(3) 其他症状：部分病人可有情志抑郁、心烦易怒、失眠多梦等症状。

2. 体征 乳房内可扪及单个或多个圆形或卵圆形肿块，质地坚韧，表面光滑，边缘清楚，无粘连，极易推动。患乳外观无异常，腋窝淋巴结不肿大。

36. 【正确答案】E

【答案解析】纤维胃镜检查：上消化道出血时可行急诊胃镜检查，可直接观察溃疡的部位、大小、深度，并可发现明显的出血部位。

37. 【正确答案】B

【答案解析】国际上按 Borrmann 分型，将浸润至固有肌层以下的进展期胃癌划分为四型。I 型：息肉样型或称结节型；II 型：局限溃疡型；III 型：浸润溃疡型；IV 型：弥漫浸润型。

38. 【正确答案】E

【答案解析】门脉高压症：内镜检查最好在出血 24 小时内进行，阳性率高。

39. 【正确答案】E

【答案解析】门静脉高压症的非特异性全身症状包括：乏力、嗜睡、厌食、腹胀，呕血为门静脉高压症的主要表现。

40. 【正确答案】C

【答案解析】典型的肠梗阻具有痛、呕、胀、闭四大症状。

(1) 腹痛：单纯性机械性肠梗阻一般呈阵发性剧烈腹痛；绞窄性肠梗阻往往出现剧烈的持续性腹痛伴有阵发性加重；麻痹性肠梗阻多呈持续性胀痛。

- (2) 呕吐。
- (3) 腹胀。
- (4) 停止排气排便。

41. 【正确答案】B

【答案解析】急性梗阻性化脓性胆管炎：发病急骤，病情进展快，除具有一般胆道感染的 Charcot 三联征（腹痛、寒战高热、黄疸）外，还可出现休克、中枢神经系统受抑制表现，即 Reynolds 五联征。

42. 【正确答案】A

【答案解析】急性胆囊炎：突发右上腹阵发性绞痛，常在饱餐、进油腻食物后或在夜间发作。疼痛常放射至右肩部、肩胛部和背部。伴恶心呕吐、厌食等。右上腹可有不同程度、不同范围的压痛、反跳痛及肌紧张，Murphy 征阳性。

43. 【正确答案】D

【答案解析】热毒证

证候：腹痛剧烈，全腹压痛、反跳痛，腹皮挛急；高热不退或恶寒发热，恶心纳差，便秘或腹泻；舌红绛苔黄厚，脉洪数或细数。

治法：通腑排毒，养阴清热。

方药：大黄牡丹汤合透脓散加减。

44. 【正确答案】E

【答案解析】早期可试用疝带治疗，但手术加强腹股沟三角仍是最有效的治疗手段。

45. 【正确答案】E

【答案解析】股疝不能自愈，容易嵌顿，一旦嵌顿可迅速发展为绞窄性。

46. 【正确答案】E

【答案解析】排便习惯改变是直肠癌常见的早期症状。

47. 【正确答案】C

【答案解析】内痔是肛门直肠疾病中最常见的一种疾病，以便血、坠胀、肿块脱出为主要临床表现。

48. 【正确答案】C

【答案解析】尿三杯试验最后 10ml 为第三杯。

49. 【正确答案】E

【答案解析】周围型下肢深静脉血栓形成是股-腘静脉以及小腿端深静脉处血栓形成。

50. 【正确答案】B

【答案解析】尖锐湿疣基本损害为淡红色或暗红褐色、柔软的表皮赘生物。