

妇产科主治医师考试：《答疑周刊》2022 年第 14 期

1. 关于臀位剖宫产术，下列叙述中不正确的是

- A. 宫口开全，脐带脱出
- B. 中骨盆狭窄
- C. 估计胎儿体重为 3000g
- D. 宫口未开全，胎足脱出
- E. 疤痕子宫

【正确答案】C

【答案解析】臀位剖宫产指征有：1. 胎儿体重 $\geq 3500\text{g}$ 或 B 超检查胎儿双顶径 $> 9.5\text{cm}$ ；2. 骨盆狭窄或有头盆不称者。头盆临界不称（头盆评分 7 分）又系单臀位可予短期试产。女型及猿型骨盆有利于臀位分娩，而扁型及男型骨盆不利于臀位分娩，可放宽剖宫产指征；3. B 超见胎头过度仰伸，呈“望星式”（发生率 $\leq 5\%$ ），需以剖宫产结束分娩，若由阴道分娩，胎儿脊椎损伤率高达 21%；4. 未临产，有妊娠合并症或并发症。如妊娠期高血压疾病、前置胎盘、糖尿病、胎盘功能不全者等。胎膜早破超过 12 小时，子宫畸形及其他软产道异常行选择性剖宫产；5. 子宫收缩欠佳，产程延长，用催产素无效者；6. 胎儿窘迫或脐带脱垂而胎心音尚好者；7. 先露下降缓慢，【医学教育网原创】软产道较紧，估计阴道分娩困难者；8. 足先露或膝先露的脐带脱垂率高达 16%~19%，一旦确诊即应考虑剖宫产；9. 早产儿胎头大于胎体更甚，且容易发生颅内出血，以剖宫产为宜；10. 有臀位分娩围产儿死亡及损伤史者是剖宫产指征，但仍需分析其原因，若为接产者技术问题，此次是否作剖宫产还需权衡利弊；11. 疤痕子宫；12. 不孕症经治疗后妊娠；13. 高龄初产；14. 臀位孕妇及其家属强烈要求剖宫产或绝育者，可考虑剖宫产。

2. 女，35 岁。因月经过多且经期延长，贫血，血红蛋白仅 56g/L，而决定行全子宫切除术。术前主刀医师在考虑手术各步注意事项时，下列哪项可不必顾虑

- A. 推离膀胱腹膜反折时，避免损伤膀胱
- B. 推离直肠子宫腹膜反折时，避免损伤直肠
- C. 切断子宫骶骨韧带时，避免损伤输尿管
- D. 切断圆韧带时，避免损伤输尿管

E. 切除子宫动脉时，注意勿损伤输尿管

【正确答案】D

【答案解析】圆韧带在其走形的过程中，没有和输尿管伴行。故选项 D 的描述不当。呈圆索状得名，由平滑肌和结缔组织构成，全长 12~14cm。起自宫角的前面、输卵管近端的稍下方，在阔韧带前叶的覆盖下向前外侧走行，到达两侧骨盆侧壁后，经腹股沟管止于大阴唇前端。有维持子宫前倾位置的作用。

3. 女性，31 岁。G₃P₂，孕 36 周，因产前出血 1 天住院，诊断部分性前置胎盘拟行剖宫产终止妊娠，前两次均因前置胎盘行子宫下段剖宫产，本次手术处理中可能发生的最大问题是

- A. 进入腹腔困难
- B. 胎盘植入
- C. 尿潴留
- D. 脏器损伤
- E. 手术切口愈合不良

【正确答案】B

【答案解析】胎盘植入是指胎盘绒毛因子宫蜕膜发育不良等原因而植入子宫肌层。胎盘植入的可能高危因素有：①子宫内膜损伤。人工流产、刮宫过度、多次人流、宫内感染、生育过多等均可造成子宫内膜受损。尤其是子宫内膜基底层破坏后，子宫内膜功能层将不能被有效修复，当再次妊娠时，着床处底蜕膜发育不良或缺如，绒毛就会直接植入子宫肌层形成植入性胎盘。②胎盘附着部位异常。胎盘若附着于子宫下段、子宫颈部及子宫角部，因此处内膜薄弱，有利于绒毛侵入宫壁肌层。③瘢痕子宫。

4. 孕 38 周临产，考虑骨盆入口狭窄，推测胎儿体重 3000g，下列哪项必须剖宫产

- A. 骶耻外径=18cm
- B. 骶耻外径 16.5~17.5cm
- C. 骨盆入口前后径=10cm
- D. 骨盆入口前后径 8.5~9.5cm

E. 骶耻外径 $<16\text{cm}$ ，入口前后径 $\leq 8\text{cm}$

【正确答案】E

【答案解析】入口平面狭窄分为三级：

I级为临界性狭窄，绝大多数可以经阴道自然分娩，【医学教育网原创】骶耻外径 18cm ，入口前后径 10cm ；

II级相对狭窄，需经试产后才能决定是否可以经阴道分娩，骶耻外径 $16.5\sim 17\text{cm}$ ，入口前后径 $8.5\sim 9.5\text{cm}$ ；

III级为绝对性狭窄，必须以剖宫产结束分娩。骶耻外径 $\leq 16\text{cm}$ ，入口前后径 $\leq 8.0\text{cm}$ 。

【医学教育网版权所有，转载务必注明出处，违者将追究法律责任】