

2021年《中药学综合知识与技能》考前密卷（二）答案解析

一、最佳选择题

1. 【正确答案】 B

【答案解析】 《本草经集注》创立了新的编写体例：药物分类按自然属性进行区分，改进了《本经》三品分类法；所载药物内容采用朱墨、大小字体分书法，保持了引录文献的原有面貌。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 元气的生理功能：推动和促进人体的生长发育，温煦和激发各脏腑、经络等组织器官的生理活动。元气是人体生命活动的原动力，是维持人体生命活动的最基本的物质。

3. 【正确答案】 D

【答案解析】 神乱，即神志异常。在疾病过程中，如患者表情淡漠、寡言少语、闷闷不乐，继则精神发呆，哭笑无常的，多为痰气凝结、阻蔽心神的癲病；烦躁不宁、登高而歌、弃衣而走、呼号怒骂、打人毁物、不避亲疏，多属痰火扰心的狂病；若突然跌仆，昏不知人，口吐涎沫，四肢抽动，多属痰迷心窍、肝风内动的痫病。神乱，常见于癲、狂、痫的患者。

4. 【正确答案】 A

【答案解析】 血清CK增高的临床意义是：CK为早期诊断急性心肌梗死(AMI)的灵敏指标之一。

5. 【正确答案】 D

【答案解析】 咳嗽——风燥伤肺证【方剂应用】基础方剂：桑杏汤（桑叶、苦杏仁、沙参、象贝、香豉、栀子、梨皮）加减。

6. 【正确答案】 E

【答案解析】 胸痹——气滞血瘀证【症状】心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，重者心痛彻背，背痛彻心，或痛引肩背，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重。舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦细。

7. 【正确答案】 A

【答案解析】 患者为泄泻——食滞肠胃证。

胃痛——食滞肠胃证【方剂应用】基础方剂：保和丸(神曲、山楂、茯苓、半夏、莱菔子、陈皮、连翘、麦芽)加减。

8. 【正确答案】 A

【答案解析】 眩晕——肝阳上亢证【症状】眩晕，耳鸣，头目胀痛，口苦，失眠多梦，遇烦劳郁怒而加重，颜面潮红，急躁易怒。舌红苔黄，脉弦或数。

【治法】平肝潜阳，滋养肝肾。

9. 【正确答案】 A

【答案解析】 中风是以猝然昏仆，不省人事，半身不遂，口眼喎斜，语言不利为主症的疾病。病轻者可无昏仆而仅见半身不遂及口眼喎斜等症状。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】 粉刺——胃肠湿热证【症状】颜面、胸背皮肤油腻，皮疹红肿疼痛，或有脓疱；伴口臭，便秘，溲黄。舌质红，苔黄腻，脉滑数。

中成药选用消痤丸、金花消痤丸、清热暗疮片。

11. 【正确答案】 D

【答案解析】 崩漏——瘀血阻络证【症状】经血非时而下，量时多时少，时出时止，或淋漓不断，或停闭数月又突然崩中，继之漏下，经色暗有血块；舌质紫暗或尖边有瘀点，脉弦细或涩。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】 厌食—脾胃气虚证【症状】不思进食，食不知味，神倦多汗，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力。舌淡，苔薄白，脉缓无力。【方剂应用】基础方剂：异功散(人参、白术、茯苓、陈皮、甘草)加减。

13. 【正确答案】 B

【答案解析】 咽喉肿痛——虚火上炎证【症状】咽部干燥，微痛，干痒，灼热，有异物感，干咳少痰，或痰中带血；或伴颧红潮热，耳鸣多梦。舌红，苔少，脉细数。

中成药选用知柏地黄丸、金参润喉合剂、玄麦甘桔含片。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 西红花的别名是藏红花、番红花。

15. 【正确答案】 D

【答案解析】 小青龙汤

【组成】麻黄 芍药 细辛 干姜 甘草(炙) 桂枝各三两 半夏半升 五味子半升

【功用】解表散寒，温肺化饮。

方中半夏燥湿化痰，和胃降逆，亦为佐药。

法半夏偏于祛寒痰，同时具有调和脾胃的作用，多用于痰多咳嗽，痰饮眩悸。

故小青龙汤中的半夏多采用的是法半夏。

16. 【正确答案】 B

【答案解析】 徐长卿久煎后有效成分易被破坏，故煎煮时应后下。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】 当归属于既易生虫，又易霉变的中药饮片。

18. 【正确答案】 C

【答案解析】 二便不通，阳实水肿，可用峻下通水的舟车丸，但为使峻下而不伤正气，常配合四君子丸同用。

19. 【正确答案】 B

【答案解析】 用金匱肾气丸治疗肾虚作喘，但若久治不愈，阳损及阴，兼见咽干烦躁者，又当配麦味地黄丸，生脉散或参蛤散同用，以平调阴阳，纳气平喘，且防止金匱肾气丸燥烈伤阴，降低副作用。

20. 【正确答案】 D

【答案解析】 速感康胶囊、维C银翘片、感冒清片、速感宁胶囊、感冒灵胶囊、感特灵胶囊、治感佳片、复方感冒灵片、感冒安片等中成药中均含有马来酸氨苯那敏。故选D。

21. 【正确答案】 B

【答案解析】 婴幼儿用药原则 1. 用药及时，用量宜轻。2. 宜用轻清之品。3. 宜佐健脾和胃之品。4. 宜佐凉肝定惊之品。5. 不宜滥用滋补之品。

22. 【正确答案】 B

【答案解析】 川楝子、黄药子、艾叶等因含有的萜与内酯类成分，故对肝功能有损伤。能引起中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大。

23. 【正确答案】 C

【答案解析】 暴怒影响的是肝，咳嗽咯血，说明病位在肺。此患者症状可辨证为肝火犯肺。肝属木，肺属金，正常时金克木，现肝病传及肺，即为“反克”，也就是相侮。

24. 【正确答案】 A

【答案解析】 热证，热证多由外感火热之邪，或因七情过激，郁而化火，或饮食不节，积蓄为热，或房事劳倦，劫夺阴精，阴虚阳亢，或阳盛阴虚，表现为机体的功能活动亢进的证候。

其临床表现多见发热喜凉，口渴饮冷，面红目赤，烦躁不宁，小便短赤，大便燥结，舌红苔黄而干燥，脉数等症状。以热为主，功能活动亢进为辨证要点。

25. 【正确答案】 C

【答案解析】 感冒——时行感冒【治法】清热解毒，凉血泻火。

26. 【正确答案】 C

【答案解析】 时行感冒症见突然发热，高热不退，甚则寒战，周身酸痛，无汗，咳嗽，口干，咽喉疼痛，伴明显全身症状，呈现流行性发作。舌红，苔黄，脉浮数。

感冒——时行感冒【治法】清热解毒，凉血泻火。

27. 【正确答案】 B

【答案解析】 郁证——肝气郁结证【症状】精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，胁肋胀痛，痛无定处，胸闷暖气，喜太息，不思饮食，大便不调，或秘或溏泄。舌苔薄或腻，脉弦。

【治法】疏肝解郁，理气畅中。

【方剂应用】基础方剂：柴胡疏肝散(陈皮、柴胡、川芎、枳壳、芍药、炙甘草、香附)加减。

28. 【正确答案】 A

【答案解析】 口疮——心脾积热证【症状】口腔黏膜溃疡，灼痛明显，常因过食煎炒辛辣或少寐而发，伴口渴心烦、失眠、小溲短黄、大便秘结；检查见口腔黏膜表面有黄白色假膜，周边红肿。舌红，苔黄或腻，脉数有力。

【方剂应用】基础方剂：凉膈散(大黄、朴硝、栀子、黄芩、连翘、薄荷、竹叶、甘草)加减。

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 产地类：中药讲究道地药材，医师在药名前常标明产地。如怀山药、田三七、东阿胶、杭白芍、广藿香、江枳壳、建泽泻等。

品质类：药材的品质优劣直接影响到疗效，历代医家都非常重视药材的质量优劣，医师处方对药品质量提出了要求。如明天麻、子黄芩、左牡蛎、左秦艽、金毛狗脊、鹅枳实、马蹄决明、九孔石决明、净山楂等。

30. 【正确答案】 A

【答案解析】 咯血、吐血者禁用猪牙皂。

31. 【正确答案】 B

【答案解析】 A项：用归脾丸与人参养荣丸同用，可明显增强补益心脾、益气养血、安神止痉的功效，治疗心悸失眠、眩晕健忘。故A项符合合理用药的原则。

B项：复方丹参滴丸和速效救心丸同属气滞血瘀型用药，其处方组成与功效基本相似，而且这一类的药物多数含有冰片，冰片不能过量使用，由于冰片药性寒凉，服用剂量过大易伤人脾胃，导致胃痛胃寒，在临床应用中使用其中1种即可。故B项不符合合理用药的原则。

C项：用附子理中丸与四神丸合用，可以增强温肾运脾、涩肠止泻的功效。治疗脾肾阴虚之五更泄泻。故C项符合合理用药的原则。

D项：用脑立清胶囊(片)与六味地黄丸合用，用于高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰者。故D项符合合理用药的原则。

E项：用二陈丸燥湿化痰为主药，治疗湿痰咳嗽；而脾为生痰之源，辅以平胃散同用，燥湿健脾，可明显增强二陈丸燥湿化痰之功。故E项符合合理用药的原则。

32. 【正确答案】 B

【答案解析】 逍遥散与抗结核药合用，能减轻西药抗结核药对肝脏的损害。

33. 【正确答案】 B

【答案解析】 含同种毒性成分，在临床应用中使用其中一种即可。所以在几种含有有毒成分或相同成分的中成药联用时，应注意有毒成分或相同成分的“叠加”，以免引起不良反应。故 B 项叙述错误。

34. 【正确答案】 C

【答案解析】 强心苷有较强的生理效应，如过量会引起中毒。故六神丸、救心丹等含有蟾酥、罗布麻、夹竹桃等强心苷成分的中成药，不宜与洋地黄、地高辛、毒毛旋花苷 X 等强心苷类同用。发汗解表药荆芥、麻黄、生姜等及其制剂（如防风通圣丸），与解热镇痛药阿司匹林、安乃近等合用，可致发汗太过，产生虚脱。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】 含马来酸氯苯那敏成分中成药的注意事项氯苯那敏也称扑尔敏，常用其马来酸盐，用于各种过敏性疾病，并与解热镇痛药配伍用于感冒，但有嗜睡、疲劳乏力等不良反应。因此在服药期间，不得驾驶车船、登高作业或操作危险的机器。B 选项金羚感冒片含有的西药成分有：阿司匹林、马来酸氯苯那敏、维生素 C。

36. 【正确答案】 B

【答案解析】 含朱砂的中成药安宫牛黄丸、牛黄清心丸、朱砂安神丸、天王补心丹、安神补脑丸、苏合香丸、人参再造丸、大活络丹等过量服用可产生各种中毒症状。泌尿系统表现为少尿、蛋白尿，严重者可致急性肾功能衰竭。

37. 【正确答案】 C

【答案解析】 分析与点评：本例用药错误属于 E 级。维 C 银翘片说明书提示，用于成人时每次 2 片，每日 3 次。本病例中患者使用维 C 银翘片每次 4 片，每日 4 次，未按照说明书推荐的用法用量使用，超过正常服用剂量和频次，导致出现发疹型药疹。维 C 银翘片属于中西药复方制剂，成分较复杂，不宜超剂量用药。

38. 【正确答案】 B

【答案解析】 根据题干所述“患者使用柴胡注射液出现了过敏性休克”，并且“立即停药及时抢救后痊愈”。故患者只用柴胡注射液的不良反应报告为停药后痊愈，本题选 B。

39. 【正确答案】 B

【答案解析】 超功能主治用药：某男，37 岁。化脓性扁桃体炎入院，静滴穿琥宁注射液 10 分钟后，出现高热、寒战、面色苍白、呼吸困难等症状。经抢救，症状逐渐好转。
分析：扁桃体炎往往是革兰阳性菌感染。而穿琥宁注射液主要用于病毒性肺炎、病毒性上呼吸道感染的治疗。

40. 【正确答案】 D

【答案解析】罂粟壳中含有的主要成分是吗啡、可待因、罂粟碱等，罂粟壳中毒与其所含的主要成分吗啡有关。其临床表现为昏睡或昏迷，抽搐，呼吸浅表而不规则，恶心、呕吐、腹泻，面色苍白，发钳、瞳孔极度缩小呈针尖样，血压下降等。

二、配伍选择题

[41~42]

41. 【正确答案】 E

【答案解析】肾精能化生“天癸”。所谓“天癸”，是随着肾中精气不断充盈，所产生的具有促进人体生殖器官发育成熟和维持人体生殖功能作用的精微物质。

42. 【正确答案】 B

【答案解析】肝主疏泄，可调畅情志：情志活动以气机调畅、气血调和为重要条件。“肝喜条达而恶抑郁”为其生理特性。肝的疏泄功能正常，气机调畅，气血和平，则心情舒畅，情志活动才能正常。肝的疏泄功能障碍，气机失于调畅，则会导致精神情志活动的异常，如易于抑郁、善怒等。

[43~44]

43. 【正确答案】 D

【答案解析】“气短，劳则尤甚”说明为气虚；“舌紫暗，脉沉涩”说明为血瘀。故应辨证为气虚血瘀。

心脏的正常搏动，有赖于心气、心阳的推动和温煦作用，以及心血、心阴的营养和滋润作用，从而维持正常的心力、心率、心律，维持血液在脉内正常运行。

故根据患者症状，总体分析为心主血脉的功能异常。

44. 【正确答案】 E

【答案解析】“胸胁胀痛”，说明病位在肝，且应辨证为气滞。气滞即气的运行失常，说明肝主疏泄的功能异常。

[45~46]

45. 【正确答案】 C

【答案解析】湿邪——湿性重浊：“重”，即沉重或重着之意。感受湿邪，常可见头重如裹，周身困重，四肢酸懒沉重等症状。若湿邪留滞经络关节，则阳气输布受阻，故见肌肤不仁，关节疼痛重着等，又称“湿痹”或“着痹”。“浊”，即秽浊不清，多指分泌物和排泄物秽浊不清而言。临床症状多见面垢眵多、大便溏泻、下痢黏液脓血、小便浑浊、妇女白带过多、湿疹浸淫流水等，都是湿邪秽浊的表现。

46. 【正确答案】 A

【答案解析】风邪——风邪善行而数变：“善行”，是指风邪致病，具有病位游移，行无定处的特性。“数变”，是指风邪致病，具有变幻无常和发病迅速的特点。如风疹块

(荨麻疹)就有皮肤成片风团瘙痒，发无定处，此起彼伏的特点。一般发病多急，传变也较快。

[47~49]

47. 【正确答案】 C

【答案解析】 克银丸的不良反应有肝损害、剥脱性皮炎。

48. 【正确答案】 E

【答案解析】 清开灵注射液的不良反应：以各种类型过敏反应为主，严重过敏反应包括过敏性休克、急性喉头水肿、过敏性哮喘，过敏性间质性肾炎。

49. 【正确答案】 D

【答案解析】 珍菊降压片的不良反应有消化系统表现为肝功能异常、黄疸、胰腺炎等；精神神经系统表现为头晕、视物模糊、运动障碍、麻木；皮肤及附件损害表现为剥脱性皮炎、全身水疱疹伴瘙痒等；代谢和营养障碍表现为低钾血症、低氯血症、低钠血症；有肾功能异常、心前区疼痛、心律失常、白细胞减少等个例报告。

[50~52]

50. 【正确答案】 B

【答案解析】 足或手软弱无力、行动不灵，多属于痿证。

51. 【正确答案】 E

【答案解析】 四肢抽搐，多见于风病，如痫证、破伤风、小儿急惊风、小儿慢惊风等。

52. 【正确答案】 C

【答案解析】 项背强直，角弓反张，四肢抽搐，则为痉病。

[53~55]

53. 【正确答案】 E

【答案解析】 虚脉[脉象]三部脉举按皆无力，隐隐蠕动于指下，令人有一种软而空豁的感觉，是无力脉的总称。[主病]气血两虚，尤多见于气虚。

54. 【正确答案】 B

【答案解析】 弱脉：沉细而应指无力。主气血两虚诸证。

55. 【正确答案】 A

【答案解析】 微脉：“极细而软，按之欲绝，若有若无”。常见于心肾阳衰及暴脱的病人。

[56~58]

56. 【正确答案】 C

【答案解析】肝阳上亢证临床表现，常见头痛、头胀、眩晕，时轻时重，耳鸣耳聋，口燥咽干，两目干涩，失眠健忘，腰膝酸软，舌红少津，脉多弦而有力。一般以肝阳亢于上而肾阴亏于下的证候表现作为辨证要点。

57. 【正确答案】 B

【答案解析】血虚生风证：临床表现常见头目眩晕，视物模糊，面色萎黄，肢体麻木或震颤，手足拘急，肌肉瞤动，脉弦细，舌淡少苔。血虚筋脉失养所表现的动风，一般有筋脉、爪甲、两目、肌肤等失去血的濡养的症状，以及全身血虚为辨证要点。

58. 【正确答案】 A

【答案解析】肝阳化风证：临床表现常见眩晕欲仆，头胀头痛，肢麻或震颤，舌体歪斜，舌红脉弦，甚则猝然昏倒，舌强，语言不利，或半身不遂。一般根据患者平素具有肝阳上亢的现象结合突然出现肝风内动的症状为辨证要点。

[59~60]

59. 【正确答案】 E

【答案解析】气滞血瘀证的临床表现，常见胸胁胀满走窜疼痛，性情急躁，并兼见痞块刺痛拒按，舌紫暗或有瘀斑等。妇女还可见月经闭止，或痛经、经色紫暗有块，乳房胀痛等症状。一般以病程较长和肝经循行部位的疼痛痞块为辨证要点。

60. 【正确答案】 B

【答案解析】气血两虚证的临床表现，常见少气懒言，乏力自汗，面色苍白或萎黄，心悸失眠，舌淡而嫩，脉细弱等。多以气虚与血虚的症状同见为辨证要点。

[61~63]

61. 【正确答案】 B

【答案解析】咳嗽——风燥伤肺证可选用的中成药有蜜炼川贝枇杷膏、二母宁嗽丸、雪梨止咳糖浆。

62. 【正确答案】 A

【答案解析】咳嗽——风寒袭肺证可选用的中成药有通宣理肺丸、风寒咳嗽丸、杏苏止咳糖浆、三拗片。

63. 【正确答案】 C

【答案解析】咳嗽——痰湿蕴肺证可选用的中成药有二陈丸、橘贝半夏颗粒、蛇胆陈皮胶囊。

[64~66]

64. 【正确答案】 A

【答案解析】胸痹——气滞血瘀证【症状】心胸疼痛，如刺如绞，痛有定处，入夜为甚，重者心痛彻背，背痛彻心，或痛引肩背，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒、劳累而加重。舌质紫暗，有瘀斑，苔薄，脉弦细。

【方剂应用】基础方剂：血府逐瘀汤(当归、生地、桃仁、红花、枳壳、赤芍、柴胡、川芎、桔梗、牛膝、甘草)加减。

65. 【正确答案】 C

【答案解析】 胸痹——气虚血瘀证【症状】胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代。

【方剂应用】基础方剂：补阳还五汤(当归、川芎、黄芪、桃仁、红花、地龙、赤芍)加减。

66. 【正确答案】 D

【答案解析】 胸痹——寒凝心脉证【症状】猝然心痛如绞，心痛彻背，喘不得卧，多因气候骤冷或骤感风寒而发病或加重，伴形寒，甚则手足不温，冷汗自出，胸闷气短，心悸，面色苍白。舌质紫暗，或有瘀斑瘀点，苔薄，脉沉紧或沉细。

【方剂应用】基础方剂：枳实薤白桂枝汤(枳实、厚朴、薤白、桂枝、瓜蒌实)合当归四逆汤(当归、桂枝、芍药、细辛、通草、炙甘草、大枣)加减。

[67~70]

67. 【正确答案】 E

【答案解析】 头痛——瘀血头痛【症状】头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史。舌紫暗，或有瘀斑，瘀点，苔薄白，脉细或细涩。

【方剂应用】基础方剂：通窍活血汤(赤芍、川芎、桃仁、红花、麝香、老葱、鲜姜、枣、酒)加减。

68. 【正确答案】 C

【答案解析】 头痛——风寒头痛【症状】头痛时作，痛连项背，常有拘急收紧感，伴恶风畏寒，受风尤剧，口不渴。舌苔薄白，脉浮紧。

【方剂应用】基础方剂：川芎茶调散(川芎、荆芥、薄荷、羌活、细辛、白芷、甘草、防风)加减。

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 头痛——肝阳头痛【症状】头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐不宁，口苦面红，或兼胁痛。舌红苔黄，脉弦数。

【方剂应用】基础方剂：天麻钩藤饮(天麻、钩藤、生石决明、川牛膝、桑寄生、杜仲、栀子、黄芩、益母草、朱茯神、夜交藤)加减。

70. 【正确答案】 B

【答案解析】 头痛——风热头痛【症状】头痛而胀，甚则头痛如裂，发热或恶风，口渴欲饮，面红目赤，或便秘溲黄。舌尖红，苔黄，脉浮数。

【方剂应用】基础方剂：芎芷石膏汤(川芎、白芷、石膏、菊花、藁本、羌活)加减

[71~73]

71. 【正确答案】 E

【答案解析】 消渴——肾阴亏虚证，中成药选用六味地黄丸、麦味地黄丸。

72. 【正确答案】 B

【答案解析】 消渴——脾胃气虚证，中成药选用参苓白术散、益津降糖口服液。

73. 【正确答案】 A

【答案解析】 消渴——阴虚燥热证，中成药选用降糖胶囊、消渴平片、消糖灵胶囊。

[74~76]

74. 【正确答案】 C

【答案解析】 癃闭——膀胱湿热证【症状】小便点滴不通，或量极少而短赤灼热，小腹胀满，口苦口黏，或口渴不欲饮，或大便不畅。舌质红，苔黄腻，脉数。宜选用的中成药有八正合剂、清淋颗粒。

75. 【正确答案】 E

【答案解析】 癃闭——湿热瘀阻证【症状】小便点滴而下，或尿如细线，甚则阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗或有瘀点。舌苔黄腻，脉涩。宜选用的中成药有癃清片、前列通瘀胶囊、前列通片、癃闭舒胶囊。

76. 【正确答案】 A

【答案解析】 癃闭——肾阳衰惫证【症状】小便不通或点滴不爽，排出无力，面色？白，神气怯弱，畏寒肢冷，腰膝冷而酸软无力。舌淡胖，苔薄白，脉沉细或弱。宜选用的中成药有济生肾气丸、金匱肾气丸。

[77~79]

77. 【正确答案】 A

【答案解析】 虚劳——血虚证【症状】头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡黄或淡白无华，口唇、爪甲色淡，妇女月经量少。舌质淡，脉细。

中成药选用归芪口服液、再造生血片、薯蓣丸。

78. 【正确答案】 D

【答案解析】 虚劳——阳虚证【症状】畏寒怕冷，四肢不温，口淡不渴，自汗，小便清长或尿少浮肿，大便溏薄。舌体胖，舌质淡，苔白滑，脉沉迟。

中成药选用补白颗粒。

79. 【正确答案】 C

【答案解析】 虚劳——气虚证【症状】面色（白光）白或萎黄，气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力。舌质淡，或有齿痕，舌苔薄白，脉虚无力。

中成药选用十一味参芪胶囊、参芪十一味颗粒。

[80~82]

【正确答案】 A、C、D

【答案解析】 2015 版《中国药典》载有毒性药材和饮片共计 83 种，其中有大毒的饮片 10 种，如川乌、马钱子（马钱子粉），天仙子、巴豆（巴豆霜）、草乌、斑蝥等；有毒的饮片 42 种，如三颗针、山豆根、天南星（制天南星）、木鳖子、附子、雄黄、制川乌等；有小毒的饮片 31 种，如土鳖虫、川楝子、苦杏仁、北豆根、重楼、蛇床子、吴茱萸等。

[83~85]

83. 【正确答案】 B

【答案解析】 白降丹【用法用量】外用适量，研末调敷或作药捻。【注意事项】不可内服，具腐蚀性。

84. 【正确答案】 D

【答案解析】 雄黄【用法用量】0.05~0.1g，入丸散用。外用适量，熏涂患处。【注意事项】内服宜慎，不可久用；孕妇禁用。

85. 【正确答案】 E

【答案解析】 生马钱子【用法用量】内服，0.3~0.6g，炮制后入丸散。【注意事项】孕妇禁用；不宜生用，不宜多服久服；运动员慎用；有毒成分能经皮肤吸收，外用不宜大面积涂敷。

[86~87]

86. 【正确答案】 D

【答案解析】 凝胶剂：除另有规定外，应避光，密闭贮存，并应防冻。

87. 【正确答案】 E

【答案解析】 流浸膏剂与浸膏剂：除另有规定外，应置遮光容器内密封，流浸膏剂应置阴凉处贮存。

[88~90]

88. 【正确答案】 A

【答案解析】 麝香保心丸与地高辛等强心类药物联合用药，由于麝香保心丸中所含蟾酥的基本化学结构与强心苷相似，在化学结构上有相似之处，故具有与强心苷类药物地高辛相似的强心作用，联合应用势必会造成相同或相似功效的累加，产生拟似效应，诱发强心苷中毒，出现频发性早搏等心律失常等不良反应。

89. 【正确答案】 D

【答案解析】 法莫替丁片为抗溃疡抗酸药，与含有多量黄酮类成分的银杏叶制剂同时服用可产生络合效应，形成螯合物，影响疗效。因此，在服用抗酸类西药时应避免与含黄酮类的中药如复方丹参片、复方丹参滴丸、银杏叶片等同时应用，应分时应用，一般来讲，以间隔 1 小时为宜。

90. 【正确答案】 C

【答案解析】对患有糖尿病的心脑血管患者用培元通脑胶囊、益心通脉颗粒、活血通脉片等含有甘草、人参、鹿茸等成分的中成药使降糖药的疗效降低。因为，甘草、人参、鹿茸具有糖皮质激素样作用，可以促进糖原异生，升高血糖，与降糖药二甲双胍、消渴丸、阿卡波糖和胰岛素产生拮抗作用，导致降糖效果降低。

三、综合分析选择题

[91~93]

91. 【正确答案】 E

【答案解析】肺脾两虚证临床常见久咳不已，短气乏力，痰多清稀，食纳减少，腹胀便溏，甚则足面浮肿。苔白舌淡，脉细弱。肺虚则失其宣降，脾虚则湿痰内生，故久咳、痰多清稀。脾气不足，运化失常，故食少腹胀、便溏。脾肺气虚，故短气乏力，若气不行水，水湿停留则见浮肿。苔白舌淡、脉细弱皆为气虚见症。一般以咳喘，纳少、腹胀便溏为主，伴见气虚症状为辨证要点。

此题中患者“哮喘，气短乏力”为肺气虚，“食纳减少，腹胀便溏”病位在脾胃，故为肺脾两虚证。

92. 【正确答案】 A

【答案解析】气虚证临床常见头晕目眩，少气懒言，疲倦乏力，自汗，活动时诸症加剧。舌淡，脉虚无力。一般以全身功能活动低下为辨证要点。此题中有短气乏力，因此是气虚。

93. 【正确答案】 D

【答案解析】以上可以判定是气虚，因此是属于虚证。

[94~96]

94. 【正确答案】 C

【答案解析】“神疲乏力，气短懒言，自汗”可辨证为气虚证。“舌淡黯”可辨证为血瘀证。故根据患者的症状，可辨证为气虚血瘀型胸痹。

95. 【正确答案】 B

【答案解析】胸痹——气虚血瘀证【治法】益气活血，通脉止痛。

96. 【正确答案】 A

【答案解析】气虚血瘀型胸痹可选用的中成药有芪参益气滴丸、参桂胶囊、心力丸、活心丸。题目问的是“不宜选用”，故本题选A。

[97~98]

97. 【正确答案】 B

【答案解析】消渴丸的主要化学成分是格列本脲。

98. 【正确答案】 A

【答案解析】 对患有糖尿病的心脑血管患者用培元通脑胶囊、益心通脉颗粒、活血通脉片等含有甘草、人参、鹿茸等成分的中成药使降糖药的疗效降低。因为，甘草、人参、鹿茸具有糖皮质激素样作用，可以促进糖原异生，升高血糖，与降糖药二甲双胍、消渴丸、阿卡波糖和胰岛素产生拮抗作用，导致降糖效果降低。

[99~101]

99. 【正确答案】 D

【答案解析】 新癆片的主要化学成分是吡哌美辛。

100. 【正确答案】 E

【答案解析】 新癆片含有吡哌美辛。含吡哌美辛的中成药使用注意吡哌美辛的不良反应发生率高达 35%~50%，其中约 20% 的患者常因不能耐受而被迫停药。常见的有：

(1) 胃肠道反应 如恶心、呕吐、厌食、消化不良、胃炎、腹泻，偶有胃溃疡、穿孔、出血。

(2) 中枢神经系统反应 头痛、眩晕、困倦，偶有惊厥、周围神经痛、晕厥、精神错乱等。

(3) 造血系统损害 可有粒细胞、血小板减少，偶有再生障碍性贫血。

(4) 过敏反应 常见为皮疹、哮喘、呼吸抑制、血压下降等。

(5) 可引起肝肾损害。

101. 【正确答案】 B

【答案解析】 新癆片含有吡哌美辛，吡哌美辛可以引起肝肾损害，因此是需要注意的事项。

[102~103]

102. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者为中风——气虚血瘀证。可选用的中成药有脉络通颗粒、软脉灵口服液、脑安颗粒、消栓胶囊、复方地龙胶囊。

消栓胶囊的用法用量：口服。一次 2 粒，一日 3 次。饭前半小时服用。故 D 项错误。

103. 【正确答案】 D

【答案解析】 藿香正气水是酞剂，含有乙醇，对胃肠道有刺激作用，故建议餐后服用。

阿司匹林肠溶片：如果餐后服用肠溶型药，可能被食物阻隔在胃中不能及时进入肠道，可能提前在胃内溶解，增加局部刺激性，故肠溶型建议餐前 30min 服用。

中西药之间需要间隔半小时服用。

[104~106]

104. 【正确答案】 E

【答案解析】 豆蔻需打碎后下，肉豆蔻温中止泻宜煨用。

105. 【正确答案】 B

【答案解析】 本例用药错误属于B级，发生错误但未发给患者，因此未造成相应伤害。

106. 【正确答案】 C

【答案解析】 发生用药错误的风险因素

1. 管理因素 包括管理制度落实不到位，缺少专职的管理机构和人员，未建立正确的用药安全文化等因素。科学的管理可以有效降低用药风险，如在防范用药错误过程中，从系统观出发，从组织机构的角度系统设计防御错误的机制，可以有效减少犯错误的环境和机会。即错误发生后，关键是弄清楚为什么出现这些问题以及如何防范差错的再次发生。

2. 流程因素 包括医疗机构内部缺乏有效沟通，临床治疗和用药的各环节衔接不畅，从医生开具处方到患者用药的过程中系统信息的传递发生差错或药品信息未能及时更新，对易发生的用药错误在信息系统中没有提示等。

3. 环境因素 如工作空间狭小，药品或给药装置等堆放混乱，外用药、内服药等不同类别的药品未分开摆放，工作环境嘈杂拥挤，噪声污染较大等。

4. 人员因素 包括人力资源不足，人员知识结构欠缺，且缺乏系统规范的培训，工作人员风险意识不强，未能严格遵守规章制度和标准化操作规程等。

5. 药品因素 包括药品的外观、包装、标签、名称等相近，各听似、看似易混淆药品未分开摆放并设置特殊警示标识，特定剂型、特殊用法药品未与普通药品区分管理，近效期药品未及时更新，药品储存条件不足等。

[107~110]

107. 【正确答案】 B

【答案解析】 便秘—热秘【症状】大便干结，腹胀腹痛，口干口臭，面红心烦，或有身热，小便短赤。舌红，苔黄燥，脉滑数。

108. 【正确答案】 D

【答案解析】 便秘—热秘【治法】泻热导滞，润肠通便。

109. 【正确答案】 A

【答案解析】 热秘【方剂应用】基础方剂：麻子仁丸(麻子仁、芍药、枳实、大黄、厚朴、杏仁)加减。

110. 【正确答案】 C

【答案解析】 用于治疗便秘的麻仁丸，宜用蜂蜜冲水送服，以增其润肠和中之效。

四、多项选择题

111. 【正确答案】 ABDE

【答案解析】 患者咨询的内容一般可分为：

- (1) 药品名称：包括通用名、商品名、别名。
- (2) 适应病证：药品适应病证与患者病情相对应。
- (3) 用药禁忌：各种禁忌，包括配伍禁忌、妊娠禁忌、证候禁忌、饮食禁忌等。
- (4) 用药方法：包括口服药品的正确服用方法、服用时间和用药前的特殊提示；栓剂、滴眼剂、气雾剂等外用剂型的正确使用方法；缓释制剂、控释制剂、肠溶制剂等特殊剂型的用法；如何避免漏服药物，以及漏服后的补救方法。
- (5) 用药剂量：包括首次剂量、维持剂量；每日用药次数、间隔；疗程。
- (6) 服药后预计疗效及起效时间、维持时间。
- (7) 药品的不良反应与药物相互作用。
- (8) 有否替代药物或其他疗法。
- (9) 药品的鉴定辨识、贮存和有效期。
- (10) 药品价格、报销，是否进入医疗保险报销目录等。

112. 【正确答案】 ABCE

【答案解析】 沟通技巧

- (1) 认真聆听
- (2) 注意口头语言的表达
- (3) 注意肢体语言的运用
- (4) 注意书面语言的运用
- (5) 注意掌握时间：与患者的谈话时间不宜过长，提供的信息也不宜过多，过多的信息不利于患者的掌握，反而会成为沟通的障碍。
- (6) 关注特殊人群

故 D 项表述错误，D 不选。其他选项表述正确。

113. 【正确答案】 ACE

【答案解析】 正治，适用于临床表现与疾病证候本质相一致的病证。临床上大多数疾病的临床表现与疾病的证候性质是相符的，如寒病即见寒象、热病即见热象、虚病即见虚象、实病即见实象等，所以正治是临床上最常用的一种治疗法则。常用的治法有寒者热之、热者寒之、虚则补之、实则泻之等。

114. 【正确答案】 CDE

【答案解析】 虚劳——血虚证【症状】头晕眼花，心悸多梦，手足发麻，面色淡黄或淡白无华，口唇、爪甲色淡，妇女月经量少。舌质淡，脉细。

中成药选用归芪口服液、再造生血片、薯蓣丸。

115. 【正确答案】 ABDE

【答案解析】 将同一处方中经常一起配伍应用的，如“相须”、“相使”配伍的饮片、处方常用的“药对”药物可同放于一个斗中。如麻黄、桂枝；酸枣仁、远志；射干、

北豆根；党参、黄芪；桃仁、红花；杜仲、续断；陈皮、青皮；泽泻、猪苓；山药、薏苡仁；板蓝根、大青叶；辛夷、苍耳子；火麻仁、郁李仁；羌活、独活；苍术、白术；麦冬、天冬；川乌、草乌；知母、浙贝母；蒲公英、紫花地丁；篇蓄、瞿麦；三棱、莪术；乳香、没药；小茴香、橘核。

116. 【正确答案】 ABCE

【答案解析】 含有机酸成分的中药如乌梅、山茱萸、陈皮、木瓜、川芎、青皮、山楂、女贞子等，与一些碱性药物如氢氧化铝、氢氧化钙、碳酸钙、枸橼酸镁、碳酸氢钠、氨茶碱、氨基糖苷类抗生素等合用时，会发生酸碱中和而降低或失去药效。

117. 【正确答案】 ABCE

【答案解析】 肝功能不全者用药基本原则和注意事项

- (1) 明确疾病诊断和治疗目标
- (2) 忌用有肝毒性的药物 (B 对)
- (3) 注意药物相互作用，避免产生新的肝损害 (E 对)
- (4) 坚持少而精的用药原则 (A 对)
- (5) 定期检查肝功能，及时调整治疗方案 (C 对)

118. 【正确答案】 AC

【答案解析】 五行相克的顺序是：木土水火金木……。

- A 项肝属木，肾属水，水生木，故运用的是五行相生关系。
- B 项心属火，肾属水，水克火，故运用的是五行相克关系。
- C 项肺属金，肾属水，金生水，故运用的是五行相生关系。
- D 项脾属土，肾属水，土克水，故运用的是五行相克关系。
- E 项肝属木，脾属土，木克土，故运用的是五行相克关系。

119. 【正确答案】 CDE

【答案解析】 患者为泄泻—食滞肠胃证，治疗宜选用的中成药有加味保和丸、枳实导滞丸、和中理脾丸。

120. 【正确答案】 ABC

【答案解析】 十全大补汤、补中益气汤、小柴胡汤等与西药抗肿瘤药联用，可以提高疗效。其中的中药可以提高天然杀伤细胞活性的能力，还可能有造血及护肝作用。