

医学教育网妇产科主治医师:《答疑周刊》2022年第28期

压力性尿失禁,此知识点近期学员提问较多,也是考试的易考点,更是很多学员容易忽视的点,现总结相关考题如下:

**问题索引:**

1. 压力性尿失禁的病因?
2. 压力性尿失禁的特点?
3. 压力性尿失禁的分度?

**具体解答:**

**1. 压力性尿失禁的病因?**

关于压力性尿失禁病因错误的叙述是

- A. 与年龄无关
- B. 压力性尿失禁和盆腔脏器脱垂紧密相关
- C. 生育的胎次与尿失禁的发生呈正相关性
- D. 肥胖女性发生压力性尿失禁的机率高
- E. 遗传因素

【正确答案】A

【答案解析】女性压力性尿失禁是中老年妇女的常见疾病,随着年龄增长,女性尿失禁患病率逐渐增高。

**2. 压力性尿失禁的特点?**

关于压力性尿失禁叙述不正确的是

- A. 常伴有阴道前壁膨出
- B. 90%以上为解剖型压力性尿失禁
- C. 部分患者尿道功能不协调
- D. 压力性尿失禁分为两型
- E. 可形成直肠子宫陷凹

【正确答案】E

【答案解析】ABCD 均为压力性尿失禁常考点。

### 3. 压力性尿失禁的分度?

最容易出现压力性尿失禁的是

- A. 子宫脱垂 I 度轻
- B. 子宫脱垂 I 度重
- C. 子宫脱垂 II 度轻
- D. 子宫脱垂 II 度重
- E. 子宫脱垂 III 度

【正确答案】E

【答案解析】III度脱垂者，即使休息后，块状物亦不再自行回缩，常需用手推才能还纳至阴道内。若脱出的子宫及阴道粘膜高度水肿，即使用手协助亦难以回纳。由于外阴部有块状物脱出，患者行动极为不便，且可长期摩擦导致宫颈和阴道壁溃疡，甚至出现流血。当崩溃继发感染时，则有脓血分泌物渗出。重度子宫脱垂患者多伴有重度膀胱膨出，故易有尿潴留；若同时有尿道膨出，还可发生压力性尿失禁。