

医学教育网护士执业资格:《答疑周刊》2022年第50期

问题索引:

1. 【问题】完全流产和稽留流产怎么鉴别?
2. 【问题】小儿卡介苗注射角度?
3. 【问题】中毒型痢疾的症状?
4. 【问题】肺结核化疗方案的疗程一般是?

具体解答:

1. 【问题】完全流产和稽留流产怎么鉴别?

【解答】(1) 完全流产: 妊娠产物已完全排出, 阴道出血逐渐停止, 腹痛逐渐消失。宫口关闭, 子宫接近正常大小或略大。[医学/教育网]

(2) 稽留流产: 又称过期流产, 指胚胎或胎儿已死亡, 滞留宫腔内未能及时自然排出。

2. 【问题】小儿卡介苗注射角度?

【解答】卡介苗皮内注射, 常选择上臂三角肌下缘, 与皮肤呈 $5^{\circ}$ 角刺入皮内。

3. 【问题】中毒型痢疾的症状? [医学/教育网]

【解答】中毒型临床表现: 儿童多见, 起病急骤, 突起高热达 $40^{\circ}\text{C}$ 以上、反复惊厥、意识障碍, 迅速出现循环衰竭和呼吸衰竭, 而肠道症状轻微或缺如, 虽无腹泻, 但直肠拭子取标本镜检, 可发现大量脓细胞和红细胞。根据临床表现可分为3型:

- ①休克型(周围循环衰竭型): 主要表现为感染性休克;
- ②脑型(呼吸衰竭型): 有脑水肿、脑疝表现, 病人常死于呼吸衰竭;
- ③混合型: 兼有以上两型表现, 最为凶险。[医学/教育网]

4. 【问题】肺结核化疗方案的疗程一般是?

【解答】(1) 常规疗法: 使用异烟肼、链霉素和对氨基水杨酸钠12~18个月。但由于此疗程长, 病人不易坚持全程而影响疗效;

(2) 短程疗法: 联合用异烟肼、利福平等2个以上杀菌剂, 6~9个月。强化阶

段在开始的 1~3 个月内, 每天用药。其后是巩固阶段, 每周 2 次用药至疗程结束。[医学教育网]



正保医学教育网  
www.med66.com