

全科主治医师《基础知识》模考试卷

一、A1

1. 以家庭为单位的健康照顾是指

- A. 根据家庭居室的环境状况，提供健康相关指导服务
- B. 根据居家老年人的疾病状况，提供家庭病床服务
- C. 根据家庭生活周期的不同阶段，提供周全可预测性的服务
- D. 根据家庭成员是否有孕妇和婴幼儿，提供孕产妇和婴幼儿保健服务
- E. 根据家庭成员是否有传染病，提供传染病预防和控制的公共卫生服务

2. 周期性健康检查计划最理想的执行者是

- A. 全科医师
- B. 临床专科医师
- C. 卫生防疫人员
- D. 临床护理人员
- E. 社区护理人员

3. 虽然没有明显的疾病，但呈现体力下降、反应能力减退、适应能力下降等，这类人群属于

- A. 健康人群
- B. 高危人群
- C. 亚健康人群
- D. 重点保健人群
- E. 患者

4. 流行病学研究所指的群体是

- A. 只限于患者
- B. 只限于一个家庭
- C. 只限于非患者
- D. 一定范围内的人群

E. 限于全人类

5. 控制混杂偏倚可采取的措施不包括

- A. 多因素分析方法
- B. 尽量选择新发病例
- C. 选择研究组后，根据研究组个体的特征选择对照组
- D. 在设计阶段，可采用限制研究对象特征的方法
- E. 资料分析阶段控制混杂因素采用分层分析的方法

6. 接诊一名急性胸痛患者，基层医师的首要任务是

- A. 详细问诊及查体
- B. 立刻行心电图检查
- C. 立即安排转诊
- D. 判断生命体征是否稳定
- E. 检测心肌坏死标志物

7. 区别急性与慢性白血病的主要依据是

- A. 病程长短
- B. 血白细胞增加程度
- C. 骨髓幼稚细胞的成熟程度
- D. 有无肝、脾、淋巴结肿大
- E. 血片中原始细胞比例

8. 全科医学中“以社区为范围的健康照顾”应该做到

- A. 在社区服务机构内设立诊室
- B. 组成服务团队，每日巡回于居民区
- C. 以一定的人群健康需求为基础，提供个体和群体相结合的服务
- D. 对辖区内的全体居民进行健康登记
- E. 将社区全体居民的健康状况一一录入电脑

9. 孕 36 周娩出体重 2600g 女婴。对该女婴的正确诊断是

- A. 正常儿
- B. 足月儿
- C. 低体重儿
- D. 早产儿
- E. 极低体重儿

10. 影响遵医行为的因素不包括

- A. 患者知识
- B. 健康信念
- C. 处方
- D. 人际关系
- E. 民族种族

11. 夏秋劳动时被植物擦伤角膜应高度警惕可能发展为

- A. 细菌性角膜炎
- B. 病毒性角膜炎
- C. 真菌性角膜炎
- D. 棘阿米巴性角膜炎
- E. 过敏性葡萄膜炎

12. 不属于家庭内在结构的是

- A. 角色弹性良好
- B. 家庭价值观
- C. 分享权威型
- D. 机械性沟通
- E. 家庭四世同堂

13. 全科医疗中以问题为导向的医疗记录采用什么方法描述问题

- A. 社区人群功能测定量表（COOP）
- B. 社区为导向的基本医疗（COPC）
- C. 以问题为导向医疗记录中问题描述的方法（SOAP）
- D. 以问题为中心的医疗记录（POMR）
- E. 世界家庭医生学会（WONCA）

14. 烟焦油中有害物质的危害是

- A. 致癌
- B. 导致成瘾
- C. 减少肺泡含气量
- D. 降低神经兴奋性
- E. 减少红细胞含氧量

15. 下列关于脂肪瘤的叙述正确的是

- A. 位于皮内
- B. 脂肪瘤多有明显症状
- C. 界限不清楚
- D. 表面不光滑
- E. 多发性脂肪瘤有家族史

16. 肝性脑病患者灌肠或导泻时禁用

- A. 25%硫酸镁
- B. 生理盐水
- C. 生理盐水加食醋
- D. 肥皂水
- E. 乳果糖加水

17. 家庭气氛主要是指

- A. 家庭感情气氛
- B. 家庭交流气氛
- C. 家庭关心气氛
- D. 家庭经济气氛
- E. 家庭人文气氛

18. 围产期是指

- A. 妊娠满 15 周 (胎儿体重  $\geq 500\text{g}$  或身长  $\geq 25\text{cm}$ ) 至新生儿出生后 7 日之内
- B. 妊娠满 20 周 (胎儿体重  $\geq 800\text{g}$  或身长  $\geq 30\text{cm}$ ) 至新生儿出生后 3 日之内
- C. 妊娠满 27 周 (胎儿体重  $\geq 1000\text{g}$  或身长  $\geq 35\text{cm}$ ) 至新生儿出生后 5 日之内
- D. 妊娠满 28 周 (胎儿体重  $\geq 1000\text{g}$  或身长  $\geq 35\text{cm}$ ) 至新生儿出生后 7 日之内
- E. 妊娠满 30 周 (胎儿体重  $\geq 1000\text{g}$  或身长  $\geq 33\text{cm}$ ) 至新生儿出生后 6 日之内

19. 百白破的初种年龄是

- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 5 个月

20. 女性经血中含有

- A. 血液
- B. 宫颈黏液
- C. 脱落的阴道上皮细胞
- D. 子宫内膜碎片
- E. 以上均有

21. 阻止精子进入宫腔的避孕方法是

- A. 利用安全期

B. 使用避孕套

C. 口服短效避孕药

D. 口服长效避孕药

E. 放置宫内节育器

22. 全科医学的理论基础是

A. 通科医生的发展

B. 社区卫生服务

C. 生物-心理-社会医学模式

D. 预防医学和临床医学

E. 传统医学和现代医学基本理论

23. 鼻出血时正确的处理方法是

A. 嘱患者将流入口中的血液尽量吐出，以免咽下刺激胃黏膜

B. 不应给予镇静剂

C. 休克时取坐位或半坐位

D. 无休克时应取平卧头低位

E. 无论有无休克，均应取坐位或半卧位

24. 对准备结婚的男女双方在结婚登记前进行的健康保健服务称为

A. 围生期保健

B. 性保健指导

C. 婚前保健

D. 新婚节育指导

E. 婚前卫生咨询

25. 关于产褥期保健描述不正确的是

A. 产后出血是引起产妇死亡的主要原因，必须加强防治

- B. 为了预防感染和有利于康复, 产后休养环境要安静、舒适, 室内保持整齐、清洁、空气流通, 防止过多探视
- C. 产褥期产妇的心理障碍与分娩后体内环境发生调整, 性激素的比例重新调配及家庭关系、环境等因素都可能有关, 做好产褥早期产妇的心理适应工作非常必要, 以防止产后心理障碍
- D. 产后新生儿 40 分钟内即应开始早期吸吮, 并实行产后母婴同室, 按需喂哺, 为母乳喂养的进行打下良好的基础, 应坚持纯母乳喂养 4~6 个月
- E. 产后 42 日应对母婴进行一次全面检查, 以确定母亲身体是否恢复正常, 婴儿生长状况是否良好

26. 新生儿疾病筛查的注意事项错误的是

- A. 对 PKU、甲状腺功能低下需采血检测, 应在出生后 36 小时进行
- B. 采血部位在新生儿足跟
- C. 听力筛查应在出生 72 小时后, 通过耳声发射, 自动听力脑干反应和声阻抗等电生理技术, 在新生儿自然睡眠或安静状态下进行客观、快速和无创的检查
- D. 对筛查阳性者应进行 1~2 次的复查以确诊
- E. 患儿一旦被确诊即应开始治疗, 并应长期随访

27. 妊娠期需合理使用药物, 妊娠期的用药依据不正确的是

- A. 使用对代谢有清楚说明的药物
- B. 药物实验证明对灵长类动物胚胎无影响的药物
- C. 妊娠前 3 个月应尽量避免服用药物, 以防止诱发畸形, 若必须用药, 应在医生的指导下, 选用无致畸作用的药物
- D. 在妊娠期中, 可用可不用的药物尽量不用, 暂时可停用的药物不能停止使用
- E. 妊娠期用药时, 要把握用药时间, 尽可能选用对胎儿安全性大的药物

28. 以下药物可引起粪便变色的铁制剂是

- A. 水杨酸钠
- B. 胶体果胶铋

C. 双香豆素

D. 山梨醇

E. 羟基保泰松

29. 下列不是必须在分娩开始前入院的产妇是

A. 妊娠合并心脏病

B. 胎儿臀位

C. 重症妊娠高血压疾病

D. 胎儿左枕前位

E. 胎儿横位

30. 以下哪些不属于大环内酯类抗生素

A. 林可霉素

B. 克拉霉素

C. 阿奇霉素

D. 罗红霉素

E. 螺旋霉素

31. 青霉素类在临床使用前最应注意的问题是

A. 用前必须做皮试，以防止发生过敏反应

B. 青霉素类可肌注

C. 青霉素可用于鞘内注射

D. 青霉素钾盐应快速静脉注射

E. 青霉素类药物在碱性溶液中易成活

32. 下列属于新生儿胆红素生成过多的原因的是

A. 血红蛋白加氧酶含量高

B. 红细胞数相对较多且破坏多

C. 红细胞寿命短



D. 新生儿经常处于饥饿、缺氧的状态

E. 肝及组织内的血红蛋白较多

33. 关于初级卫生保健的描述，不正确的有

A. 从居民的需要和利益来看，初级卫生保健是一种必不可少的、人人都能享有和充分参加的、费用为人民自己负担的卫生保健

B. 从技术方法上看，初级卫生保健是切实可行的、学术上是可靠的、为社会和社区的个体、家庭所乐于接受的卫生保健

C. 从在卫生工作中的地位和作用来看，初级卫生保健为全体居民提供最基本的卫生保健服务，是最基层的卫生保健组织，是卫生系统的核心部分，是卫生保健最基础的工作

D. 从政府部门的职责和任务来看，初级卫生保健是各级政府的重要职责，是各级政府为人民服务、关心人民健康的重要体现

E. 从社会经济发展来看，初级卫生保健是社会经济发展的重要组成部分，是社会主义精神文明建设的重要内容，是城乡社会保障体系的重要组成部分

34. 对接种卡介苗的描述，不正确的有

A. 患有自身免疫性疾病的患儿禁忌接种卡介苗

B. 患急性传染病禁忌接种卡介苗

C. 使用糖皮质激素者禁忌接种卡介苗

D. 接种卡介苗后就不会感染肺结核

E. 接种卡介苗后 2 周，局部出现红肿、破溃，8~12 周自行结痂

35. 接种下列哪种制剂可获得主动免疫，除外

A. 死疫苗

B. 抗毒素

C. 类毒素

D. 活疫苗

E. 灭活疫苗

36. 循证医学的证据中质量最高的是

- A. 专家意见
- B. 多个质量可靠的大样本随机对照试验所做的系统评价或 Meta 分析
- C. 单个样本量足够的随机对照试验结果
- D. 设有对照组但未用随机方法分组的研究
- E. 无对照的系列病例观察

37. 传染过程的表现最常见的一种是

- A. 显性感染
- B. 隐性感染
- C. 病原体被清除
- D. 病原携带状态
- E. 潜伏性感染

38. 关于计划免疫叙述不正确的是

- A. 计划免疫是根据传染病的疫情监测和人群免疫水平的调查结果分析制定的
- B. 计划免疫的实施是按照科学的免疫程序，合理地、有计划地进行预防接种
- C. 计划免疫的目的是提高个体免疫水平
- D. 计划免疫可以达到控制相应传染病的目的
- E. 计划免疫可以达到消灭相应传染病的目的

39. 脊髓灰质炎疫苗和百白破混合制剂同时接种适合哪个月龄

- A. 4 个月
- B. 5 个月
- C. 6 个月
- D. 7 个月
- E. 8 个月

40. 关于小儿囟门，以下叙述不正确的有

- A. 前囟出生时约 1~2cm
- B. 额骨与顶骨之间的间隙称前囟
- C. 当小儿患脑炎、脑膜炎致颅压升高时前囟会变得饱满
- D. 前囟一般到 2 岁以后才闭合
- E. 婴儿因腹泻致脱水时会出现前囟凹陷

41. 下列疫苗不属于减毒活疫苗的有

- A. 乙肝疫苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 卡介苗
- D. 麻疹疫苗
- E. 乙脑疫苗

42. 不属于戒烟门诊“5A”原则的是

- A. 协助 (assist)
- B. 吸烟 (Ask)
- C. 安排 (arrange)
- D. 自制 (abnegate)
- E. 劝告 (advise)

43. 人性化照顾不包括

- A. 从生前到死后对患者进行医学照顾和关怀
- B. 重视人胜于疾病
- C. 照顾目标不仅是有病的器官，更重要的是维护人的整体健康
- D. 调动患者的主动性，使之主动参与和配合医学照顾全过程
- E. 提高生活质量

44. 老年抑郁症与老年性痴呆的主要鉴别点是

- A. 痴呆
- B. 自杀倾向
- C. 失眠
- D. 躯体无名疼痛和不适
- E. 口干、出汗等自主神经功能紊乱

45. 下列不是抢救青霉素过敏性休克的措施是

- A. 平卧、保持呼吸道通畅
- B. 立即转上一级条件较好的医院再抢救
- C. 立即停药，皮下注射 0.1% 盐酸肾上腺素
- D. 立即吸氧
- E. 氢化可的松静脉输液

46. 影响社区人群健康的环境因素不包括

- A. 公共政策
- B. 风俗习惯
- C. 文化程度
- D. 物质环境
- E. 居住生活方式

47. 关于标准差与标准误的关系，以下叙述不正确的是

- A. 标准差反映抽样误差大小
- B. 标准误反映抽样误差大小
- C. 当样本数量一定时，标准差越大，标准误也越大
- D. 总体标准差一定时，增大样本例数会减小标准误
- E. 标准差的大小属于个体差异或自然变异，不能通过统计方法来控制

48. 我国全科医学教育体系包括

- A. 医学本科生的教育

- B. 全科医学住院医师培训毕业后规范化培训
- C. 全科医学继续教育和全科医学研究生教育
- D. 全科医学岗位和转岗培训
- E. 以上都是

49. 全科医生提供预防服务的途径不包括

- A. 参与公共卫生服务
- B. 提供高超的临床医学服务
- C. 开展健康教育及健康促进
- D. 提高群众自我保健技能
- E. 以上都不包括

50. 有关家系图的描述，正确的是

- A. 对家庭结构、遗传史及重要事件的描述
- B. 对家庭功能进行描述
- C. 对家庭生活周期进行描述
- D. 对家庭资源进行描述
- E. 由三代人组成，长辈在左，子孙在右

51. 全科医学的学科特点是

- A. 是将各个学科知识和技术叠加或集合，知识范围较广
- B. 服务范围宽泛，满足所有患者的需求
- C. 定位于基层卫生保健领域
- D. 统一各地域的健康问题
- E. 统一各地域的服务需求

52. 全科医生应具备的能力是

- A. 能够掌握就诊患者 90%以上的常见健康问题或疾病
- B. 提供以疾病为中心、针对健康促进和健康维护服务

- C. 在团队管理和卫生资源协调过程中，具有良好的协调和沟通能力
- D. 注重提供临床预防服务
- E. 满足患者各种要求

53. “以患者为中心”的诊疗模式原则不包括

- A. 建立以全科医生为核心的工作团队
- B. 发挥团队效应
- C. 重视疾病的同时，更重视患者的患病感受和价值观
- D. 满足患者提出的各种要求
- E. 给予患者情感支持，减少痛苦

54. “以患者为中心”的医学模式为基本点的描述是

- A. 帮助患者建立正确的健康信念模型
- B. 进入患者的世界
- C. 提高患者的遵医行为
- D. 以医生的眼光去看待疾病
- E. 提高患者的自我服务能力

55. 促使全科医学产生的背景不包括

- A. 人口的迅速增长与老龄化
- B. 人群疾病谱与死因谱的变化
- C. 医疗费用的高涨
- D. 健康观的变化
- E. 环境污染的加剧

## 二、A2

56. 小王因产后情绪波动，奶量不足，为了弥补母乳不足，在喂养时，更接近母乳，作为补充品的第一选择是

- A. 婴儿配方奶

- B. 牛奶
- C. 羊奶
- D. 全脂奶粉
- E. 脱脂奶粉

57. 学龄儿童复种卡介苗前应检查体内有无结核杆菌感染，所做的特异试验是

- A. OT 试验
- B. 卡介苗试验
- C. 链霉素皮试
- D. 利福平治疗试验
- E. 以上都不是

58. 小钱在了解一些医学知识后想要接种某疫苗被告知需自费，由公民自费并且自愿受种的其他疫苗是

- A. 第一类疫苗
- B. 第二类疫苗
- C. 第三类疫苗
- D. 第四类疫苗
- E. 第五类疫苗

59. 患儿，足月儿。在喂养时发现易发生溢乳，是由于

- A. 胃自主神经功能调节强
- B. 贲门括约肌紧张
- C. 胃成水平位
- D. 胃容量较小
- E. 幽门括约肌松弛

60. 生后 6 天女孩，早产 2 周，双侧大腿外侧皮肤发硬、肿胀，压久轻度凹陷，经医生检查诊断为新生儿硬肿症，此时患儿体温是

- A. 正常
- B. 升高
- C. 降低
- D. 严重时可升到 38℃ 以上
- E. 严重时可升到 40℃ 以上

61. 1 周岁婴儿，体重 6kg，身长 70cm，精神萎靡，皮肤弹性差，腹部皮下脂肪 0.3cm，肌肉松弛。该患儿是

- A. 佝偻病
- B. 中度脱水
- C. 轻度营养不良
- D. 中度营养不良
- E. 重度营养不良

62. 患儿男，10 岁。智力发育正常，平时兴奋多动，思想不集中，冲动，任性，学习成绩时好时坏，诊断为儿童注意力缺陷多动综合征。其主要临床特点不包括

- A. 冲动、任性
- B. 学习困难
- C. 活动过多
- D. 注意力不集中
- E. 喜欢独处

63. 患儿 2 岁，营养不良入院。清晨起床后突然大汗、面色灰白，体温下降，神志不清。对其进行的抢救处理是

- A. 快速推注 10% 葡萄糖水
- B. 快速推注生理盐水
- C. 缓慢推注 10% 葡萄糖水
- D. 缓慢推注 10% 葡萄糖酸钙



E. 立即给予糖水口服

64. 小周，28岁。在怀孕后为了解孕期相关政策，在建立孕期保健册后，孕妇到指定的医疗机构进行产前检查的次数和时间分别是

- A. 孕 12~16、17~20、21~28、29~36、37~40 周至少各 1 次
- B. 孕 12~16、17~20、21~28、29~36、37~40 周至少各 2 次
- C. 孕 16~20、21~24、28~36、37~40 周至少各 3 次
- D. 孕 16~20、21~24、28~36、37~40 周至少各 2 次
- E. 孕 16~20、21~24、28~36、37~40 周至少各 1 次

65. 小周，26岁。在怀孕后了解到需建议孕产妇保健册，按孕产妇保健管理要求，怀孕妇女要求建立孕产妇保健册的时间是

- A. 孕 6 周前
- B. 孕 8 周前
- C. 孕 10 周前
- D. 孕 13 周前
- E. 孕 14 周前

66. 小郑，25岁。怀孕后体重增长较快，孕妇整个妊娠期的体重增加平均为

- A. 6.5kg
- B. 8.5kg
- C. 10.5kg
- D. 12.5kg
- E. 14.5kg

67. 小任，28岁。因妊娠期高血压发生子痫，使用硫酸镁解痉时，应停用药物的情况是

- A. 血压 130/90mmHg
- B. 自觉症状减轻

- C. 呼吸 18 次/min
- D. 尿量 700ml/d
- E. 膝反射消失

68. 陈女士早晨来社区卫生服务站诉说，起床后发现昨晚 12 时睡觉前，漏服短效避孕药，现又忘了补服时间。医生应告知其补服的时间为

- A. 10 小时内
- B. 12 小时内
- C. 16 小时内
- D. 20 小时内
- E. 24 小时内

69. 30 岁妇女，外阴部被踢伤半小时后，外阴部出现肿块，疼痛难忍，不敢行走。最可能发生的是

- A. 前庭大腺血肿
- B. 阴蒂血肿
- C. 阴阜血肿
- D. 大阴唇血肿
- E. 小阴唇血肿

70. 患者，29 岁，已婚 3 年，长期服用避孕药避孕，现计划怀孕，建议孕前应  
停药避孕药

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 5 个月
- E. 6 个月

71. 《国家基本公共卫生服务规范——老年人健康管理规范》中服务内容要求每年需要查的辅助检查不包括

- A. 便常规
- B. 尿常规
- C. 血常规
- D. 空腹血糖
- E. 血脂

72. 为了对辖区内老年人施行健康管理，其中对身体健康的老年人的健康管理服务频次为

- A. 每年 1 次
- B. 每月 1 次
- C. 每季度 1 次
- D. 每半年 1 次
- E. 每月 2 次

73. 患者女，68 岁，肥胖，血清甘油三酯、胆固醇长期升高，降脂药效果不明显，一次在赶乘公共汽车时，突然感觉胸下部闷紧，窒息感，停步后 2~3 分钟后才缓解。此时应首先考虑

- A. 心绞痛
- B. 心肌梗死
- C. 脑供血不足
- D. 运动量太大之故
- E. 老年性痴呆

74. 患者男，65 岁，体格检查时发现早期白内障，追问病史有皮肤经常发生化脓性毛囊炎，肢端刺麻，空腹血糖 2 次分别为 7.9mmol/L，8.0mmol/L。该患者可诊断为

- A. 单纯白内障

- B. 皮肤不清洁
- C. 颈腰椎肥大
- D. 糖尿病
- E. 肢端肥大症

75. 患者男，65岁，胃溃疡病史20年，常于餐后出现中上腹疼痛，服氢氧化铝可缓解，近1年来疼痛不似从前有规律，且服氢氧化铝也难缓解，伴消瘦，来诊，查：大便隐血阳性。最可能的诊断是

- A. 胃溃疡伴溃疡出血
- B. 胃十二指肠溃疡出血
- C. 胃癌出血
- D. 慢性胃炎出血
- E. 食管出血

76. 患者男，72岁，晨起发现左侧肢体不能活动，急来医院诊断为脑血栓形成。下列处理错误的是

- A. 降颅压，治疗脑水肿
- B. 抗凝治疗
- C. 保持呼吸道通畅
- D. 自由基清除剂
- E. 静脉滴注止血药物

77. 患者男，58岁，突感剧烈头痛、恶心、呕吐、眩晕，下肢疼痛，查脑膜刺激征阳性，脑脊液检查呈血性，压力增高。最可能的诊断是

- A. 脑血栓形成
- B. 脑栓塞
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑供血不足
- E. 高血压脑病

78. 在对老年进行管理过程中，存在危险因素的和未被上级医院诊断的可疑慢性疾病的老人，为了解目前情况、症状变化，危险因素干预情况等，电话随访的频率应为

- A. 每年 1 次
- B. 每月 1 次
- C. 每季度 1 次
- D. 每半年 1 次
- E. 每月 2 次

79. 李大爷因便秘向护士小王求助咨询，小王随即建议其服用果导片。小王的这种做法违背的用药原则是

- A. 先明确诊断，后用药
- B. 先非药物疗法，后药物疗法
- C. 先老药，后新药
- D. 先外用，后内服药
- E. 用药方案简单明了

80. 李老太太，65 岁，丧偶，儿女均在国外，现独居于家，近日因跌倒致股骨颈骨折卧床，感到孤独，特别思念儿女、有自怜和无助的表述，不正确的护理方法是

- A. 主动关心老人，满足其需要
- B. 鼓励老人利用现代通信工具与子女沟通
- C. 左邻右舍亲朋好友多探视
- D. 志愿者提供及时的、个性化的服务
- E. 送老人至清静处疗养

81. 患者视力模糊、头痛、颅内压升高并出现癫痫症状，经询问得知曾食用过米猪肉，现初步确诊为脑囊虫病。首选药物是

- A. 甲硝唑
- B. 喹诺酮类
- C. 左旋咪唑
- D. 阿苯达唑
- E. 驱虫灵

82. 女性患者自述外阴瘙痒、白带增多；怀疑有滴虫病，取阴道分泌物镜检可见滴虫活动。一般治疗用药是

- A. 甲硝唑
- B. 二氯尼特
- C. 青霉素
- D. 依米丁
- E. 氯喹

83. 患者女，40岁，上呼吸道感染服用磺胺嘧啶时加服碳酸氢钠的目的是

- A. 增强抗菌疗效
- B. 加快药物吸收速度
- C. 防止超敏反应
- D. 防止药物排泄过快
- E. 使尿偏碱性，增加药物溶解度

84. 患者女，20岁，曾与多人发生性关系，不久前因身体不适来就诊，发现患有淋病，因其有青霉素过敏史，则其应该用的药物是

- A. 磺胺类
- B. 第三代喹诺酮类
- C. 第一代头孢菌素
- D. 第二代头孢菌素
- E. 第三代头孢菌素

85. 疟疾患者突然出现昏迷，给予二盐酸奎宁静滴抢救，抢救过程中，患者又出现寒战、高热、血红蛋白尿，继续抢救应改用

- A. 氯喹
- B. 甲氟喹
- C. 伯氨喹
- D. 乙胺嘧啶
- E. 青蒿素

### 三、B

- A. 死亡率
- B. 发病率
- C. 患病率
- D. 病死率
- E. 罹患率

86. 急性传染病的流行强度宜用下列哪种指标

87. 哪一种指标常用来说明疾病对人的生命威胁程度

88. 对于一种危害严重的疾病，采取针对病因的措施后，评价其预防效果的指标是

89. 某人群在观察期间内新旧病例数与同期平均人口数之比

- A. 散发
- B. 暴发
- C. 流行
- D. 大流行
- E. 大暴发

90. 某病的发病率呈历年的一般水平，各病例间在发病时间和地点方面无明显联系，称为

91. 某病在某地区的发病率显著超过该病历年发病率平均水平称为

92. 在一个局部地区或集体单位中，短时间内突然有很多相同的患者出现。这些人多有相同的传染源或传播途径，称为

93. 某病发病率水平超过该地一定历史条件下的流行水平，迅速蔓延跨省、国家、洲界，称为

- A. 自愿参加，多方筹资；以收定支，保障适度
- B. 合理分配资源，社区参与，预防为主，适宜技术，综合利用，合理转诊
- C. 坚持公益性质，注重卫生服务的公平、效率和可及性；坚持政府主导，鼓励社会参与；坚持实行区域卫生规划；坚持预防为主，公共卫生和基本医疗并重，中西医并重；坚持以地方为主，因地制宜
- D. 承认享有最高可能的健康水平是一项基本人权
- E. 制定健康的公共政策，创造支持性环境，强化社区行动，发展个人技能，调整卫生服务方向

94. 我国发展社区卫生服务的基本原则是

95. 新型农村合作医疗制度的原则是

96. 实施初级卫生保健的基本原则是

97. 人人享有卫生保健的核心社会准则是

A. 感染率

B. 续发率

C. 引入率

D. 死亡率

E. 累积死亡率

98. 在某个时间内能检查的整个人群样本中，某病现有感染者人数所占的比例，称为

99. 在某些传染病最短潜伏期到最长潜伏期之间，易感接触者中发病的人数占有易感接触者总数的百分率，称为

100. 一定时间内，一定人群中，死于某病的频率，称为



## 2022 年全科主治医师《基础知识》考前模考大赛（二）答案解析

### 一、A1

1. 【正确答案】 C

【答案解析】 以家庭为单位的健康照顾指的是根据家庭生活周期的不同阶段，提供周全可预测性的服务。

2. 【正确答案】 A

【答案解析】 周期性健康检查是运用格式化的健康筛检表格，针对不同年龄、性别而进行的终身健康检查计划。它比筛检更具科学性、系统性和针对性，是各国全科、家庭医生日常诊疗中的重要工作内容。答案选 A。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】 亚健康是“介于健康与疾病之间的一种生理功能低下的状态”。一般来说，如果你没有什么明显的病症，但又长时间处于以下的一种或几种状态中，注意亚健康已向你发出警报了：失眠、乏力、无食欲、易疲劳、心悸，抵抗力差、易激怒、经常性感冒或口腔溃疡、便秘等。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】 流行病学是研究人群中疾病与健康状况分布及其影响因素，并研究防制疾病及促进健康的策略和措施的科学，指的是一定范围内的人群。

5. 【正确答案】 B

【答案解析】 A、C、D、E 均是控制混杂偏倚可采取的措施。B 是控制现患病例-新发病例偏倚可采取的措施。

6. 【正确答案】 D

【答案解析】 接诊一名急性胸痛患者，基层医师的首要任务是判断生命体征是否稳定。

7. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据白血病细胞成熟程度和白血病自然病程，将白血病分为急性和慢性两类。区别的主要依据是白血病细胞的成熟程度。

8. 【正确答案】 C

【答案解析】 必须做到：①社区的概念体现于地域和人群，即以一定的地域为基础，以该人群的卫生需求为导向，全科医疗服务的内容与形式都应适合当地人群的需求，并充分利用社区资源，为社区民众提供服务；②社区为导向的基层医疗将全科医疗中个体和群体健康照顾紧密结合、互相促进。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】 孕不足 37 周的活胎儿为早产儿，故选 D。

10. 【正确答案】 E

【答案解析】 患者知识、健康信念、处方、人际关系是影响遵医行为的因素，不包括民族种族。

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 被植物擦伤角膜应高度警惕可能发展为真菌性角膜炎。

12. 【正确答案】 E

【答案解析】 家庭的内在结构包括：①权力结构；②家庭角色；③沟通方式；④家庭的价值观。故 E 不在其中。

13. 【正确答案】 C

【答案解析】 以问题为导向医疗记录中问题描述的方法是 SOAP。

14. 【正确答案】 A

【答案解析】 焦油是香烟中危害人体健康、导致人体癌变的主要物质。降低有害成分、降低焦油在烟气中的含量已成为当前的头等大事。

15. 【正确答案】 E

【答案解析】 脂肪瘤为良性，多位于皮下、腹膜后，分叶状，界限清楚，表面光滑，多无明显症状，多发性脂肪瘤有家族史。

16. 【正确答案】 D

【答案解析】 肝性脑病患者灌肠或导泻时禁用碱性液体，如肥皂水等。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】 家庭气氛主要是指家庭感情气氛。

18. 【正确答案】 D

【答案解析】 围产期定义指的是妊娠满 28 周(胎儿体重 $\geq 1000\text{g}$  或身长 $\geq 35\text{cm}$ )至新生儿出生后 7 日之内，答案选 D。

19. 【正确答案】 C

【答案解析】 百白破的初种年龄是 3 个月。

20. 【正确答案】 E

【答案解析】 女性经血中含有血液、宫颈黏液、脱落的阴道上皮细胞、子宫内膜碎片等，因此答案选 E。

21. 【正确答案】 B

【答案解析】 使用避孕套可以阻止精子进入宫腔。

22. 【正确答案】 C

【答案解析】 全科医学基于病人的需求, 采取以人为本、以健康为中心、以家庭为单位、以社区为基础、以预防为导向的服务模式, 注重病人及其健康问题的背景和关系, 按照生物-心理-社会医学模式的要求提供全面服务。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】 鼻出血时, 尽量不要让它流入胃部, 以免刺激胃黏膜, 有休克时应平卧头低位, 以保持大脑供血, 必要时应予镇静剂, 以免心情过度紧张。

24. 【正确答案】 C

【答案解析】 婚前保健服务是对准备结婚的男女双方, 在结婚登记前所进行的婚前医学检查、婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务, 因此答案选 C。

25. 【正确答案】 D

【答案解析】 产后新生儿 30 分钟内即应开始早期吸吮, 并实行产后母婴同室, 按需喂哺, 为母乳喂养的进行打下良好的基础, 应坚持纯母乳喂养 4~6 个月。

26. 【正确答案】 A

【答案解析】 对 PKU、甲低需采血检测, 应在出生后 72 小时进行。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 可用可不用的药物尽量不用, 暂时可停用的药物应停止使用。

28. 【正确答案】 D

【答案解析】 选项均可引起粪便变色, 属于铁制剂的是山梨醇。

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 左枕前位一般无需特殊处理, 所以不是必须在分娩开始前入院。

30. 【正确答案】 A

【答案解析】 林可霉素属于林可霉素类。

31. 【正确答案】 A

【答案解析】 青霉素使用前最应注意做皮试。

32. 【正确答案】 C

【答案解析】 新生儿胆红素生产相对较多：新生儿红细胞数量较多，红细胞寿命较短（仅为成人的 2/3），1g 血红蛋白分解可产生 35mg 胆红素，新生儿每天产生的胆红素（8.5mg/kg）为成人（3.8mg/kg）的 2 倍多。

33. 【正确答案】 A

【答案解析】 从居民角度来看：初级卫生保健是一种必不可少的、人人都能享有和充分参加的、费用为国家和人民负担得起的卫生保健。

34. 【正确答案】 D

【答案解析】 接种卡介苗可降低结核病感染几率，并不是不会感染肺结核。

35. 【正确答案】 B

【答案解析】 人工主动免疫是将疫苗或类毒素接种于人体。疫苗有多种类型，包括活疫苗（灭活疫苗）、死疫苗、类毒素。

36. 【正确答案】 B

【答案解析】 多个质量可靠的大样本随机对照试验所做的系统评价或 Meta 分析属于证据级别是最高的。

37. 【正确答案】 B

【答案解析】 传染病感染过程有 5 种表现中最常见的类型是隐性感染。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】 计划免疫的目的是提高人群免疫水平。

39. 【正确答案】 A

【答案解析】 儿童计划免疫接种程序表

接种起始月（年）龄 接种疫苗名称

刚出生 卡介苗，乙肝疫苗（第1次）

1个月 乙肝疫苗（第2次）

2个月 脊髓灰质炎灭活疫苗（第1次）

3个月 脊髓灰质炎减毒活疫苗（第2次），百白破疫苗（第1次）

4个月 脊髓灰质炎减毒活疫苗（第3次），百白破疫苗（第2次）

5个月 百白破疫苗（第3次）

6个月 乙肝疫苗（第3次）

8个月 麻疹疫苗

18个月 百白破疫苗（第4次）

4岁 脊髓灰质炎减毒活疫苗复种（复种）

6岁 白破混合制剂，乙脑、流脑

40. 【正确答案】 D

【答案解析】 前囟一般在2岁内闭合。

41. 【正确答案】 A

【答案解析】 乙肝疫苗为重组（酵母）和重组（CHO细胞）HepB。

42. 【正确答案】 D

【答案解析】 5A戒烟法步骤：询问是否吸烟（Ask）、劝告立即戒烟

（Advice）、评估是否有戒烟的意愿（Assess）、帮助戒烟（Assist）、安排随访戒烟进程（Arrange）。

43. 【正确答案】 A

【答案解析】 从生前到死后对患者进行医学照顾和关怀属于持续性照顾。

44. 【正确答案】 A

【答案解析】 老年性痴呆以痴呆为主。老年抑郁症为抑郁性假痴呆。

45. 【正确答案】 B

【答案解析】 需立即抢救。

46. 【正确答案】 E

【答案解析】 影响社区人群健康的环境因素：自然环境、物质环境、社会环境。社会环境包括公共政策、经济收入、居住条件、文化程度、风俗习惯等。居住生活方式为生活行为方式因素。

47. 【正确答案】 A

【答案解析】 标准差是描述个体观察值变异程度的大小。

48. 【正确答案】 E

【答案解析】 我国全科医学教育体系主要形式：高等医学院校全科医学知识教育，毕业后全科医学教育，全科医师岗位培训，全科医师继续医学教育，管理人员培训，其他卫生技术人员全科医学知识培训。

49. 【正确答案】 B

【答案解析】 全科医生提供预防服务途径不包括提供高超的临床医学服务。常用的方法主要有：①对就医者的健康教育与健康咨询；②筛检与周期性健康检查；③免疫预防；④化学预防；⑤临床营养指导等。

50. 【正确答案】 A



【答案解析】 家系图可用来描述家庭结构、家庭遗传问题、家庭成员相互关系、家庭重要事件等情况。

家系图一般由三代组成。长辈在上，子孙在下；同辈中，长者在左，幼者在右。

51. 【正确答案】 C

【答案解析】 全科医学不是知识和技术的叠加；全科医学不能满足所有患者的要求；也不能统一各地域的健康问题和服务需求。应根据当地特点实施卫生保健工作。

52. 【正确答案】 C

【答案解析】 全科医生应具备的能力是在团队管理和卫生资源协调过程中，具有良好的协调和沟通能力，能够对 85%~90%的常见病及健康问题，提供以人为中心的健康促进和健康维护，满足患者的合理要求。

53. 【正确答案】 D

【答案解析】 尊重患者，但不合理的要求不能满足。

54. 【正确答案】 B

【答案解析】 在全科医疗服务中，医生必须视服务对象为重要合作伙伴，熟悉其生活、工作、社会背景和个性类型。

55. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性非传染性疾病已成为全球严重威胁国民健康的最主要的问题，加之世界各国越来越受到社会老龄化、卫生费用过快增长、医学模式转变和卫生改革的巨大挑战，暴露出传统的专科服务模式对此情况的无奈、低效与高成本的弊端。

二、A2

56. 【正确答案】 A



【答案解析】 配方奶粉是以牛乳为基础的改造奶制品，使营养素成分尽量“接近”于人乳，使之适合于婴儿的消化能力和肾功能。

57. 【正确答案】 A

【答案解析】 OT 试验指结核菌素试验，又称 PPD 试验，试验阴性者才能接种。

58. 【正确答案】 B

【答案解析】 疫苗划分为两类：一类疫苗（国家计划免疫疫苗），免费注射；二类疫苗，自费自愿接种。

59. 【正确答案】 C

【答案解析】 足月儿消化道面积相对较大，有利于吸收。而胃呈水平位，贲门括约肌发育较差，幽门括约肌发育较好，易发生溢乳和呕吐。

60. 【正确答案】 C

【答案解析】 本症多发生在出生后 7~10 天内，体温不升，常在 35℃ 以下，重症低于 30℃。

61. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据体重估算公式正常 1 岁小孩体重应约 10kg，该婴儿体重低于正常体重的 40% 左右，故属于中等营养不良；且腹部皮下脂肪约 0.3cm，皮肤松弛，弹性差均为中度营养不良的表现。

62. 【正确答案】 E

【答案解析】 儿童注意力缺陷多动综合征核心症状是注意力缺陷，自我控制差，动作过多，情绪不稳，冲动任性，伴有学习困难，但智力正常或基本正常为主要临床特征。

63. 【正确答案】 A

【答案解析】 营养不良患儿早晨容易出现低血糖，有出汗、肢冷、脉弱、血压下降等休克表现，应快速推注 10%葡萄糖水。

64. 【正确答案】 E

【答案解析】 按照《国家基本公共卫生服务规范（第 3 版）》的“孕产妇健康管理服务规范”执行。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 按照《国家基本公共卫生服务规范（第 3 版）》的“孕产妇健康管理服务规范”执行。

66. 【正确答案】 D

【答案解析】 妊娠期间孕妇体重可较平时增加 25%，平均约增加 12.5kg。

67. 【正确答案】 E

【答案解析】 二价镁离子在体内通过对抗二价钙离子而发挥解痉作用。应用时应注意观察其副作用。由于骨骼肌的运动神经末梢传递是通过钙离子完成的，所以膝反射是观察的首要指标。

68. 【正确答案】 B

【答案解析】 短效避孕药漏服后应在 12 小时内补服。

69. 【正确答案】 D

【答案解析】 大阴唇外伤后易形成血肿。

70. 【正确答案】 E

【答案解析】 长效避孕药内含激素成分及剂量与短效避孕药有很大不同，停药后 6 个月妊娠较安全。

71. 【正确答案】 A

【答案解析】 每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。辅助检查包括：血常规、尿常规、肝功能（血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素）、肾功能（血清肌酐和血尿素氮）、空腹血糖、血脂（总胆固醇、甘油三酯及高密低密脂蛋白）和心电图和腹部 B 超（肝胆胰脾）检查。

72. 【正确答案】 A

【答案解析】 每年为老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。

73. 【正确答案】 A

【答案解析】 肥胖、血脂高为冠心病危险因素，赶公共汽车（运动后）出现胸下部闷紧（心前区不适），停步后 2~3 分钟后缓解（休息后自行缓解），考虑心绞痛。

74. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者两次空腹血糖高，考虑糖尿病，白内障、皮肤反复感染均可因糖尿病所致，肢端刺麻也为糖尿病周围神经病变。

75. 【正确答案】 C

【答案解析】 老年人，伴消瘦，隐血阳性，胃癌可能性大。结合胃溃疡病史，近 1 年疼痛不规律，用药疗效欠佳，考虑已不只是溃疡，可能有胃癌。

76. 【正确答案】 E

【答案解析】 脑血栓形成应抗凝而不是止血。

77. 【正确答案】 C

【答案解析】 患者头痛、恶心、呕吐，脑脊液血性，考虑脑出血，结合选项为蛛网膜下腔出血。

78. 【正确答案】 C

【答案解析】 一般为每季度1次。

79. 【正确答案】 B

【答案解析】 老年人由于生理衰老、病理变化，病情往往复杂多变，若药物使用不当可使病情恶化，甚至无法挽救。对有些病症可以不用药物治疗的就不要滥用药物。

80. 【正确答案】 E

【答案解析】 送清静处疗养解决不了目前老太太的孤独。

81. 【正确答案】 D

【答案解析】 阿苯达唑为抗寄生虫药物，可透过血脑屏障。

82. 【正确答案】 A

【答案解析】 滴虫性阴道炎首选甲硝唑或替硝唑。

83. 【正确答案】 E

【答案解析】 尿液中的磺胺药易形成结晶，可引起结晶尿、血尿、疼痛和尿闭等症状。服用磺胺嘧啶时，应适当增加饮水量并同服等量碳酸氢钠，以碱化尿液增加药物溶解度。

84. 【正确答案】 B

【答案解析】 此题考点为淋病的用药和青霉素过敏一般不用头孢。若为淋病奈瑟菌感染，应大剂量、单次给药，常用第三代头孢菌素、喹诺酮类及大观霉素治疗。

85. 【正确答案】 E

【答案解析】 题目中的患者处在疟疾的红细胞内期，可出现引起寒战、高热、出汗等疟疾的临床症状，但是在奎宁治疗以后出现此症状的为恶性疟。而青蒿素主要治疗对耐氯喹或多药耐药的恶性疟。而且可以透过血脑屏障，对脑性疟的抢救有较好的效果。

三、B

86. 【正确答案】 B

87. 【正确答案】 D

88. 【正确答案】 B

89. 【正确答案】 C

【答案解析】 某病病死率：是因该病而死亡的人数在所有患此病的人中所占的比值。它的分母是所有患此病的人。可以反映疾病对人的威胁程度。

某病死亡率：是因该病而死亡的人数在所有人群中所占的比值。它的分母是整个人群，包括患此病的人和不患此病的人。

发病率：是指在一定期间内发生新病例的频率。通常以 10 万人口为基数，发病率高的疾病也可用万、千、百人口计算。急性传染病发病率可以显示其流行强度。也可以反映预防措施的效果。

罹患率：也称侵袭率，是指暴露于危险因素中的人群在短时间内大量发病的频率。观察期通常以周或月为单位，分子是新病例数，分母为暴露人口数。

患病率：是指某特定时间内总人口中，曾患有某病（新旧病例之和）所占的比例。患病率取决于发病率和病程两个因素。常用于表示病程长的慢性病的发生与流行情况，可为医疗设施规划、估计床位周转、卫生设施及人力需要量、医疗质量评价、医疗费投入等提供科学依据。

90. 【正确答案】 A

91. 【正确答案】 C

92. 【正确答案】 B

93. 【正确答案】 E

【答案解析】 散发 发病率呈历年的一般水平，各病例间在发病时间和地点方面无明显联系，表现为散在发生，这样的发病强度叫散发。散发适用于范围较大的地区。

暴发 是指在一个局部地区或集体单位中，短时间内突然有很多相同的患者出现，这些人多有相同的传染源或传播途径，大多数患者常出现在该病的最长潜伏期内。

流行 某病在某地区显著超过该病例年散发发病率水平，称流行。其发病率水平超过该地一定历史条件下的流行水平且跨越国界、洲界时，称大流行。

94. 【正确答案】 C

95. 【正确答案】 A

96. 【正确答案】 B

97. 【正确答案】 D

【答案解析】 我国发展社区卫生服务的基本原则是坚持为人民服务的宗旨。依据社区人群的需求，正确处理社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。坚持政府领导，部门协同，社会参与，多方筹资，公有制为主导。坚持预防为主，综合服务，健康促进。坚持以区域卫生规划为指导。引进竞争机制，合理配置和充分利用现有卫生资源；努力提高卫生服务的可及性，做到低成本、广覆盖、高效益，方便群众。坚持社区卫生服务与社区发展相结合。保证社区卫生服务可持续发展。坚持实事求是。积极稳妥，循序渐进，因地制宜，分类指导，以点带面，逐步完善。

新型农村合作医疗是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。其采取个人缴费、集体扶持和政府资助的方式筹集资金。

实施初级卫生保健的基本原则是合理布局、社区参与、预防为主、适宜技术、综合利用。



人人享有卫生保健：健康是人类最基本的权利，是生存最重要的前提。保护和促进健康，不仅是卫生事业的根本任务，也是国家和世界发展的重要社会目标。

98. 【正确答案】 A

99. 【正确答案】 B

100. 【正确答案】 D

【答案解析】 感染率是指在某个时间内能检查的整个人群样本中，某病现有感染人数所占比例，是评价人群健康状况常用指标之一。

续发率亦称二代发病率，是指一个家庭、病房、集体宿舍、托儿所、幼儿园班组中第一个病例发生后，在该病的最短潜伏期到最长潜伏期之间，易感接触者中因受其感染而发病的续发病例占有易感接触者总数的百分率。

引入率是指在一定期间带病入家（或集体）的第一例占其同等身份成员的比值。

死亡率是指用来衡量一部分种群中，一定规模的种群大小、每单位时间的死亡数目（整体或归因于指定因素），是在种群层面上研究的问题。

累计死亡率是指按年龄(岁)的死亡率进行累积的总指标。累计死亡率消除了年龄构成不同的影响，故不需要标准化便可以直接进行比较。