

妇产科主治医师

—— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

一、A1 型题

1. 子宫肌瘤是激素依赖性肿瘤，错误的说法是

A. 子宫局部雌激素过度刺激促进子宫肌瘤的发生发展

B. 雌激素和孕激素共同导致肌瘤的发生发展

C. 大剂量孕激素可抑制肌瘤生长

D. PRL 可通过局部自分泌，旁分泌途径与子宫肌瘤组织上的受体结合，促进子宫肌瘤的发生发展

E. 孕激素和孕激素受体调节子宫肌瘤细胞

2. 产褥期母体血液循环系统的变化，不正确的是

A. 血容量于产后 2~3 周恢复至未孕状态

B. 产后 3 日内血容量增加 15%~25%

C. 产褥早期血液仍处于高凝状态

D. 产褥早期，白细胞总数可达 $(15 \sim 30) \times 10^9/L$

E. 红细胞沉降率在产后 5~6 周降至正常

3. 下列关于子宫内膜异位症发病机制，被公认的是

- A. LUFS 学说
- B. 种植学说
- C. 移植学说
- D. 良性转移学说
- E. 体腔上皮化生学说

4. 下列不是葡萄胎预防性化疗条件的是

- A. 年龄大于 40 岁
- B. 部分性葡萄胎
- C. 刮宫后 8 周 hCG 不下降
- D. 刮宫后 8 周 hCG 下降后又上升
- E. 无条件随诊

5. 前置胎盘不适宜行期待疗法的是

- A. 妊娠 35 周之前
- B. 估计胎儿体重小于 2000g
- C. 阴道流血量不多



D.胎儿孕足月可存活

E.有临产先兆

6.关于妊娠合并糖尿病胰岛素用量，正确的是

A.早孕期由于呕吐酸中毒，用量应加大

B.随孕周增长，胰岛素用量逐渐减少

C.糖尿病患者用量高峰在 32 ~ 33 周

D.体重越大，用量越大

E.出现水肿者，应慎用

7.临产后发现是臀先露，处理正确的是

A.破膜后胎心减慢，给予药物治疗

B.阴道口已见胎臀拨露时应尽快结束分娩

C.宫缩时见胎便流出证明胎儿宫内窘迫，应行臀牵引

D.“堵”臀时间越长越好

E.从脐部至胎头娩出不宜超过 8 分钟

8.关于分娩动因的描述，错误的是

- A.很复杂，是多因素综合作用的结果
- B.分娩时，子宫对缩宫素敏感性增加
- C.机械性理论是分娩发动的始发原因
- D.前列腺素对分娩发动起主导作用
- E.胎儿的内分泌活动与分娩发动有关

9.下列哪项不是可以推算孕周的指标

- A.末次月经第一日
- B.早孕反应开始出现的日期
- C.开始感觉胎动的日期
- D.B 超测量胎儿双顶径值
- E.测量宫高及腹围值

10.关于子宫内膜异位症的临床特点，错误的是

- A.痛经是子宫内膜异位症的典型症状
- B.痛经多随局部病变加重而逐年加剧
- C.疼痛多位于下腹部及腰骶部
- D.疼痛在经期第一日最剧，以后逐渐减轻，月经干净消失

E.疼痛程度与病灶大小成比例

二、A2 型题

1.患者,女,48岁。腹胀1年,发现腹部增大伴下肢水肿2个月。查体:可见盆腹腔内巨大囊实性包块,边界清楚,占满整个盆腹腔。妇科检查发现包块表面光滑,和周围器官无粘连,可以稍推动,B超提示为盆腔内多房的、巨大的囊实性包块,包膜完整。该患者最可能的诊断是

A.卵巢浆液性囊腺瘤

B.卵巢黏液性囊腺瘤

C.卵黄囊瘤

D.卵巢纤维瘤

E.卵巢颗粒细胞瘤

2.患者,女,53岁。绝经3年,因下腹包块伴阴道流血2个月入院。妇科检查:宫颈光滑,宫体前倾,正常大,右附件区触及手拳大肿块,实体感,不坚硬,活动稍差,左附件区阴性。为进一步诊断,以下最有意义的检查是

A.盆腔B超

B.宫腔镜检查

C.腹腔镜检查

D.血清雌激素水平测定

E.腹部 X 线摄片

3.患者,女,28岁。有“子宫肌瘤史”。停经4个月,右下腹剧痛3小时就诊,体温38.5℃。

妇科检查:宫口未开,子宫如孕5个月大小,右侧壁突起,压痛,双附件未扪及肿块无压痛。尿妊娠试验(+),白细胞计数 $21 \times 10^9/L$ 。该患者首先应考虑的诊断是

A.先兆流产

B.妊娠合并急性阑尾炎

C.妊娠合并子宫肌瘤红色变性

D.妊娠合并子宫肉瘤样变

E.妊娠合并急性盆腔炎

4.经产妇,28岁,近2年痛经并逐渐加重,伴月经量多,曾服止痛药。子宫后倾,如妊娠

6周大,质硬。根据以上情况,该患者痛经逐渐加重的原因最可能是

A.子宫内膜结核

B.子宫内膜异位症

C.子宫腺肌病

D.子宫黏膜下肌瘤

E.子宫内膜癌

5.患者，女，28岁。已婚，G₁P₀。放置左炔诺孕酮宫内节育器7个月出现闭经2个月，检查尿hCG阴性。对于该患者，以下最恰当的处理是

A.取出IUD

B.继续随访

C.人工周期治疗

D.服用短效避孕药

E.口服醋酸甲羟孕酮(安宫黄体酮)

6.患者，女，33岁。咨询避孕方法。月经规律，经量多，有痛经。曾药物流产3次。既往体健，体检未见异常，妇科检查及超声波提示可疑子宫内膜异位症及子宫腺肌病。以下哪项为建议其选用的避孕方法

A.口服短效避孕药

B.口服长效避孕药

C.放置带铜IUD

D.放置含孕激素IUD



E.皮下埋植剂避孕

7.患者,女,26岁。停经85天。行钳刮术中,患者突然烦躁不安,咳嗽、胸闷、呼吸困难、发绀、心率加快,血压下降。此时患者最可能发生了

A.人工流产综合征

B.羊水栓塞

C.空气栓塞

D.子宫穿孔

E.子宫破裂

8.初产妇,29岁。孕39周,规律宫缩2小时,LOA,胎心138次/分,骨盆外测量未见异常,B超测胎头BPD为9.5cm,羊水指数12cm,NST反应型。对于该患者此时最恰当的处理是

A.立即行剖宫产

B.缩宫素静滴

C.产钳助产

D.给予吸氧

E.严密观察产程进展情况



9.患者，女，28岁。G₁P₀，停经55天，阴道流血5天，曾因先兆流产给予保胎治疗，现阴道流血量增加，伴腹痛，自诉有组织物自阴道排出，阴道流血不止。该患者最可能诊断为

- A.先兆流产
- B.不全流产
- C.难免流产
- D.稽留流产
- E.习惯性流产

10.患者，女，28岁。停经6周，阴道不规则流血1周。检查见阴道右侧壁上1/3段有一直径为1.3cm紫蓝色结节，子宫如孕3个月大，B超检查见宫腔内充满弥漫分布的光点和小囊样无回声区图像。X线胸片检查未发现异常。以下对于该患者最恰当的诊断是

- A.绒癌
- B.子宫积血
- C.子宫内膜异位症
- D.侵蚀性葡萄胎
- E.早孕合并子宫肌瘤



11.初产妇，40周妊娠，规律宫缩17小时，现宫口开大3cm 半小时，胎膜未破，先露头，S=0，宫缩20~30秒/5~6分，弱，规律。此产妇目前子宫收缩情况是

- A.高张性子宫收缩乏力
- B.子宫收缩过强
- C.低张性子宫收缩乏力
- D.子宫痉挛性狭窄环
- E.病理性缩复环

12.女性，54岁。绝经3年，近来8个月再现阴道少量流血。查子宫稍大、稍软。为进一步确诊。最有诊断价值的辅助检查方法应为

- A.B超检查
- B.胸部X线摄片
- C.分段刮宫活组织检查
- D.刮取宫颈管活组织检查
- E.腹腔镜检查

13.28岁女性，产后6个月，月经周期缩短，妇科检查无异常。基础体温曲线呈双相型，提示为

- A.无排卵型功血
- B.子宫内膜不规则脱落
- C.黄体功能不足
- D.早期妊娠
- E.不能确定诊断

14.女性。33岁。继发性痛经3年，检查子宫后倾屈。7.5cm×7.0cm大，质硬。本例不可能出现的临床表现为

- A.不孕
- B.性交疼痛
- C.经量过多
- D.经期延长
- E.月经稀发

扫码回复“基础测评”领取答案及解析



15.40 岁经产妇，近 2 年痛经并逐渐加重，伴经量增多及经期延长，届时需服强止痛药。妇科检查：子宫均匀增大如孕 8 周，质硬，有压痛，经期压痛明显。本例确诊后的处置应选择

- A.镇痛药物治疗
- B.性激素治疗
- C.化学药物治疗
- D.手术治疗
- E.放射治疗

16.26 岁，初产妇，39 周，因规律宫缩伴阵发性胎动频繁 5 小时入院。检查：胎动及宫缩后胎心突然变慢。肛查：胎头高浮，宫口开大 3cm，胎膜未破，估计胎儿体重 3400 ~ 3500g，孕妇左侧卧位及抬高臀部时胎心迅速恢复正常，骨盆测量正常。此时首选的处理应除外下面哪项

- A.吸氧 + 抬高臀部
- B.人工破膜观察羊水性状
- C.胎心监测
- D.B 超诊断
- E.做好剖宫产准备



17.26岁初产妇,妊娠40周,规律宫缩8小时入院。查:髂棘间径25cm,骶耻外径20cm,坐骨结节间径7.5cm。枕右前位,胎心134次/分。肛查宫口开大4cm,3小时后产妇呼叫腹痛难忍,检查宫缩1~2分钟1次,持续45秒,胎心102次/分,子宫下段压痛明显。

肛查宫口开大5cm。产程受阻的原因主要为

- A.骨盆入口狭窄
- B.扁平骨盆
- C.中骨盆狭窄
- D.骨盆出口狭窄
- E.漏斗骨盆

18.初产妇,外阴发育较差,自娩一活婴。产后2小时即感伤口疼痛难忍,里急后重,大便1次,黄稀状,镜检WBC 0~1个/HP,少许黏液。查体:血压90/60mmHg,阴道出血不多,贫血貌。对此病人应采取什么措施

- A.缝合宫颈
- B.应用抗生素
- C.行子宫切除
- D.给予缩宫素



E.清除阴道壁血肿后修补缝合

19.初孕妇，因第二产程延长，行左侧会阴切开+低位产钳助产，娩出4000g一活婴，产后

2小时伤口疼痛，肛门坠胀并有便意，大便常规检验正常，体检：贫血貌，血压90/60mmHg，

左会阴稍肿，阴道出血不多。首先应行下列哪项处理

A.宫缩剂

B.阴道镜检查

C.肛指检查

D.抗感染

E.止血剂

20.孕妇24岁，G₁P₀，孕39周，入院前1天阴道大量流水，24小时后行缩宫素引产，第

一产程5小时，第二产程10分钟，胎儿娩出后2分钟，患者突然寒战，呛咳，发绀及血压

下降至80/60mmHg，阴道流血不止，立即交叉配血，进行抢救。本例产后出血的主要原因

因是

A.胎膜早破，宫内感染

B.第二产程过短

C.未给予药物预防产后出血



D.宫缩乏力

E.凝血功能障碍

三、A3/A4 型题

1.患者，女性，58岁。绝经8年。近半年内阴道少量出血2次，现阴道淋漓出血半个月余，G₂P₁。查体：心率72次/分，血压135/85mmHg，身高160cm，体重60kg。腹软，无压痛，未触及肿物。妇科检查：老年外阴，阴道通畅，内有少量暗红色血，宫颈光滑，质韧，子宫水平位，增大如妊娠40天大，质中，活动，无压痛。双附件区(-)。

1) 下列哪项可以考虑是该患者的诊断

A.慢性宫颈炎

B.子宫内膜癌

C.无排卵性功能失调性子宫出血

D.输卵管癌

E.卵巢恶性肿瘤

2) 若该患者进行分段诊刮，病理回报：子宫颈管及宫腔刮出物，浆液性乳头状腺癌。该

病理类型的临床特点是

A.雌激素依赖性

B.恶性度低

C.恶性度高

D.病程时间长

E.常局限于宫腔

3) 该患者有可能转移的部位有

A.双侧卵巢、输卵管转移

B.早期可有血行转移

C.腹股沟淋巴结转移

D.横膈表面腹膜种植

E.大网膜种植

4) 患者病理检查结果为子宫内膜浆液性乳头状腺癌，侵及肌层约 1/2，累及宫颈黏膜，宫颈间质未侵及，卵巢、输卵管未见癌侵及，左髂外淋巴结可见癌转移。该患者分期应为

A. I a 期

B. I b 期

C.Ⅱa 期

D.Ⅱb 期

E.Ⅲc 期

5) 该患者应采取的治疗方案为

A.全子宫加双附件切除术

B.广泛全子宫加双附件切除术

C.筋膜外全子宫加双附件切除+盆腔淋巴结切除术

D.广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除术

E.广泛性子宫切除+双附件切除+盆腔淋巴结切除+腹主动脉旁淋巴结切除+大网膜+阑尾切除术

6) 该患者术后应结合的治疗是

A.化学治疗

B.放射治疗

C.己酸孕酮 500mg, 肌内注射, 每周 1 次, 共 6 个月

D.口服他莫西芬, 每天 20mg,共 6 个月

E.亮丙瑞林 3.75mg,皮下注射, 每月 1 次, 连用 6 个月

2.女, 18 岁, 接触性出血 1 月余, 白带有恶臭, 妇科检查: 宫颈Ⅱ度糜烂, 前唇有 5cm 的质地脆赘生物, 易出血。子宫正常大, 三合诊 (-)。

1) 最可能的诊断是

A.子宫颈息肉

B.子宫颈结核

C.子宫颈癌

D.子宫内膜异位症

E.宫颈绒癌

2) 为确定诊断。最可靠的诊断方法为

A.宫颈刮片细胞学检查

B.碘试验

C.阴道镜检查

D.氮激光肿瘤固有荧光诊断法

E.宫颈活检



3) 确诊后, 其临床期别为

A. I A 期

B. I B1 期

C. I B3 期

D. II A 期

E. II B 期

4) 最恰当的治疗方法为

A. 宫颈锥切术

B. 放射治疗

C. 全子宫切除术

D. 次广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术

E. 广泛性子宫切除术加盆腔淋巴结切除术

四、B 型题

1.A. 胎儿窘迫

B.HELLP 综合征

C.DIC

D.视网膜剥离

E.死胎

- 1) 妊娠高血压疾病患者出现头晕、头痛伴视力障碍时，考虑为
- 2) 妊娠高血压疾病伴有肝酶升高，血小板下降，溶血时，考虑为
- 3) 妊娠高血压疾病并胎盘早剥时最严重的合并症为

2.A.30 分钟

B.2 小时

C.3~4 小时

D.6~8 小时

E.20 小时

- 1) 多数的产后出血主要发生在产后的时间是
- 2) 初产妇，第二产程不应超过
- 3) 经产妇，未实施硬膜外麻醉，第二产程不应超过
- 4) 初产妇第一产程潜伏期需要



3.A.胎盘残留

B.胎盘粘连

C.胎盘剥离不全

D.胎盘嵌顿

E.胎盘植入

- 1) 第三产程中，子宫不协调性收缩可造成
- 2) 胎盘未剥离时过早挤揉子宫可造成
- 3) 胎盘与宫壁界限不清

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

