

内科主治医师 —— 基础测评 50 题

医学教育网 著



扫码回复“基础测评”领取答案及解析

《基础测评 50 题》

一、A1 型题

1.患者能被叫醒，醒后能正确回答问题及勉强配合检查，停止呼唤后又入睡，此种意识障碍

程度属于

A.晕厥

B.嗜睡

C.浅昏迷

D.深昏迷

E.昏睡

2.最多见的 Murphy 征阳性体征的疾病是

A.急性胆囊炎

B.急性阑尾炎

C.急性胃溃疡

D.食物中毒

E.急性胃肠炎



3.腹部压痛部位不固定常见于

- A.小肠克罗恩病
- B.阑尾炎
- C.结肠性腹膜炎
- D.肠易激综合征
- E.绞窄性肠梗阻

4.下列检查方法与坐位屈颈试验临床意义相同的是

- A.直腿抬高试验
- B.腰骶关节试验
- C.髋外展外旋试验
- D.跟臀试验
- E.瑞-舒测试法

5.中枢性与周围性瘫痪的鉴别点正确的是

- A.中枢性瘫痪深反射减弱或消失
- B.中枢性瘫痪为硬瘫
- C.周围性瘫痪病理反射阳性

D.周围性瘫痪可有 1 个以上肢体动作瘫痪

E.Bell 麻痹为中枢性瘫痪

6.心脏压力负荷是指

A.心脏收缩时所承受的阻抗负荷

B.静脉压是心室肌的后负荷

C.心脏收缩、舒张时的心腔容量

D.心脏舒张时所承受的容量负荷

E.心脏收缩时所承受的容量负荷

7.引起右心室后负荷增加的疾病是

A.室间隔缺损

B.阻塞性肺气肿

C.二尖瓣关闭不全

D.房间隔缺损

E.肺动脉瓣关闭不全

8.亚急性感染性心内膜炎，主要致病菌是



A.D 族链球菌

B.草绿色链球菌

C.金黄色葡萄球菌

D.革兰阴性菌

E.真菌

9.《医疗机构从业人员行为规范》适用于哪些人员

A.医疗机构的医生、护士、药剂、医技人员

B.医疗机构的医护及后勤人员

C.医疗机构的管理、医护、药学、后勤等人员

D.医疗机构内药学技术人员、管理人员、医师、护士

E.医疗机构的管理人员、医师、护士、药学技术人员、医技人员、其他人员


10.临床诊断和治疗中的医学道德原则不包括

A.整体性原则

B.最优化原则

C.知情同意原则

D.协同一致原则



E.效果为首原则

二、A2 型题

1.女性,58岁。血压 180/112mmHg,服降压药后血压控制在 130~140/80~90mmHg,

心电图示左室肥厚,眼底视网膜动脉变窄,尿蛋白微量。该病最可能的诊断是

A.高血压病 2 级, 高危组

B.高血压病 3 级, 极高危组

C.高血压病 3 级, 中危组

D.肾动脉狭窄

E.慢性肾小球肾炎

2.男性,40岁,头晕、头痛5个月,水肿、少尿1个月余,血压190/135mmHg,全身水

肿,尿蛋白(++++) ,尿红细胞(+++) ,尿素氮20mmol/L,诊断为

A.急进型高血压

B.原发性高血压Ⅲ期

C.原发性高血压Ⅱ期

D.高血压脑病

E.高血压危象



3.某先心病患者，头痛，头晕，面部潮红，鼻出血，同时伴有下肢无力，麻木，发凉等情况，肱动脉血压高于腘动脉血压 20mmHg。该病例属于

- A.二叶主动脉瓣型先心病
- B.主动脉窦动脉瘤
- C.三尖瓣下移畸形
- D.主动脉缩窄型先心病
- E.肺动脉狭窄型先心病

4.男性，60岁。乙肝病史20年，此次因发热，腹胀，少尿来院就诊。查体：巩膜黄染，肝掌，腹膨隆，肝肋下未触及，脾肋下3cm，B超示腹腔大量积液。该患者适当的治疗措施是

- A.高盐饮食
- B.高蛋白饮食
- C.常下地活动
- D.反复多次抽腹水
- E.静注白蛋白



5.男性，45岁。5小时前突然出现上腹剧痛，1小时后逐渐蔓延至全腹，伴恶心及呕吐，腹胀，发热。查体：肝浊音界消失，全腹压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音阳性，肠鸣音消失。血淀粉酶 5200U/L。目前最可能的诊断是

- A.消化性溃疡穿孔
- B.急性重症胰腺炎
- C.急性阑尾炎穿孔
- D.麻痹性肠梗阻
- E.急性化脓性胆管炎

6.男性，62岁。近半年来反复出现腹泻，日约3~4次，便呈糊状，无脓血，偶有腹泻与便秘相交替。查体：腹软，右下腹轻压痛。辅助检查：钡灌肠示回盲部钡剂充盈缺损。最不可能的诊断是

- A.肠结核
- B.血吸虫性肉芽肿
- C.结肠癌
- D.克罗恩病
- E.溃疡性结肠炎



7.32 岁男性，左下腹痛伴脓血便 3 年，加重 2 个月，应用抗生素治疗效果不佳。近 1 周出现高热、腹胀、排气减少。查体：消瘦，全腹膨隆，全腹压痛，无反跳痛。最可能的诊断是

- A.克罗恩病并中毒性巨结肠
- B.溃疡性结肠炎并中毒性巨结肠
- C.溃疡性结肠炎并肠梗阻
- D.克罗恩病并肠梗阻
- E.克罗恩病并腹腔脓肿

8.下列关于消化道出血的临床表现，不正确的是

- A.上消化道出血后白细胞计数可以增高
- B.以低热为主，一般不超过 38.5℃，可持续 3~5 天
- C.血尿素氮升高，24~48 小时可达高峰，3~4 天后降至正常
- D.出血后 24 小时内网织红细胞即见升高，所以血象检查可以作为早期诊断和病情观察的依据
- E.上消化道出血常见临床表现为呕血和黑粪

9.女性，27 岁。因尿急、尿痛 3 天入院，尿常规白细胞 15~20/HP，红细胞 2~3/HP，双肾 B 超正常，清洁中段尿培养 (+)。其治疗下述描述正确的是

- A.应选用单种有效抗菌药物连续治疗 2 周
- B.应选用两种有效抗菌药物连续治疗 2~4 周
- C.应选用低剂量抗菌药物抑菌疗法
- D.应选用单种有效抗菌药物常规剂量 3 日疗法
- E.应选用常规剂量有效抗菌药物一次顿服

10.男性, 35 岁。既往慢性肾小球肾炎 3 年, 间断水肿、血尿 1 个月, 发热、腹泻 1 周, 应用庆大霉素 5 天逐渐出现尿少。查体: BP 165/100mmHg, 双下肢中度水肿。化验尿蛋白 2+, 红细胞 255/HP, 血肌酐 840mmol/L, 血红蛋白 90g/L。关于肾功能恶化的可能原因除了

- A.应用氨基糖苷类肾毒性药物
- B.感染
- C.腹泻致有效血容量不足
- D.慢性肾小球肾炎复发或加重
- E.血尿

11.女性, 26 岁, 面部皮疹伴浮肿, 间有四肢抽搐, 查抗 ds-DNA 抗体 4.32 (+), C3 0.20, 应选择的治疗方案为

- A.CTX 冲击治疗+MTX 冲击治疗
- B.泼尼松 10mg/d+MTX
- C.羟氯喹+NSAID 类药物
- D.泼尼松 0.5mg/ (kg·d) +羟氯喹+NSAID 类药物
- E.CTX 冲击治疗+泼尼松 1mg/ (kg·d)

12.男性, 41 岁。查体: T 35°C。该患者不可能是

- A.休克
- B.脑出血
- C.严重营养不良
- D.甲状腺功能低下
- E.过久暴露在低温环境

13.患者为男性, 32 岁, 突发头痛 2 小时, 伴恶心、呕吐。体检: 运动性失语, 右侧肢体偏

瘫, 右瞳孔 3mm, 左瞳孔 4mm, 对光反应迟钝。下述处理哪项不正确

- A.立即脑 CT 检查
- B.密切观察神志、瞳孔、血压、呼吸、脉搏体温变化
- C.保持患者呼吸道通畅, 防止窒息

D.予以氧气吸入

E.腰穿，脑脊液常规检查

14.肺心病患者进入昏迷，一侧瞳孔缩小，对光反射迟钝，除积极处理呼吸衰竭外，急救先

采用

A.加大抗生素用量

B.双氢克尿噻

C.安体舒通（螺内酯）

D.20%甘露醇静脉快速滴注

E.5%碳酸氢钠静脉滴注

15.女性，63岁。帕金森病患者，行走时小步急速趋行，身体前倾，有难以止步之势。该患

者的步态称为

A.蹒跚步态

B.慌张步态

C.共济失调步态

D.剪刀步态

E.醉酒步态



16.患者，男性，22岁，四肢无力5天，大小便正常，无发热。查体：四肢肌力Ⅲ级，四肢远端痛觉减退，腱反射消失，无病理反射，腰穿结果正常。这种疾病在起病前常有

- A.食物中毒史
- B.劳累和饮酒史
- C.腹泻和上呼吸道感染史
- D.手术史
- E.药物过敏史

扫码回复“基础测评”领取答案及解析



17.男性，77岁。突发惊厥，二便失禁。查体见瞳孔扩大，对光反射消失。该患者可能是

- A.脑出血
- B.脑膜炎
- C.脑炎
- D.高血压病



E.癫痫大发作

18.男性，30岁。2小时前出现剧烈头痛。来诊时查体：意识丧失，强烈刺激可叫醒，醒后可正确回答问题，无自主运动，角膜反射，瞳孔对光反射存在。该患者现在的意识状态是

A.嗜睡

B.意识模糊

C.轻度昏迷

D.昏睡

E.中度昏迷

19.男性，25岁，乏力、尿黄1周，病初3天曾发热38.5℃左右，体检巩膜轻度黄染，肝肋下可及，ALT 780IU/L，TBIL 62μmol/L，最可能的诊断为


A.黄疸出血型钩体病

B.肺弥漫性出血型钩体病

C.急性黄疸型肝炎

D.大叶性肺炎（中毒型）

E.肾损害型钩体病



20.患儿，5岁。夏季，因高热1天，反复惊厥4次急诊就诊。体检：浅昏迷，四肢厥冷，发绀，BP 70/40mmHg，瞳孔不等大，呼吸节律不齐。为明确诊断，急诊应进行的检查是

- A.立即腰穿行脑脊液检查
- B.立即查厚滴血涂片
- C.灌肠或肛门拭子取便检查
- D.头颅MRI
- E.血培养+药敏

三、A3/A4型题

1.患者，女性，80岁。因胸痛胸闷、上腹部不适、恶心2小时急诊。体检：P 50次/分，血压75/55mmHg，颈静脉怒张，双肺可闻及少量湿啰音。肌钙蛋白T (TnT)阳性。心电图：

I、II、aVF导联ST段弓背向上抬高并和T波连成单向曲线。

1) 该患者最可能的诊断为

- A.急性下壁心肌梗死
- B.急性后壁心肌梗死
- C.急性侧壁心肌梗死
- D.急性右心室梗死
- E.急性前壁心肌梗死



2) 最佳的处理是

A.硝酸甘油舌下含化

B.静脉溶栓治疗

C.抗凝治疗

D.吗啡

E.急诊冠状动脉介入

3) 冠状动脉造影, 闭塞的血管最可能是

A.左前降支

B.右前降支

C.右冠状动脉

D.左回旋支

E.左冠状动脉

4) 如果发病后 10 小时, 心电图出现完全性房室传导阻滞, P 40 次/分。最好的处理方法是

A.异丙肾上腺素静脉滴注

B.安装临时心脏起搏器

C.置入永久心脏起搏器

D.静脉溶栓

E.阿托品 0.5mg 静脉注射

2.患者，男性，50岁。突发呕血600ml，黑粪4次，意识模糊1小时来诊。既往肝功能异常史30余年，高血压病史8年，长期服用阿司匹林。查体：贫血貌，BP 75/55mmHg，P 118次/分，肝肋下未及，脾肋下2cm，移动性浊音(+)，血糖5.5mmol/L。

1) 引起消化道出血的原因最可能是

A.胃癌出血

B.十二指肠溃疡出血

C.食管静脉曲张破裂出血

D.急性出血性胃炎

E.胃溃疡并穿孔

2) 引起患者意识不清最可能的原因为

A.肝性脑病



B.血容量不足

C.脑梗死

D.低血糖昏迷

E.胃癌脑转移

3) 静脉用药止血应首选

A.维生素 K

B.氨甲苯酸

C.垂体后叶素

D.奥美拉唑

E.奥曲肽

3.患者，男性，40岁。反复发作性咳嗽、咳痰、气喘10年余，加重2小时入院。该患者每

次发作均与进食海产品有关。入院后查体：双肺可闻及呼气相哮鸣音。

1) 最可能的诊断是

A.肺部感染

B.支气管哮喘

C.急性支气管炎

D.支气管扩张

E.肺结核

2) 为确诊该诊断, 最需要做的检查是

A.胸部 X 线正侧位片

B.胸部高分辨 CT

C.痰培养+药敏试验

D.肺通气功能检查和支气管舒张试验

E.胸部 X 线透视

3) 为缓解患者的症状, 首选的治疗方法是

A.呼吸机辅助呼吸

B.吸氧

C.口服止咳药

D.吸入 β_2 受体激动药



E.口服化痰药

四、B型题

1.A.血液中性粒细胞显著增高

B.血液单核细胞显著增高

C.血液异型淋巴细胞显著增高

D.血液淋巴细胞持续显著升高

E.血液嗜酸性粒细胞显著增高

1) 中性粒细胞型类白血病可见

2) 传染性单核细胞增多症可见

3) 慢性淋巴细胞白血病可见

2.A.磺脲类降糖药

B.双胍类降糖药

C.α 葡萄糖苷酶抑制剂



D.噻唑烷二酮类药物

E.胰岛素

- 1) 1型糖尿病选用
- 2) 2型糖尿病合并肾衰竭选用
- 3) 2型糖尿病急性代谢紊乱选用
- 4) 2型糖尿病合并重症感染选用

3.A.肺癌

B.肺错构瘤

C.肺结核

D.肺隔离症

E.肺脓肿

- 1) 患者,男,25岁。低热伴干咳2个月,X线胸片见右肺上叶尖段有一2cm×2cm结节状影,密度不均,边缘见长毛刺,其内可见斑点状钙化。最可能的诊断是
- 2) 患者,男,64岁。刺激性干咳伴痰中带血3月。X线胸片见右肺上叶前段一3.5cm×2.5cm块状影,密度不均,有分叶,边缘可见短细毛刺。最可能的诊断是

3) 患者, 女, 40岁。健康体检时 X 线胸片发现右下肺外带约 3cm×3cm 块状影, 其内可见爆米花样钙化, 目前无任何症状。最可能的诊断是

扫码回复“基础测评”领取答案及解析

