

初级护师

基础测评 50 题答案及解析

医学教育网 著

《基础测评 50 题答案及解析》

1.【正确答案】 E

【答案解析】 1912 年国际护士会决定将 5 月 12 日（南丁格尔的生日）定为国际护士节。国际红十字会设立了南丁格尔奖章，作为各国优秀护士的最高荣誉奖，每两年颁发一次。

2.【正确答案】 A

【答案解析】 在护士姿态训练中，站姿是基础，是保持良好姿态的关键。

3.【正确答案】 A

【答案解析】 护理的服务对象既包括个人、家庭、社区和社会四个层面。

4.【正确答案】 B

【答案解析】 室温过高会使神经系统受到抑制，干扰消化和呼吸功能，影响体力恢复；室温过低则使人畏缩，缺乏动力，肌肉紧张而产生不安，又可能造成病人在诊疗时受凉。

5.【正确答案】 A

【答案解析】 阿米巴痢疾的病变多在回盲部，因此取右侧卧位以提高疗效。

6.【正确答案】 C

【答案解析】 肝昏迷病人禁用肥皂水灌肠，肝硬化氨中毒是肝昏迷特别是外源性肝昏迷发病的重要原因。肥皂中含有氨的成分，在直肠吸收，会加重肝昏迷。所以禁用肥皂水灌肠，以减少氨的产生和吸收，以免加重肝昏迷。

7.【正确答案】E

【答案解析】手术刀采用燃烧法灭菌会使手术刀变钝。

8.【正确答案】B

【答案解析】灭菌指用物理或化学方法去除或杀灭全部微生物的过程。包括致病和非致病微生物，也包括细菌芽孢和真菌孢子。

9.【正确答案】C

【答案解析】静脉痉挛时会导致滴液不畅，回抽时有回血，可局部热敷缓解痉挛。

10.【正确答案】D

【答案解析】呼吸困难、咳粉红色泡沫样血痰是输液引起肺水肿的典型症状。

11.【正确答案】D

【答案解析】由于快速输液及大量输液，可使循环血量急剧加剧，心脏负荷过量而引发肺水肿，故应严格控制输液速度和量，其余选项为肺水肿的急救措施。

12.【正确答案】A

【答案解析】使用冰槽降温时，双眼覆盖凡士林纱布，保护角膜。

13.【正确答案】D

【答案解析】局部有伤口热疗时按无菌操作要求进行。

14.【正确答案】C

【答案解析】成形的黑色便称黑便，稀薄、黏稠、漆黑、发亮的粪便，形似柏油样，称柏油

样便。见于上消化道出血等。脓血便见于痢疾、溃疡性结肠炎等。阿米巴痢疾病人粪便以血为主，血中带脓，呈暗红色果酱样。霍乱弧菌感染时可排出米泔水样便。白陶土样便见于各种原因引起的胆管阻塞。

15.【正确答案】D

【答案解析】成形的黑色便称黑便，稀薄、黏稠、漆黑、发亮的粪便，形似柏油样，称柏油样便。见于上消化道出血等。直肠癌、痔疮等均可见鲜血便。黏液便见于各类肠炎、细菌性痢疾等。霍乱弧菌感染时可排出米泔水样便。

16.【正确答案】E

【答案解析】心房颤动时可出现脉率少于心率的现象，即出现脉搏短绌。

17.【正确答案】A

【答案解析】主动脉瓣关闭不全时可致脉压增大，脉搏骤起骤落、急促而有力，即水冲脉。心房颤动时可出现脉率少于心率的现象，即脉搏短绌。病人吸气时脉搏显著减弱或消失的现象称为奇脉，见于心包积液和缩窄性心包炎的患者。交替脉为节律规则而强弱交替出现的脉搏，由左室收缩力强弱不等所致，为左室衰竭的重要体征之一，常见于高血压性心脏病、急性心肌梗死等。

18.【正确答案】E

【答案解析】慢性阻塞性肺气肿病人由于肺泡弹性回缩力减弱，呼气时间延长。病人肺部叩诊为过清音，双侧语颤减弱，双侧呼吸运动减弱，气管居中。

19.【正确答案】E

【答案解析】SLE 的病因尚不清楚，目前认为与遗传、性激素、环境因素（阳光照射）、药物（普鲁卡因胺、氯丙嗪）等有关。主要诱因有过度疲劳、精神创伤、阳光照射、感染。

20.【正确答案】D

【答案解析】类风湿关节炎关节病变的特点是：早期常为游走性，以后逐渐固定于数个对称性关节，因此呈对称性改变。

21.【正确答案】D

【答案解析】肺炎链球菌肺炎病前常有上呼吸道感染、受凉、淋雨、疲劳等情况。典型表现起病多急骤，寒战、高热，数小时内体温可高达 39~41℃，呈稽留热型。全身肌肉酸痛，患侧胸痛明显，咳嗽时加剧。干咳，少量黏痰，典型者在发病 2~3 天时咯铁锈色痰。

22.【正确答案】D

【答案解析】当心跳呼吸完全停止即进入临床死亡期，此期一般只有 4~6 分钟，在此期内迅速抢救，恢复的可能性比较大，如果时间长，组织、细胞发生不可逆变化，尤其是脑和心肌对缺氧的耐受力极差，特别是脑组织。

23.【正确答案】D

【答案解析】急性乳腺炎在脓肿形成前可患乳暂停哺乳，局部热敷或理疗利于早期炎症的消散，同时应用抗菌药物控制感染，在脓肿形成后应及时切开引流。故 D 选项是错误的，只有在形成脓肿后方可切开引流。

24.【正确答案】A

【答案解析】腹痛是急性腹膜炎病人最主要的临床症状。疼痛程度随炎症的轻重有所不同，一般为持续、剧烈性疼痛。

25.【正确答案】E

【答案解析】瘢痕性幽门梗阻时进食物不能顺利排空，病人可出现顽固性呕吐，呕吐物量大，有宿食。

26.【正确答案】C

【答案解析】肠套叠多见于 2 岁以内的儿童，常为突然发作剧烈的阵发性腹痛，伴有呕吐和果酱样血便，腹部可扪及腊肠形、稍有压痛的腹部肿块。

27.【正确答案】A

【答案解析】肝癌的临床表现最常见的有肝区疼痛，半数以上病人以此为首发症状，多为持续性隐痛、刺痛或胀痛，夜间或劳累后加重，癌肿累及横膈时有右肩背部牵涉痛。

28.【正确答案】A

【答案解析】急性阑尾炎最重要的体征是右下腹麦氏点附近固定压痛，早在脐周或上腹部疼痛时此压痛点即存在。

29.【正确答案】D

【答案解析】脱落细胞学检查又称食管拉网，用于食管癌的普查，纤维食管镜检查可明确诊断。

30.【正确答案】B

【答案解析】肺癌的病理类型有鳞癌、小细胞癌、大细胞癌、腺癌等，其中小细胞癌恶性程度高，生长快，较早出现淋巴和血行广泛转移。虽然对放射和化学疗法敏感，但在各型肺癌中预后较差。

31.【正确答案】D

【答案解析】溃疡病的病因较复杂，主要致病因素是胃酸分泌过多，由于胃酸分泌过多，激活胃蛋白酶，可使胃十二指肠发生“自身消化”，从而出现溃疡。

32.【正确答案】C

【答案解析】停经是妊娠最早、最重要的症状。

33.【正确答案】E

【答案解析】子宫颈和子宫颈管活组织检查：是确定子宫颈癌前病变和子宫颈癌的最可靠方法。

34.【正确答案】A

【答案解析】阴道流血：为侵蚀性葡萄胎最常见的症状。多发生在葡萄胎排出后，阴道不规则流血。合并有阴道转移结节，破溃时可发生反复大出血。

35.【正确答案】B

【答案解析】滴虫阴道炎的典型症状是阴道分泌物增加伴瘙痒，分泌物典型特点为稀薄泡沫状。

36.【正确答案】B

【答案解析】引起产后出血最常见的原因是子宫收缩乏力。

37.【正确答案】B

【答案解析】葡萄胎的诊断一经确定后，应立即给予清除。清除葡萄胎时应注意预防出血过多、穿孔及感染。

38.【正确答案】D

【答案解析】妊娠早期的羊水主要来自母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液。妊娠中期以后，胎儿尿液成为羊水的主要来源。

39.【正确答案】E

【答案解析】侵蚀性葡萄胎显微镜下可见葡萄胎组织的滋养细胞有不同程度的增生，并有出血和坏死，但仍可见变形的或完好的绒毛结构。绒毛膜癌显微镜下检查典型的病变为滋养细胞极度不规则增生，并伴有大量出血和坏死，绒毛结构消失。病理切片中是否存在绒毛结构是二者的主要鉴别点。

40.【正确答案】D

【答案解析】子宫从正常位置沿阴道下降或脱出，当宫颈外口达坐骨棘水平以下，甚至子宫全部脱出阴道口以外，称子宫脱垂。子宫脱垂常伴有阴道前后壁膨出。

41.【正确答案】C

【答案解析】由于新生儿中枢调节功能不全，呼吸肌发育不完善，呼吸主要依靠膈肌运动，

以腹式呼吸为主。

42.【正确答案】D

【答案解析】佝偻病发病的主要原因是缺乏维生素 D。

43.【正确答案】C

【答案解析】按不同病原选择抗生素。使用原则为，早期、联合、足量、足疗程。

44.【正确答案】B

【答案解析】地西洋(安定)为控制惊厥发作首选药物。一般 3~5 分钟起效，但维持时间短，必要时 20~30 分钟后重复给药一次。

45.【正确答案】E

【答案解析】新生儿特殊生理状态包括：生理性体重下降、生理性黄疸、新生儿假月经、生理性乳腺肿大。

46.【正确答案】D

【答案解析】生长发育通常遵循由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂的规律，因此 D 是正确的。

47.【正确答案】B

【答案解析】早产儿的肺部发育不成熟，肺泡表面活性物质少，易发生肺透明膜病。在子宫内有窘迫史的早产儿更易发生吸入性肺炎。

48.【正确答案】E

【答案解析】胎儿缺氧早期为胎动增加，胎心率加快 ≥ 160 次/分；晚期为胎动减少或消失，胎心减慢或停搏，羊水被胎粪污染呈黄绿或墨绿色。

49.【正确答案】C

【答案解析】起病初期，患儿烦躁不安，咀嚼肌先受累，张口及吸吮困难，随后牙关紧闭，面肌痉挛，口唇皱缩、口角上牵，出现苦笑面容，此表现为本病主要特征。

50.【正确答案】C

【答案解析】在接生时，如消毒不严或脐部不洁，使破伤风梭状杆菌侵入脐部，缺氧环境有利于该菌繁殖并产生破伤风痉挛毒素，导致全身肌肉强烈收缩。

