

主管护师

基础测评 50 题答案及解析

医学教育网 著

《基础测评 50 题答案及解析》

1. 【正确答案】 B

【答案解析】 门静脉高压是水分潴留在腹腔的主要原因。门静脉压力增高，使腹腔脏器毛细血管床静水压增高，组织间液回吸收减少而漏入腹腔。

2. 【正确答案】 E

【答案解析】 慢性失血是成人缺铁性贫血最多见、最重要的原因，反复多次少量出血可使体内储存铁逐渐耗竭，如消化性溃疡出血、肠息肉、肠道肿瘤、月经过多、痔出血等。

3. 【正确答案】 E

【答案解析】 蛛网膜下腔出血最常见的病因是先天性动脉瘤破裂。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】 急性透壁性心肌梗死的心电图常有特征性改变及动态演变过程。

特征性改变：急性期可见：①ST 段抬高呈弓背向上（反映心肌损伤），在面向坏死区周围心肌损伤区的导联上出现；②宽而深的 Q 波（反映心肌坏死），在面向透壁心肌坏死区的导联上出现；③T 波倒置（反映心肌缺血），在面向损伤区周围心肌缺血区的导联上出现。

5. 【正确答案】 D



【答案解析】一氧化碳经呼吸道进入血液，与红细胞内血红蛋白结合形成稳定的碳氧血红蛋白（COHb）。由于CO与血红蛋白的亲合力比氧与血红蛋白的亲合力大240倍，而碳氧血红蛋白的解离较氧合血红蛋白的解离速度慢3600倍，故易造成碳氧血红蛋白在体内的蓄积。COHb不能携氧，而且还影响氧合血红蛋白正常解离，即氧不易释放到组织，从而导致组织和细胞缺氧。此外，CO还可抑制细胞色素氧化酶，直接抑制组织细胞内呼吸，这些因素更加重了组织、细胞缺氧。

6. 【正确答案】D

【答案解析】慢性胃炎确诊有赖于纤维胃镜检查。

7. 【正确答案】A

【答案解析】儿童糖尿病绝大多数为1型，即胰岛素依赖型，病情较成人重。

8. 【正确答案】E

【答案解析】肾蒂血管部分或全部撕裂时可引起严重大出血，常来不及诊治即已死亡。

9. 【正确答案】E

【答案解析】大便潜血检查为大肠癌的初筛手段，阳性者再做进一步检查。

10. 【正确答案】A

【答案解析】腹膜刺激征（压痛、肌紧张、反跳痛）是腹膜炎的标志性体征。

11. 【正确答案】E

【答案解析】骨巨细胞瘤是我国常见的潜在恶性骨肿瘤，好发于股骨下端和胫骨上端，20~40岁多见。

12. 【正确答案】 B

【答案解析】术后切口感染是切口疝最常见的发病原因。

13. 【正确答案】 D

【答案解析】每日尿量少于400ml为少尿；少于100ml为无尿；由急性肾衰竭所致。

14. 【正确答案】 D

【答案解析】气性坏疽属于特异性感染。

15. 【正确答案】 C

【答案解析】慢性胎儿窘迫多因孕妇全身疾病或妊娠疾病引起胎盘功能不全或胎儿因素所致，故正确选项是C。

16. 【正确答案】 E

【答案解析】阴道液酸碱度检查，正常阴道液呈酸性，pH为4.5~5.5；羊水的pH为7.0~7.5。用pH试纸检查，若流出液pH \geq 6.5时，视为阳性，胎膜早破的可能性极大。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】产妇精神过度紧张，产程时间过长或难产，造成产妇体力衰竭；临产后过多使用镇静剂、麻醉剂；产妇合并有急慢性的全身性疾病。可导致产后出血，子宫过度膨胀，如

多胎妊娠、羊水过多、巨大儿、巨大胎盘等使子宫肌纤维过度伸展失去弹性可导致产后出血，
此题选择答案 A。

18. 【正确答案】 D

【答案解析】 骨盆入口平面：前方为耻骨联合上缘，两侧为髂耻缘，后面为骶岬前缘。是真骨盆的交界面，呈横椭圆形；中骨盆平面是骨盆最窄平面，呈前后径长的椭圆形；骨盆出口平面由两个不在一个水平面上的两个三角区组成。

19. 【正确答案】 B

【答案解析】 婴幼儿缺铁性贫血的原因有多种，但最主要的因素是摄入不足。

20. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据体重给新生儿分类，体重不足 1500g 者为极低出生体重儿。

21. 【正确答案】 B

【答案解析】 凡是早产胎儿或新生儿血氧浓度降低的任何因素都可引起新生儿窒息。包括孕母因素，如母亲患糖尿病、心肾等全身性疾病，妊高征等产科疾病，孕母吸毒、吸烟等，母亲年龄 > 35 岁或 < 16 岁，多胎妊娠等；分娩因素如脐带绕颈、受压、打结，手术产，产程中使用麻醉、催产药物不当；胎儿因素如早产儿、小于胎龄儿、巨大儿等，呼吸道、心脏等先天畸形，羊水或胎粪吸入导致的呼吸道阻塞，宫内感染导致的神经系统受损等。

22. 【正确答案】 A

【答案解析】生理性腹泻多见于6个月以内的婴儿，外观虚胖，常见湿疹。生后不久即腹泻，但除大便次数增多外，小儿食欲、精神好，体重增长满意，不影响生长发育。

23. 【正确答案】 B

【答案解析】枕先露占95.55%~97.55%，以枕左前位最多见。

24. 【正确答案】 C

【答案解析】侵蚀性葡萄胎具有亲血管性特点，一旦病灶侵蚀子宫肌层，超声检查常可以发现广泛的肌层内肿瘤血管浸润及低阻性血流频谱。超声检查有助于早期确定滋养细胞疾病的性质。

25. 【正确答案】 D

【答案解析】健康教育与卫生宣教的区别：①健康教育不是简单的、单一方向的信息传播，而是既有调查研究又有计划、组织、评价的系统干预活动；②健康教育的目标是改善对象的健康相关行为，从而防治疾病，增进健康，而不是作为一种辅助方法为卫生工作某一时间的中心任务服务；③健康教育在融合医学科学、行为科学、传播学、管理科学等学科理论知识的基础上，已初步形成了自己的理论和方法体系。

26. 【正确答案】 D



【答案解析】健康教育是通过信息传播和行为干预，帮助个人和群体掌握卫生保健知识、树立健康观念、充分利用医疗卫生资源、自觉采纳健康生活行为和生活方式的教育活动与过程。

健康教育的实质应该是行为干预。

27.【正确答案】A

【答案解析】医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测。灭菌合格率必须达到 100%，不合格物品不得进入临床使用部门。

28.【正确答案】C

【答案解析】常见的真菌感染是白色念珠菌、热带念珠菌和曲霉菌。念珠菌感染多发生在长期应用广谱抗生素或免疫力低下病人身上，常导致深部感染。


29.【正确答案】A

【答案解析】肺炎克雷伯菌是人和动物肠道和上呼吸道的正常菌群组成部分，易在患者的上呼吸道定植，可通过医护人员的手传播，是 ICU 最常见的条件致病菌。故选 A。

30.【正确答案】A

【答案解析】在倾听的过程中，要专心，不要轻易转移自己的注意力，做到“倾心细听”。主要表现为集中精力、及时反馈。

31.【正确答案】B



【答案解析】计划工作的实质就是确定目标和实现目标的途径。因此，要做好计划工作，必须解决“5W1H问题”，即预先决定做什么（what）、论证为什么要做（why）、确定何时做（when）、何地做（where）、何人做（who）以及如何做（how）。计划工作的核心是决策，即对未来活动的目标及通向目标的多种途径做出符合客观规律以及当时实际情况的合理抉择。

32. 【正确答案】D

【答案解析】护理组织文化是在一定的社会文化基础上形成的具有护理专业自身特征的一种群体文化。它是被全体护理人员接受的价值观念和行为规范，也是全体护理人员在实践中创造出来的物质成果和精神成果的集中表现，包括护理哲理、价值观念、道德规范、组织精神等。护理哲理是组织的最高层次的文化，主导、制约着护理文化其他内容的发展方向，护理价值观是组织文化的核心。

33. 【正确答案】D

【答案解析】PDCA循环管理就是按照计划（plan）、执行（do）、检查（check）、处理（action）四个阶段来进行质量管理，并循环不止进行下去的一种管理工作程序。

34. 【正确答案】A

【答案解析】按照最新的美国心脏学会对于CPR的规定，无论是两人还是一人施救，胸部按压次数和人工呼吸次数，均为30:2。

35.【正确答案】E

【答案解析】语言教育形式为实际应用中最简便、最有效的常用方法之一，它一般分为个别教育和群体教育两种。

(1) 个别教育：个别谈话、健康咨询等。

(2) 群体教育：广播、收音、专题讲座、授课、座谈会等。

36.【正确答案】B

【答案解析】氨的毒性作用是干扰脑细胞的三羧酸循环，使大脑细胞的能量供应不足，以致不能维持正常功能。

37.【正确答案】A

【答案解析】在上消化道出血的各类原因中，由消化性溃疡引起的约占 50%，在各类原因中所占比例最高。选项 B、C、D、E 也会引起上消化道出血，但比例较消化性溃疡低。

38.【正确答案】C

【答案解析】颅内容物主要包括的三个部分是：脑组织、脑脊液和血液，记忆便可。

39.【正确答案】B

【答案解析】急性中毒发病时间与杀虫药毒性大小、剂量及侵入途径有关。一般经皮肤吸收，症状常在接触 2~6 小时内出现。自呼吸道吸入和口服者可在 10 分钟至 2 小时内出现症状。

通常发病愈早，病情愈重。有机磷农药中毒无论表现轻重均有特殊大蒜气味。

40.【正确答案】D

【答案解析】可以反映心脏前负荷的指标是肺毛细血管楔压。

41.【正确答案】C

【答案解析】张力性气胸的其裂口与胸膜腔相通，且形成活瓣，致吸气时空气从裂口进入胸膜腔内，呼气时活瓣关闭，空气只能进入而不能排出，使胸膜腔内积气不断增多，压力不断升高。胸膜腔内的高压迫使伤侧肺逐渐萎缩。

42.【正确答案】D

【答案解析】X线钡双重对比检查可发现较小而表浅的病变。纤维胃镜是诊断早期胃癌的有效方法，可直接观察病变部位，并做活检确定诊断。超声胃镜能观察到胃黏膜以下各层次和胃周围邻近脏器的图像。

43.【正确答案】A

【答案解析】低血容量性休克是外科最常见的休克类型。主要由于各种原因引起短时间内大量出血及体液丢失，使有效循环血量降低所致。

44.【正确答案】D

【答案解析】当病人频繁呕吐丢失大量胃液时，氯离子同时大量丢失，碳酸氢根代偿性增加，引起低氯性碱中毒。严重呕吐、腹泻，持续胃肠减压，长期应用利尿药等，导致低钾血症。

45.【正确答案】C

【答案解析】肝脏是人体最大的实质性器官，重 1200~1500g。

46.【正确答案】D

【答案解析】通过尿妊娠试验检测尿中 hCG 含量，是最常用的协助诊断早孕的辅助检查方法。

47.【正确答案】E

【答案解析】HPV 病毒感染是宫颈癌发病的主要相关因素。

48.【正确答案】B

【答案解析】妊娠期高血压基本病变是全身小动脉痉挛。小动脉痉挛造成管腔狭窄，周围阻力增大，内皮细胞损伤，通透性增加，体液和蛋白质渗漏，表现为血压上升、蛋白尿、水肿和血液浓缩等。

49.【正确答案】D

【答案解析】先兆子宫破裂的原因：病理性缩复环是先兆子宫破裂的特征性体征，引起先兆子宫破裂的直接诱因是梗阻，以上只有 D 选项是梗阻。

50.【正确答案】B

【答案解析】产后出血是产妇最常见的死亡原因。

