

医学教育网口腔助理医师：《答疑周刊》2023年第3期

问题索引：

1. 牙结石的致病机制是什么？
2. 什么是生物学宽度？
3. 颗粒型白斑的病损特点是什么？
4. 扁平苔藓黏膜病损主要特征有哪些？

具体解答：

1. 牙龈炎与牙周炎的区别是什么？

牙龈炎区别于牙周炎的重要指标是

- A. 袋深度大于 3mm
- B. 牙龈肿胀增生
- C. 牙龈易出血
- D. 有无附着丧失
- E. 牙槽骨嵴顶吸收

【正确答案】D

【答案解析】健康的龈沟探诊深度一般不超过 2~3mm，当牙龈有炎症时，由于组织的水肿或增生，龈沟的探诊深度可达 3mm 以上，但上皮附着（龈沟底）的位置仍在釉牙骨质界处，临床上不能探到釉牙骨质界，也就是说此时尚无附着丧失，也无牙槽骨吸收，形成的是假性牙周袋。是否有附着丧失是区别牙龈炎和牙周炎的关键指征。[医学教育网原创]

2. 可导致牙龈增生的药物有哪些？

下列可导致牙龈增生的药物不包括

- A. 环孢素
- B. 苯妥英钠
- C. 硝苯地平（心痛定）
- D. 维拉帕米
- E. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）

【正确答案】E

【答案解析】癫痫患者长期服用苯妥英钠，使原来已有炎症的牙龈组织发生纤维性增生。钙通道阻滞剂如硝苯地平（心痛定）、维拉帕米等和免疫抑制剂环孢素也可引起药物性牙龈增生。硝苯地平为钙通道阻滞剂，对高血压、冠心病患者具有扩张周围血管和冠状动脉的作用。环孢素为免疫抑制剂，常用于器官移植或某些自身免疫性疾病患者。如果钙通道阻滞剂和免疫抑制剂两药联合应用，会增加牙龈增生的发生率和严重程度。[医学教育网原创]

3. 地图舌的病损特点是什么？

地图舌的病损经常变换位置，移动或游走的原因主要是

- A. 舌体的活动
- B. 口腔 PH 值的变化
- C. 细菌微生物的作用
- D. 药物牙膏的作用
- E. 剥脱区不断扩大

【正确答案】E

【答案解析】地图舌当剥脱区以离心方向逐渐扩大时，其相应的白色边缘区也随之扩大或断离，而使人们感到病损在移动或游走。[医学教育网原创]

4. 慢性非特异性唇炎的临床表现有何特点？

慢性糜烂性唇炎的临床表现，错误的是

- A. 上下唇红部反复糜烂，渗出明显
- B. 炎性渗出物时会形成黄色薄痂
- C. 痂皮脱落后形成出血性创面
- D. 患者常不自觉咬唇、舔唇或用手揉擦
- E. 患部快速愈合，不复发

【正确答案】E

【答案解析】慢性糜烂性唇炎上下唇红部反复糜烂，渗出明显，结痂剥脱。有炎性渗出物时会形成黄色薄痂，有出血时会形成血痂，有继发感染时会结为脓痂。痂皮脱落后形成出血性创面，灼热疼痛，或发胀发痒，患者常不自觉咬唇、舔唇或用手揉擦，以致病损部位皲裂、疼痛加重，渗出愈加明显，继之又结痂，造成痂上叠痂，唇红部肿胀或慢性轻度增生，下颌下淋巴结肿大。患部可有暂时

愈合，但常复发。[医学教育网原创]



正保医学教育网

www.med66.com