

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2024年第18期

问题索引:

1. 【问题】如何区别葡萄胎、侵入性葡萄胎、绒毛膜癌?
2. 【问题】甲亢患者为什么需要禁碘饮食?
3. 【问题】B超引导下腹腔穿刺抽液或腹腔灌洗液的性质?
4. 【问题】食管癌早期症状?

具体解答:

1. 【问题】如何区别葡萄胎、侵入性葡萄胎、绒毛膜癌?

【解答】

	葡萄胎	侵蚀性葡萄胎	绒毛膜癌
先行妊娠	无	葡萄胎	各种妊娠
潜伏期	无	多在6个月以内	常超过12个月
绒毛	有	有	无
滋养细胞增生	轻→重	轻→重,成团	重,成团
浸润深度	蜕膜层	肌层	肌层、肺
组织坏死	无	有	有
转移	无	有	有
肝、脑转移	无	少	较易
治疗	清宫	化疗	化疗

2. 【问题】甲亢患者为什么需要禁碘饮食?

【解答】碘是甲状腺合成甲状腺激素的重要原料之一,甲亢患者体内甲状腺激素的含量已高于正常人,如果再给予含碘食物,功能亢进的甲状腺将合成更多的激素,进而加重病情。

3. 【问题】B超引导下腹腔穿刺抽液或腹腔灌洗液的性质?

【解答】

A. 草绿色透明腹水	结核
B. 黄色、浑浊、含胆汁、无臭味	胃十二指肠穿孔
C. 含食物残渣	饱食后穿孔
D. 血性、胰淀粉酶含量高	急性重症胰腺炎
E. 稀薄、脓性, 略有臭味	急性阑尾炎穿孔
F. 血性、臭味重	绞窄性肠梗阻
G. 不凝血	腹腔内出血

4. 【问题】食管癌早期症状?

【解答】食管癌早期的症状是哽噎感, 中晚期的典型症状是进行性吞咽困难。  
注意区分。